









**CAJETANI SAVI**  
**MED DOCT.**  
**IN IMPER. PISANO ATHENÆO**  
**PHYSICES EXPERIMENT. PROFESSORIS**  
**ACAD. GEORGOPHIL. FLORENT. SOC.**  
**BOTANICON ETRUSCUM**  
**SISTENS**  
**PLANTAS**  
**IN**  
**ETRURIA SPONTE CRESCENTES**

---

**VOLUMEN I.**

---



**P I S I S**  
**TYPIS RAYNERII PROSPERI**  
**1808.**

1773 1774 1775

1776 1777

OF THE BUREAU OF THE  
GENERAL LAND OFFICE  
WASHINGTON, D. C.

1778 1779 1780

1781 1782

1783 1784

1785 1786 1787

1788 1789

1790 1791

1792 1793

1794 1795

1796

CLARISSIMO VIRO  
OCTAVIANO TARGIONIO  
TOZZETTO

MEDICINÆ DOCTORI,  
IN IMPERIALI FLORENTINO LYCEO,  
BOTANICES,  
IN GEORGOPHILORUM ACADEMIA  
AGRICULTURÆ PROFESSORI,  
IN OMNIBUS NATURALIS HISTORIÆ  
PARTIBUS

APPRIME VERSATO,  
PRECEPTORI, AMICO,  
IN GRATI ANIMI ET AMORIS  
ARGUMENTUM,  
CAJETANUS SAVI  
PRIMUM HOC

ETRUSCI BOTANICI

VOLUMEN  
D. D. D.

THE  
UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1000  
S. MICHIGAN AVE.  
CHICAGO, ILL.  
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
1000 S. MICHIGAN AVE.  
CHICAGO, ILL.  
U.S.A.



**P**rimum mei in Botanicen studii Specimen, Botanicis tum exhibui cum *Floram Pisanam* in lucem emitterem anno 1798. Quod quidem opus licet non satis accuratum, id tamen utilitatis habuit, ut ostenderet et adhuc Botanicen excoli in Etruria, et quasdam in Etruria plantarum Species haberi, quæ vel numquam descriptæ fuerant, vel si jamdiu descriptæ fuerant e Botanicorum memoria prorsus exciderant. Uberem vero laboris mei fructum me obtinuisse tunc sensi, cum a me descriptas Species a recentioribus Botanicis recipi, etruscasque plantas ab exteris studiose requiri intellexi.


Cum nullum amplius Pisanæ Floræ venale prostet exemplar, me-

cumque statuissem jampridem, Patriam Floram, si non absolvere, saltem inchoare; opportunum duxi *Botanicon Etruscum* edere in quo plantas et in *Flora Pisana*, et in duabus *Centuriis* a me descriptas, aliasque permultas a me, nec non ab aliis repertas, in unum colligerem. Qua in collectione brevioribus, iisque, quantum fieri poterat, accuratioribus descriptionibus usus sum, et synonyma imprimis Italorum Botanicorum apponere proposui, præsertim præstantissimi MICHELII nostri, cujus quædam inedita scripta consulere potui, apud OCTAVIANUM TARGIONUM TOZZETUM, qui Botanicen in Florentino Lyceo non solum doctissime exponit, sed et promovere quam enixe studet. Multa quidem TARGONIO debeo; sed illud potissimum me ei devincit, quod comitate ac benvolen-

tia summa, non modo MICHELII  
Manuscripta et Herbarium, quæ  
apud eum adservantur, scrutari  
quantum libuit permiserit; verum  
et ipsemet, licet plurimis distractus  
publicis privatisque negociis, et  
exemplaria conferre, et citationes  
recognoscere non fuerit dedignatus.

Alterum operis hujusce volu-  
men, quamprimum editurum me  
confido. Multa siquidem reposui  
jam conguessique id genus; quodque  
temporis cæteræ meæ occupationes  
mihi permittent, totum id in hanc  
rem impendere statui. Utinam ve-  
ro quæ ingenii mei viribus, ac do-  
ctrinæ desunt, studio valeam ac di-  
ligentia comparare!

---



**V**eronica spicata. L. *V. spica terminali, foliis oppositis obtusiusculis, crenato-serrulatis, apice integerrimis, caule adscendente simplicissimo*. Smith Fl. Brit. Fl. Dan. tab. 52. *Veronica spicata minor*. C. B. P. p. 247. *V. recta minima*. Lob. ic. 472. *V. spicata recta minor*. I. B. Hist. 3 p. 2. pag. 274. Vaill. Paris. t. 33 f. 4. *Veronica spigata*. *Due Cent.*

Caules simplices, 6-10 poll. alti, adscendentes, subignosi. Folia ovato-oblonga, obtusa, obtuse crenata, basi in petiolum decurrentia. Flores in spica terminali. Corollæ cœruleæ, fauce barbata, laciniis acutis. Calyces 4-fidi.

Reperiuntur hujus speciei sequentes varietates. I. pilosa: *spica unica*, ut in figuris Vaillantii, Lobelii, et Floræ Danicæ. II pilosa: *spicis pluribus, foliis plerisque alternis*, et tunc est *V. major angustifolia, caulibus viridibus*. I. B. Hist. 3: p: 2. pag. 284, et *V. spicata purpurea, erecta, ramosa, hirsuta et subincana (foliis brevibus leviter et rotunde crenatis, floribus compactis)* Micheli apud Targionium Catal Hort. Florent. p 99. n. 10. III. glabra: *foliis plerumque alternis, et non raro ternis*. -- *V. spicata erecta ferme glabra, foliis rarius dentatis, floribus majusculis rarius dispositis*. Michel. loc. cit. n. 11. Primam et secundam inveni, in argillosis pascuis prope Pientiam.

et in glareosis collibus *Mugellanis*: tertiam in nemoribus opacis, et in hortis cultam observavi. Floret Julio. *Peren.*

2. *Veronica officinalis*. Lin. *V. spicis lateralibus pedunculatis, foliis oppositis scabris, caule procumbente*. L. Fl. Dan. t. 248. Savi Mater. Medic. t. 26. Gaertner t. 34. *V. mas supina et vulgatissima*. C. B. P. p. 246. *Veronica maschio*, Mattiol. ediz. Valgt. anu. 1585. pag. 730. *Veronica montana* Fl. Pis.

Caules diffusi, procumbentes, apicem versus erecti. Folia opposita, ovato-obtusa, serrata, in petiolum brevem decurrentia: Spicæ axillares, erectæ. Cal. 4-fidus, subæqualis: Cor. pallide coerulea; venis saturatioribus picta. Capsula obcordata, compressa, subvillosa, ciliata. Tota planta hirsuta. Communis in sylvis montanis. Floret Majo et Junio. *Peren.*

3. *Veronica Beccabunga*. Lin. *V. ramis lateralibus, foliis ellipticis planis, caule repente*. Fl. Dan. t. 511. *Anagallis aquatica major et minor folio subrotundo*: C. B. P. p. 252. *Anagallis aquatica*. Lob ic. p. 466. *Veronica Beccabunga*. Fl. Pis.

Caules pedales et longiores, inferne radicantes, decumbentes. Fol. opposita, elliptica, plana, margine obtuse crenata, in petiolum brevem decurrentia. Rami oppositi, axillares. Flores pedicellati, bractea angusta, lanceolata, pedicello brevior. Corollæ cæruleæ, venis pictæ. Calyx 4-fidus, laciniis

acutis. Tota planta glabra, nitida. In fossis aquæ purioris, et ad scaturigines fontium. Floret Junio. *Peren.*

4. *Veronica Anagallis*. Lin. *V. racemis lateralibus oppositis, foliis lanceolatis serratis, caule erecto*. Liu. Fl. Dan. t. 903. *Anagallis aquatica major et minor, folio oblongo*. C. B. P. p. 252. Moris: H. 2; s. 3; t. 24; f. 25. *Veronica Anagallide*. Fl. Pis.

Caulis rectus, pedalis et altior. Fol. lanceolato acuta, superiora sessilia. Racemi longiores quam in *V. Beccabunga*. Corol. minores purpureo-coeruleæ, pallidæ. Cal. 4-fidus, laciniis acutis. Tota planta glabra. In fossis communis. Floret Majo. *Peren.*

In fossis circa Pisas reperitur hujus speciei varietas caule altiore et ramosiore, racemis tenuioribus, foliis angustioribus, sæpius ternis, quandoque 4-ternis, quæ a Decandollio (Fl. Franc. T. 3. pag. 461.) indicatur sub littera γ.

5. *Veronica scutellata*. L. *V. racemis lateralibus alternis, pedicellis divaricatis, foliis linearibus denticulatis*. Smith. Fl. Brit. Fl. Dan. t. 209. *Anagallis aquatica angustifolia*. J. B. Hist. 3. p. 791. *V. aquatica angustifolia* Moris: H. 2; s. 3; t. 24; f. 27. *Veronica aquatica*. *Due Cent.*

Caules erecti, basi repentis et radican-tes, pedales et longiores. Fol. opposita, sessilia, fere connata, lineari-lanceolata, raris et paucis denticulis instructa. Racemi laxi, axillares, alterni, foliis longiores, filiformes

pedicellis post anthesim divaricatis. Cal. 4-fidus, lacin. aequalibus: corol. pallido-incarnatae, lacinia minore pallidiore. Caps. orbiculata, compressa. Planta glabra. In fossis cœnosis Agri Pisani, et in palude *Blentinae*. Floret Junio. *Peren.*

6. *Veronica Teucrium*. L. *V. racemis lateralibus longissimis, foliis ovatis, rugosis, dentatis, caulibus procumbentibus*. L. *Chamædrys spuria major angustifolia*. C B. P. p. 249. *Teucrii quarti tertia species*. Clus. H. 1. p. 349. *Chamædrys vulgaris mas.* Fuchs Hist. p. 871. *Veronica supina facie Teucrii pratensis*. Lob. ic. 473. *Veronica Teucrio. Due Cent.*

Caules adscendentes, plerumque simplices, 6-10. pollic. longi. Fol. opposita, inferiora in petiolum brevem decurrentia, super. sessilia, ovata, acuta, dentata, rugosa. Racemi in axillis superioribus, caule longiores, erecti, densiusculi. Cal. 5-fidus, laciniiis inæqualibus, altera minima: Corol. cœruleæ, fauce villosæ: caps. compressæ, obcordatæ. Planta pallide viridis, caule foliisque pubescentibus. In argillosis collibus Senensis provincie. Floret Junio. *Peren.*

Nonnulla exemplaria possideo in nemoribus Apennini Lucensis lecta, in quibus folia latiora, obtusiora, profundius dentata, flores majores amethystini, et ad varietatem *s. V. Teucrii* Roth Fl. germ. T. 2. referenda videntur.

7. *Veronica Montana* L. *V. hirsuta, ra-*



*cemis lateralibus elongatis, filiformibus, foliis ovatis, petiolatis, grosse serratis; caule debili.* Nob. Fl. Dan. t. 1201. *Alyssum Dioscoridis montanum.* Col. Ecphr. p. 235. t. 288. *Veronica procumbens biscutata, hederifolia.* Moris. H. 2; s. 3.; t. 23.; f. 15. *Veronica pauciflora.* Due Cent.

Caules debiles decumbentes, pedales. Fol. opposita, petiolata, ovata obtusiuscula, grosse serrata. Racemi filiformes; axillares 4-6 flori, folio longiores. Cal. 4-fidi. Corol. albidæ, vel pallide cœruleæ, venis purpurascensibus pictæ. Capsula orbiculato compressa, basi et apice emarginata; ciliata. Planta tota pilosa, præcipue in caule et petiolis. In umbrosis nemoribus Apennini prope *Marradium*, et in Monte Pisano loco dicto *Noce*. Floret Majo. *Peren.*

Amicus dilectissimus Vincentius Carmignani; Botanophylus egregius, in Sylva dicta *Macchia di Badia*, hujus speciei varietatem foliis alternis invenit.

8 *Veronica Chamædrys.* L. *V. racemis lateralibus, foliis ovatis sessilibus rugosis dentatis, caule bifariam piloso.* L. Fl. Dan. t. 443. *Chamædrys spuria minor rotundifolia.* C. B. P. p. 249. *Ch. vulgaris fœmina.* Fuchs. Hist. 872. *Teucrium spurium chamædryoides.* Lob. ic. 490. *Veronica maggiore.* Fl. Pis.

Caules 8-10. pollicares, adscendentes, utrinque linea longitudinali pilosa. Fol. opposita, sessilia, ovato-obtusa, obtuse den-

tata, rugosa. Racemi axillares, oppositi, caule altiores. Cal. 4-fidus, et quandoque 5-fidus, laciniis subæqualibus. Cor. pulchre cœrulea, venis saturationibus picta. Capsula compressa, obcordata. Tota planta pubescens. In montibus frequens. Floret Majo. *Peren.*

9. *Veronica urticifolia*. L. *V. racemis lateralibus, foliis cordatis sessilibus, argute serratis, acuminatis, caule stricto* - *Chamædrys falsa maxima*. J. B. Hist. 3. p. 286. *Veronica maxima latifolia seu Quercus folia*. Moris. H. 2; s. 3; t. 23; f. 18. *V. pratensis omnium maxima*. Buxb. Cent. 1. p. 23. t. 34. *Veronica orticifolia*. *Due Cent.*

Caules sesquipedales, erecti, debiles, Fol. opposita, sessilia, ovato-cordata, acuminata, argute serrata, tenuia, nervosa, nervis rubescentibus. Racemi laterales et terminales longi, laxi. Cal. 4-fidus, lacin. æqualibus. Cor. parvæ, cœruleo-purpureæ. Caps. orbiculato-compressæ, pubescentes. Planta glabriuscula. In umbrosis Apennini Mugellani. Floret Julio. *Peren.*

10. *Veronica agrestis*. L. *V. floribus solitariis, foliis ovatis, inciso-serratis, pedunculo brevioribus, calycinis ovatis, caulibus procumbentibus*. Nob. Fl. Dan. t. 449. *Alsine chamædryfolia flosculis pediculis oblongis insidentibus*. C. B. P. p. 250. *Alsine media*. Fuchs Hist. 22. *Alsine serrata folio glabro*. J. B. Hist. 3. p. 336. *Veronica salvatica*. Fl. Pis.

Caules procumbentes, diffusi, inferne ramosi, 6-8. pollices longi. Fol. sparsa, petiolata, subrotunda, vel ovata, late serrata. Pedunc. axillares, solitarii, uniflori, longitudine foliorum, vel paulo longiores, fructiferi recurvi. Cal. 4-fidus, lacin. ovato-lanceolatis, obtusis, nervosis, vix pubescentibus. Cor. pallida, venis cœruleis picta. Caps. turgidiuscula calycē tecta: semina in quovis loculo plura, umbilicato-concava. Tota planta leviter pubescens. Communis in agris. Floret Aprili. *Ann.*

11. *Veronica filiformis*. Smith. Trans. off. the Lin. *V. floribus solitariis, foliis cordatis crenatis, pedunculo filiformi longissimo brevioribus, calycinis lanceolatis, caulibus procumbentibus*. Nob. *V. orientalis, hederæ terrestris folio, flore albo*. Buxb. Cent. 1, p. 25.; t. 40.; f. 1. *Veronica filiforme*.

Similis præcedenti a qua differt 1. caulibus multo longioribus. 2. pedunculis folio duplo et triplo longioribus, fructiferis nutantibus non recurvis. 3. laciniis calycinis angustioribus, lanceolato-acutis, pilosis, ciliatis, divaricatis. 4. capsula compressa, reticulata, pilosa, ciliata, extra calycem exprorecta. 5. demum corollis majoribus, colore cœruleo vividiore, venis reticulatis pictis, lacinia inferiore alba. Tota planta pubescens, et semina umbilicato-concava. In agro Pisano frequens cum *V. agresti*. Floret Martio et Aprili. *Bien.* In figura quam Bauxbanius dedit, folia nimis obtusa, et pedunculi plus æquo longi.

12. *Veronica hederifolia* L. *V. foliis cordato-rotundatis*, 3-5. lobis, calycibus fructus clausis, laciniis cordato-acutis, capsulis glabris. Bertol. Pl. rar. Gen. Fl. Dan. t. 428. *Alsine hederula folii*. C. B. P. p. 250. *Morsus gallinae folio hederulae*. Lob. ic. 463. *Veronica muraria*. Fl. Pis.

Caules diffusi, pedales et longiores. Fol. infer. opposita, superiora alterna, 3-5. loba, lobis obtusis, terminali majore. Pedunculi foliis paulo longiores, vel breviores. Cal. 4-fidus, laciniis cordato-acutis, glabris, margine ciliatis, fructificationis tempore capsulae approximatis, hinc calyx pyramidatus. Corol. calyce minor: vel cœrulea fauce albida et striata; vel tota albida. Caps. glabra, 4-loba, ventricosa, seminibus urceolatis. Planta hirsuta. Frequens in hortis, in agris, in muris, et florere incipit Februario. Ann.

13. *Veronica cymbalaria*. Bertol. *V. foliis cordato-rotundatis*, subseptem-dentatis: calycibus fructus patentibus, laciniis ovatis, capsulis hirsutis. Bertol. Pl. rar. Gen. *V. hederifolia* β. Lin. spec. *V. chia cymbalaria folio verna*, flore albo, umbilico virescente. Buxb. Cent. 1. p. 26.; t. 39.; f. 2. *Veronica cimbalaria*.

Differt a præcedente, 1. laciniis calycinis ovatis obtusis, fructu maturo patentibus, undique pubescentibus: 2. Corolla calyce majore, limbo alba, fauce viridi: 3. Capsula hirsuta. Reperitur, præcipue super

muros veteres, et tunc caules longi, pen-  
dentes, et pedunculi fructiferi in rimis in-  
tromittuntur, ibique semina demittunt, quæ  
tempore opportuno germinant, ut in *Antir-  
rhino Cymbalaria* observatur. *Ann.*

14. *Veronica acinifolia*. Lin. *V. subpi-  
losa*, caule erecto, foliis ovatis, crenatis,  
floribus solitariis pedunculatis, capsulis com-  
pressis laciniis calycinis subæqualibus Nob.  
*V. minima clinopodii minoris folio*, glabra,  
romana. Boccon mus p. 19 t. 102. *V. mi-  
nor annua*, *Clinopodii minoris folio*. Vaill.  
paris. t. 33, f. 3. *Veronica primaticcia*.

Caules erecti, plerumque ramosi, 2-10  
pollic. alti. Fol. opposita, sessilia, cœna-  
ta, ovata, leviter crenata, floralia alterna,  
minora, angustiora, superiora lanceolata.  
Flores axillares, solitarii, pedunculati; Pe-  
dunc. foliis æquales, vel paulo longiores,  
vel paulo breviores. Cor. pallide cœruleæ,  
venis obscurioribus pictæ. Cal. 4-fidus, la-  
cin. 2. parum majoribus. Tota planta, pilis  
glanduliferis adspersa. Floret initio Martii.  
Communis in Agro Pisano *Ann* Synony-  
mon Bocconii a Linneo ipso citatum, certe  
ad hanc speciem pertinet, non ad *V. præ-  
cocem* cui a Persoonio tribuitur, ut facile  
dignoscitur ex comparatione specificarum  
descriptionum *V. præcoci* et *V. acinifolæ*,  
cum Bocconiana icone.

15. *Veronica arvensis* L. *V. floribus  
solitariis, foliis ovato-incisis, serratis, flori-  
calibus lanceolatis, pedunculo longioribus*,  
*Vol. I.*



*caule erecto* ? Smith. Fl. Brit. Fl. Dan. t. 515. *Alsine Veronica foliis, flosculis cauliculis adhaerentibus* : C. B. P. p. 250. *Alyssum* . Col. Phytobas : p. 28. *Alsine folio hirsutiorre, floribus et loculis cauliculis adhaerentibus* . I. B. Hist. 3. p. 367. *Veronica campestre* . Fl. Pis.

Caulis ascendens, ramosus, 6-8 pollic. altus. Folia opposita : inferiora petiolata, caulina sessilia, ovato-cordata, obtusa, crenata ; floralia alterna, angustiora, integra. Flores axillares, subsessiles, folio breviores. Corol. calyce minor, pallide-cœrulea ; Cal. 4-fidus, lacin. inæqualibus. Caps. compressa. Tota planta leviter pubescens. Communis in agris, secus vias et in muris siccis. Floret Martio. Ann. Figura in Fl. Dan. mala : folia enim fere integra et nimis acuta ostendit, et habitum plantæ omnino diversum. Optima quæ in Phytobasano reperitur, et eius imitatio a I. Bauhino exhibita.

16. *Gratiola officinalis* . L. Gr. *foliis lanceolatis, serratis, floribus pedunculatis* . Fl. Dan. t. 363. Savi Mater. Med. t. 5. *Gratiola centauroides* . C. B. P. p. 279. *Gratiola, sive Gratia Dei* . Lob. ic. 435. *Gratiola Stancacavallo* . Fl. Pis.

Rad. repens., articulata. Caules erecti, tetragoni. Foli. opposita, sessilia, lanceolata, trinervia, apicem versus serrata. Pedunculi axillares, 1-flori. Cal. 5-partitus, lacin. linearibus, inæqualibus. Bractæ 2. sub calyce, oppositæ, lineari-lanceolatæ, ca-

lyce majores. Cor. monopetala, ringens, resupinata, alba, aut intus lutea, et limbo pallide roseo, lab. super. brevior, emarginato, infer. trifido. Caps. polysperma. Tota planta glabra et nitida. Communis in pratis humidis. Floret Julio et Augusto. Peren.

17. *Utricularia vulgaris* L. *U. nectario conico, scapo paucifloro* Lin. Fl. Dan. t. 138. Gärtn. t. 198., f. 5. Lamarck illustr. des genr. Pl. 14., f. 17. *Millefolium aquaticum flore luteo, galericulato*. L. B. Hist. 3; p. 785. Lob. ic. 79. *Lentibularia major*. Vaill. mem. des scienc. ann. 1710; p. 22; t. 2; f. 1. *Orticularia comune*.

Elegans planta in fossis et paludibus natans, scapo extra aquam eminente, erecto, tereti, pedalis altitudinis, 2-3 squamis obtusis amplexantibus, circa medium instructo. Flores majusculi lutei, 3-8 in racemum laxum dispositi. Cal. diphyllus, persistens. Cor. monopetala ringens, labiata; Lab. infer. lato, rotundato, integro; superiore angustiore, ovato, apice angustato, subundulato, truncato, leviter emarginato. Palatum prominens, faucem penitus claudens, gibbis 2, interjecto sulco, lineis saturatoribus pictum. Caps. globosa, in vertice stylo persistente munita, 1-locularis. Recept. globosum: semina plura, ad umbilicum areolata, strato simplici receptaculo insidentia. Folia sub aqua ad scapi basim conferta, multifida, capillaria, adherentibus utriculis compressis, aere plenis. In fossis secus

viam quæ ad Pisanas Thermas ducit, et in Palude *Blentina*. Floret a Majo usque ad Augustum. *Peren.*

18. *Rosmarinus officinalis*. L. *Rosmarinum coronarium*. Lob. ic. p. 429. Rame-rino comune.

Frutex sempervirens. Folia opposita, linearia, acuta, margine revoluta, superne glabra et saturate viridia, inferne tomentosa, alba. Flores in racemis parvis, axillari-bus, oppositi, pedunculati, bracteis ovatis al-bis, ad basim pedunculorum. Calyces cyanei, punctis farinosis adpersi, fructiferi deflexi. Corol. cœruleæ; Lab. super. bipartito, in-feriore 3-fido, lacinia media emarginata. Filamenta denticulo, inferiori et postica parte, munita. In maritimis Etruriæ meri-dionalis. Floret per totum annum.

19. *Salvia pratensis*. L. *S. foliis cor-dato-oblongis crenatis, summis amplexicau-libus, verticillis subnudis, corollis galea glu-tinosis*. Lin. *Horminum pratense foliis serra-tis*. C. B. P. p. 238. *Horminum sylvestre*. Fuchs. Hist. 569. *Salvia pratensis*. Fl. Pis.

Caulis pedalis et bipedalis. Fol. oblon-ga, acute crenata, nervosa, rugosa. Co-rollæ majusculæ, cœruleo-violaceæ; Lab. su-periore longiore, falcato. Verticilli 6-flori. Bractæ parvæ, ovato-acuminatæ. Planta pi-losoglandulosa. In pratis montanis. Floret Junio et Julio. *Peren.*

20. *Salvia verbenaca*. L. *S. foliis ser-ratis sinuatis leviusculis, corollis calyce*



*angustioribus*. L. Bertol. Pl. rar. Gen. *Horminum sylvestre lavandulæ flore*. C. B. P. p. 239. *Gallitrichum flore minore purpurascens et rubro*. I. B. Hist. 3. p. 313. *Salvia salvatica*. Fl. Pis.

Caulis bipedalis. Fol. ovata, rugosa, crenata, sinuata, angulis sinuum ita variantibus, ut folia quoque figura varient. Verticilli 6-flori, bracteis latis, acuminatis. Cor. parva, cœrulea vel carnea, tubo angusto, labiis subæqualibus. Tota planta piloso-viscida. Communis ubique. Floret Majo. *Peren.*

Hujus speciei varietates sunt I. *Sclarea italica pratensis*, foliis in profundas lacinias et crenas incisis, flore cœruleo. Michel Cat. H Flor p. 86. n. 11, et II. *Sclarea folio subrotundo ampliori, in rotundas lacinias inciso, ac æstivo tempore viridi, brumali verò purpurascens*. Id. ibidem n. 12.

21. *Salvia clandestina* L. S. foliis serratis pinnatifidis, rugosissimis glabris: spica obtusa, corollis calyce duplo longioribus. Bert. Rar. Plant. Dec. II. *Salvia pratensis minor*. Savi Fl. Pis. *Horminum verbenæ laciniis angustifolium*. Triumfet. Obs. p. 66. *Horminum sylvestre inciso folio, cæcio flore*. Barrell. ic. 220. *Sclarea minor angustifolia, verbenæ laciniis, flore cœruleo dilutiore*. Michel. Cat H Fl p. 46. n. 14. et *Sclarea pratensis minor, foliis longis angustioribus, usque ad costam divisis, flore subcœruleo*. Ibid. in Append. p. 171. n. 15. *Salvia minore*.

**Caulis** 4-6. pollicaris. **Fol.** pinnatifida, lacin. inciso-dentatis, obtusiusculis, sursum versis, reticulato venosa, rugosissima, glabra. **Verticilli** 6 flori. **Bractæ** calyce breviores, cordatæ, acutæ, integræ, pubescentes. **Corol.** calyce duplo longior; Lab. superiore falciformi cœruleo. glandulis destituto; infer. brevior, pallidior. **Caulis**, præsertim in superiori parte, pilosi, et glandulæ pedicellatæ intermixtæ sunt pilis, humorem glutinosum, fœtidum separantes. **Habitat** in arenosis Sylvæ Pisanae. **Flores** incipit Februario. *Peren*

22. *Salvia glutinosa*. L. *S. foliis cordato sagittatis, serratis, acutis*. L. Bertol. *Plant. rar Gen Horminum luteum glutinosum*. C. B. P. p. 238. *Colus Jovis*. Lob. ic. p. 557 *Horminum sylvestre secundum*. Clus. Hist. 2; p. 29. *Salvia glutinosa*. *Due Cent.*

**Caulis** sesquipedalis. **Folia** cordato sagittata, auriculis divaricatis, acuminata, obtusa, crenata. **Flores** 6 in quovis verticillo, subunilaterales; pedicelli bracteis ongiore. **Corol.** pallide lutea, extus pubescens, et glutinosa; labium super. falciforme atro punctatum; lab. infer. minus atro lineatum, trilobum, lobo medio longiore, crispo et cucullato. **Tota planta** luteo virescens, pilis glanduliferis tecta, ex quibus humor viscosus, fœtidus separatur. **In nemoribus** opacis, uti prope *Abbatiam S. Floræ in Monte-Amiata*, et secus fluvium *Sieve*

prope Vicum S. Laurentii in Mugello. Floret Autumno. Peren.

23. *Valeriana rubra*. L. *V. floribus monandris, caudatis, foliis lanceolatis, integerrimis*. L. Gærtn. t. 86. *V. rubra*. C. B. P. p. 165. *Phu peregrinum*. Camer. Epit. p. 24. *V. marina latifolia, major, rubra*. Moris. Hist. 3; s. 7; t. 14; f. 15. *Valeriana tertia inodora*. Cæsalp. p. 150. *Valeriana rossa*. Fl. Pis.

Caulis cylindricus, fistulosus, 2 pedalis. Fol. opposita, ovato-lanceolata, acuminata, integra, superiora quandoque basidentata. Flores pulchre rosei in corymbis densis, ramosissimis dispositi. Bractæ 2-minutæ, acuminatæ, ad basim cujusve floris. Semen ovatum sursum angustatum, compressiusculum, hinc stria unica depressa, inde sulcis 3 elevatis notatum. Pappus sessilis semine longior, radiis circiter 20 incurvatis plumosis, basi in cupulam membranaceam inverse conicam connatis =. Gærtn. T. 2. p. 35. Habitat in mœnibus Pisarum, in parietibus hortorum, et in montibus. Floret Majo. Peren.

24. *Anthoxanthum odoratum*. Lin. A. *spica ovato-oblonga, flosculis subpedunculatis, arista longioribus*. Lin. Leers. herb. n. 25; t. 2; f. 1. Fl. Dan. t. 666 *Gramen spicatum pratense, spica flavescente*. Scheuchz: Agrost. p. 88. *Gramen spicatum, spica purpureo argentea molli*, Tournefortii alterum, locustis majoribus. Michel apud

Tili Cat. H. Pis. p. 72. et Herb. et Cat. Gram Agri Flor. M. S. n. 57. Paleino odoroso *Fl Pis.*

Culmus subpedalis. Fol. plana, pubescentia: ligula obtusa, crenulata. Panicula spicata, lanceolata. Cal. 2 valvis: valvæ scariosæ, acutæ, inæquales, interior duplo longior trinervia. Corol. 2-glumis: glumæ æquales, longitudine valvæ minoris, pilosæ. basim versus aristatæ, aristis inaequalibus, calyce inclusis, longiore geniculata. Nectarium 2-phyllum, glumis duplo brevius, ovatum, foliolis ovato-obtusis, inaequalibus. In pascuis montanis ubique. Floret Majo. *Per.*

25. *Nardus stricta* L. *N. spica recta, floribus secundis.* L. Flor. Dan. t. 1022. *Leers' Herb* n. 38; t. 1; f. 7. *Spartum nostras parvum* Lob. ic. 90. *Spartum parvum Lobelio.* I. B. Hist. 2; p. 513. *Gramen sparteum juncifolium.* Scheuchz. Agr. p. 90; t. 2; f. 10 a, b, c. *Parfine sottile Fl Pis.*

Folia tenuissima, acuta, tetragona, pubescentia, retrorsum scabra, subglauca, in densos cespites disposita. Culmus semipedalis, superne nudus, inferne paucis foliis vestitus, quorum vaginae ligula ovata, brevi, dentata donantur. Spicae rachis uno latere excavata, dentibus in marginibus alternis, quibus flores insident secundi. Cal. 0. Cor. 2-glumis, glumis pubescentibus, subviolaceis, externa in aristam abeunte, interna minore, mutica, acuminata. In summis jugis montis *Pisani*, *Fesulei* montis et

montis *Amiatensis*. Floret Junio. Perenn.

26. *Nardus aristata*. L. *N. spica setacea*, calycibus aristatis, corollis binis inæqualiter pedunculatis, aristatis, squamula suffultis. Persoon Synops. p. 72. Villars. Fl. delph. T. 2; p. 58; tab. 2; fig. mala. Rottboella *monandra*. Cavanil Plant. Hisp. T. 1; n. 41; tab. 39; fig. 1. Persoon Synops. p. 106. *Gramen exile arundinaceum minimum acumine reflexo*. Bocc. mus. p. 74; t. 57. Scheuchz. Agr. p. 41; t. 1; f. 7. K. *Gr. junceum nodosum minimum capillare*. Barrel. ic. 117. n. 1. *Gr. loliaceum minimum, spicis gracilibus reflexis*. Monti Prod. p. 43; f. 30 et Michel Herb. et Catal. Gram. Agr. Florent. n. 3. Parfine aristato *Due Cent.*

Planta tenuis fugax, parvos cespites efformans. Culm. semi-pedalis et pedalis, cylindricus, filiformis, foliis angustissimis glabris, involutis, ligula brevissima tenui, truncata. Spica 3-6 pollices longa, filiformis, apice incurva, rachi scabra, articulata, articulis alternatim excavatis, quibus cavis flores inserti, basi dente vel squamula triangulari suffulti. Flores vel solitarii et tunc sessiles, vel bini altero pedunculato. Cal. o. Glumæ acuminatæ, æquales, exterior scabra, aristata, internam muticam involvens. Stamen 1. Communis in argillosis collibus Pisanz et Senensis Provinciæ. Floret Junio. Ann.

Cavanillesius accuratam hujus plantæ

descriptionem; et bonam iconem exhibuit loc. cit.; sed hallucinatus est cum eam novam esse speciem adfirmavit: eo magis quod citavit *Gramen exile arundinaceum minimum, acumine reflexo*. Scheuchz. Agrost. p. 41; t. 1; f. 7. K. quod a Linneo ad *Nardum aristatam* relatum fuerat. Hallucinatus est etiam cum eam in Rottboellae genere locavit, a quò aperte differt calycis defectu. V. doe Centur. p. 4

27. *Rottboella incurvata*. L. R. *spica tereti, subulata, incurvata, calyce 2-valvi ensiformi, adpresso*. L. Suppl. Fl. Dan. t. 938. *Gr. loliaceum maritimum, spicis articulatis*. Moris. H. 3; s. 8; t. 2; f. 8. Loglierella curva. Fl. Pis.

Culmi cespitosi, basi ramosi, tenues. diffusi, 4-6pollicares, articulis rufescentibus. Fol. angusta, striata, glabra, superne scabra; vaginæ laxiusculæ glabræ; ligula brevis truncata. Spica teres, subulata, glabra, substriata, plus minus incurva. Cal. 2-valvis. Valvæ ensiformes, angustæ, debiles, adpressæ. Glumæ calyce paulo breviores, membranaceæ. In scopulis maritimis. Flor. Junio. Ann.

28. *Rottboella erecta* N. R. *spica filiformi subulata, sub compressa, erecta, calyce 2 valvi, ensiformi patente*. Nob. Giorn. Pisan T. 4, p. 230., f. 5, 6. *Gr. loliaceum spicis articulosis erectis majus*. Scheuchz. Agr. p. 45. *Gr. loliaceum junceum minus*. Barrelet. ic. 6. *Gr. myuros erectum minimum*

*arundinaceum*. Bocc. mus. t. 59. *Gr. loliaceum corniculatum spicis articulosis, calycibus bifidis*. Mich. Herb. et Catal. Gram. Agri Florent. n. 2. Loglierella dritta *Due Cent.*

Culmi tenues, basi plerumque ramosi, adscendentes, articulis subfuscis, semipedales et pedales. Fol. brevia, angustissima, glabra; superne scabriuscula; Vaginæ striatæ, glabræ; ligula brevissima, obtusa. Spica filiformis erecta, subcompressa, glabra, substriata. Cal. 2-valvis: valvæ angustæ, ensiformes, debiles, post anthesim patentēs. Glumæ calyci subæquales, membranacæ. In argillosis Pisinæ et Senensis provinciæ. Floret Junio. *Ann.*

An *Rottboella filiformis* Roth. Catal. bot. 1? Sed obstant folia non pilosa, ligula brevissima, et valvæ post anthesim patentēs.

29. *Rottboella subulata* N. R. *spica tereti, subulata erecta, calyce univalvi, ensiformi, acuminato adpresso* Nob. Giorn. Pis. T. 4; p. 230; fig. 4, 8 *Gramen loliaceum junceum majus*. Barrel. ic. 5. *Gr. loliaceum corniculatum, spicis articulatis, calyculis integris*. Mich. Herb. et Cat. Gram. Agr. Fl. n. 1. Loglierella acuminata. *Due Cent.*

Culmi cespitosi, ramosi, diffusi, a semipede ad pedem longi, articulati, articulis subfuscis. Folia angusta, acuminata, brevia, patentia, striata, glabra, superne scabræ. Vaginæ glabræ, striatæ: ligula brevissima

truncata. Spica crassiuscula, subulata, glabra, plerumque recta, rachi flexuosa striata. Cal. 1-valvis. Valva ensiformis, acuminata, rigida, nervosa, adpressa, in anthesi tantum patens. Glumæ calyci subæquales, interna paulo brevior. In maritimis, et in argillosis Pisanæ et Senensis provinciæ. Floret Junio. *Ann.*

30. *Leersia oryzoides*. Will. *L. panicula effusa*, *spiculis triandris patulis*, *glumis carina ciliatis*. W. *Phalaris oryzoides*. L. spec. Roth. Germ. *Homalocenchrus oryzoides*. Pollich. palat. Gr. *miliaceum aquaticum*, *asperum*, *serotinum et elatius*, *radice repente*, *oryzæ panicula villosa flavescens*, *semine griseo milii vel lini*. Mich. Cat. H. Pis. p. 73. et Herb. et Cat. Gram. Agr. Florent. n. 87. *Leersia risajola*.

Rad. repens. Culmus erectus, fere bipedalis. Fol. lanceolata, acuminata, striata, utrinque scabra, margine ciliato. Vaginæ scabræ: ligula brevissima aut nulla. Panicula erecta, ramosa, patens, ramis scabris, undulatis 1-3 ex eodem puncto. Flores solitarii, imbricatim incumbentes, ovati, subsessiles. Calyc. valvæ albicantes, compressæ, naviculares, altera duplo angustiore, nervosæ, carina ciliata. In fossis Agri Florentini, et præcipue circa Podium Caij (vulgo *Poggio a Cajano*) Perenn.

31. *Milium effusum* L. *M. floribus verticillato-paniculatis*, *dispersis*, *muticis*. L.



Leers herb. n. 50; t. 8; f. 7. Fl. Dan. t. 1143. *Gr. sylvaticum panicula miliacea sparsa*. Moris H. 3; s. 8; t. 5; f. 10. Scheuchz. Agr. p. 133. Miglio sparso.

Culmi erecti 3-4 pedales. Fol. latiuscula, plana, striata, retrorsum scabra: vaginæ glabræ: ligula oblonga, dentata, vel laciniata. Panicula erecta, semipedalis, pedalis, et major, laxa, ramis inæqualibus, capillaribus, flexuosis, ramosis, ramulis brevibus, semiverticillatis, alterne dispositis, patentibus, vel deorsum flexis. Calyx valv. viridibus, margine albo, nitidis, nervis 3. longit. Glumæ calycis contrariæ, pallidæ, nitidæ, subcorneæ, altera latiore. *Peren.*

Amicus meus Joseph Raddi, Botanicæ patriæ studiosus cultor, hanc speciem in nemoribus *Vallis-Umbrosæ* reperiit, mecumque communicavit.

32. *Milium cœrulescens*. Desf. *M. panicula laxa*, pedunculis capillaribus, calyce membranaceo acuto, corolla subaristata. Desf. Fl. T. 1; p. 66; tab. 12. *Gr. saxatile angustifolium glabrum, perenne, panicula fusca, semine nigro splendente, non aristato*. Mich. Cat. H. Pis. p. 73. Miglio turchiniccio.

Culmi 2-3 pedales, superne nudi. Fol. glabra, striata glauca, involuta, ligula lanceolato-acuminata. Rami in panicula laxa solitarii, vel binati, inæquales, flexnosi, pauciflori. Cal. ventricosus, valvis membranaceis, acuminatis, pallidis, vel cineraceis

viridi-striatis, basi, præsertim semine maturo, æerulescentibus. Glumæ obtusæ, altera apice aristata, arista caduca, brevi, calyce inclusa. Semen ovato-acuminatum, nigrum, nitidum, ventre sulco longitudinally notato. In saxosis montibus prope Pisas, (i monti di Calci, e di Uliveto) iisdem queis Michellius locis vidit. Floret Junio. Peren.

Videtur a Michellio observata hæc species tantummodo semine maturo, quo tempore arista deest.

33. *Milium lendigerum*. L. *M. panicula subspicata*, calycibus acutis, scabris, inferne ventricosus, nitidis; corollæ arista dorsali exserta. Nob. Bertol. Pl. Rar. Gen. *Agrostis panicea*. Enc. Fl. Pis. *Gr. Alopecuro accedens*, ex culmi geniculi spicas cum petiolis longiusculis promens. Pluk. phyt. t. 33; f. 6. *Gr. myurum* spica e viridi albicante. Barrel ic. 124. n. 2. ex Michel. Herb. et Catal. Gram. Agr. Flor. *Gr. serotinum arvense*, panicula pyramidalis. Schenckz. Agr. p. 148. Miglio giallognolo.

Culmi basi ramosi, graciles; semipedales et pedales; erecti. Fol. latiuscula, plana, deorsum scabra; Vaginæ scabriusculæ; ligula oblonga, obtusa; lacera. Panicula erecta, contracta, in florescentia laxiuscula. Calic. oblongi, acuminati, basi quodam veluti globulo instructi, nitidi: valvis inæqualibus, carinatis, carina scabris, vel pilosis. Glumæ inæquales, pubescentes, majores

re dorso aristata, arista calyce longiore. Frequens in montibus. Floret Julio. Ann.

Male Scheuchzerus aristam glumæ terminalem dicit.

34 *Agrostis miliacea*. L. *A. gluma exteriori arista terminali recta, mediocri: floribus ovatis, laevibus*. Pers. Synops. Gouan illustr. p. 3 *Gr. miliaceum majus nutante panicula*. Barrel ic. 754 Michel. Cat. H. Pis. p. 73. Agrostide maggiore.

Culmi 2-4 pedales. Fol. glabra, plana, erecta, super. superficie retrorsum scabra. Vaginæ striatæ, glabræ, ligula, obtusa, brevi. Panicula magna, patens, ramis semiverticillatis, aut verticillatis, numerosis, filiformibus, scabris, ramosis, multifloris. Cal. valvæ lanceolato-acuminatæ, subaequales, turgidiusculæ, glabræ, laeves, dorso obscure violaceæ. Glumæ minores, altera latiore aristata, arista exserta. Variat proceritate, et numero ramorum in verticillis. Communis in montibus saxosis, nec non in mœnibus Florentiae et Pisarum. Flor. Julio. Peren.

35. *Agrostis bromoides*. L. *A. panicula simplici, angustata, corolla pubescente, arista recta, calyce longiore*. Lin. Mantiss. Gouan Illustr. p. 3; tab. 1; f. 3. *Gr. spicatum saxatile angustissimo folio, spica laxa e rarioribus glumis aristatis composita*. Michel. Herb. et Cat. Græm. Agr. Florent: n. 55 Agrostide Forasacco.

Culmi 2-3 pedales, erecti. Fol. erecta

involuta, striata, superficie interna scabra: Vaginae glabrae striatae: ligula nulla. Panícula 6-10 pollicaris, simplex, angustata, ramis plerumque binis. inaequalibus, minore 1-floro, raro 2-3-floro; majore ramoso, saepe 10-floro, flore inferiore subsessili. Calyc. valvae subaequales, lanceolato-acuminatae, glabrae, striis 3, marginibus et apice scarioso-argenteae, in maturitate stramineae. Corol. calyce minor, glumis inaequalibus pubescentibus, majore aristata, arista scabra, calyce duplo longiore; arista parum infra apicem, ut in *Bromis*, inserta, quod clare patet si leviter retrorsum arista flectatur, quia tunc glumae margines liberi apparent. In monte Pisano, nec non in Sylva inter *Auserim* et *Arnum*. Floret Junio. *Peren.*

36. *Agrostis vulgaris*. Smith. *A.* (*mutica*) panícula patente: ramulis divaricatis, capillaribus, calycibus aequalibus, petalo interiore duplo brevior, retuso. Smith. *Fl. Brit.* Bertol. *pl. rar.* Gen. *Agrostis capillaris*. Leers. *Herb.* n. 54., tab. 4, f. 3. *Agrostis hispida* W. *Gr. montanum erectum*, foliis angustioribus asperis, panícula longa parum expansa, delicatissima, e griseo argentea splendens, locustis minimis. Mich. *Herb. et Cat. Gram. Agr. Flor.* n. 76. *Agrostide* comune.

Culmi erecti, vel descendentes glabri, semipedales, et sesquipedales. Fol. angusta, striata, retrorsum scabra, vaginis glabris,

ligula brevi obtusa. Panicula erecta, patens, ramis alternatim verticillatis, capillaribus, flexuosis, dichotomis, scabriusculis. Valvæ subæquales, lanceolato-acuminatæ, carinæ suprema parte, oculo armato, denticulata. Glumæ inæquales: major fere longitudine calycis, apice 3-dentata, altera duplo brevior, et etiam minor, retusa. Communis. In siccis caule brevior, foliis angustioribus involutis, panicula purpurascente. In humidis et umbrosis altior, foliis latioribus, tota viridis. Floret Junio Peren.

*Variet Agrostis vulgaris*  $\beta$  Smith. — gluma majore prope basim aristata, arista calyce longiore — *Gr. arvense arundinacea panicula spadicea, locustis minus aristatis*. Michel. loc. cit. num. 78.

— *Agrostis vulgaris*  $\gamma$  Smith *Agrostis pumila* Lit. Mantis. Due Centur. p. 24.

37. *Agrostis alba*. L. A. (*mutica*) *panicula laxa, culmo repente, calycibus aequalibus lanceolatis, nitidis, carina scabris*. Smith Fl. Brit. Leers. herb. n. 55 t. 4, f. 5. Roth Fl. Germ. Agrostide palustre.

Culmi 1-3 pedales, adscendentes, basi radicanter. Folia striata, et scabra: vaginae glabriusculæ: ligula obtusa, 2-fida, vel lacera. Panicula 2-6 pollicaris, patens, ramis brevibus, inaequalibus, dense floriferis, alterne semiverticillatis. Valvæ lanceolato-acutæ, æquales, carina ciliato-scabræ, cæterum nitidæ. Cor calyce minor, glum. inaequalibus, majore acuta, apice trifida,

minore obtusa, integra. Communis in fossis et inundatis. Floret Junio et Julio. *Peren.*

38. *Agrostis pungens*. Schreb. *A. panicula contracta foliis convolutis, subpungentibus, culmo repente, prolifero*. Enc. Bivona Cent. *Gr. caninum maritimum spicatum*. C. B. P. p. 1. Prod. p. 2., cum icon. *Gr. spicatum secalinum maritimum, pumilum repens, Arundinis folio et facie; foliis superna parte villosis, spica laxa non aristata*. Mich. Cat. H. Pis. p. 72. *Arundo tertia in maritimis*. Caesalp. p. 186. *Agrostide pungente*. Fl. Pis.

Culmi repentes, articulati, tecti foliis brevibus, triangularibus, glabris, rigidis, in summitate ramorum convolutis, pungentibus. Rami floridi erecti, semipedales, pedales et longiores, foliis approximatis distichis, patentibus involutis, striatis, superficie superiore pilosis: Vaginae glabrae: ligula nulla: Pili ad os vaginae. Panicula 2-pollicaris, densa, ramis solitariis. Valvae inaequales, lanceolato acuminatae, carina dentata, glabrae, nitidae, pallidae. Glumae subaequales glabrae. Planta glauca. In arenosis juxta mare. Floret Augusto et Septembri. *Per.*

39. *Phalaris arenaria* W. P. *spica ovato-lanceolata, obtusa, glumis exatse lanceolatis obtusis, ciliatis, culmo basi ramoso*. Smith. Fl. Brit. *Phleum arenarium*. Lin. Spec. Fl. Dan. t. 915. Roth. Fl. Germ. *Crypsis arenaria*. Desfont. Fl. Atlant. *Gr. typhynum maritimum minus*. Plukn. phytogr.

t. 33 ; f. 8. Scheuchz. Agrost. p. 63. Scagliola marina

Culmi adscendentes, basi ramosi, ramis divaricatis, 2-6 poll alti, superne nudi, nitidi, amethystini. Fol. lanceolata, striata, glabra, margine scabriuscula, vaginis laxis, superiore ventricosa, ligula alba, obtusa. Spica ovato lanceolata, in lobos divisibilis. Valvae aequales, lanceolatae, mucronatae, compressae, trinerviae, dorso ciliatae, virides, marginibus albo-scariosis. Glumae calyce breviores, obtusae. Frequens in arenosis maritim. Floret Jun Ann.

40. *Phalaris subulata*. Fl Pis *P. spica subulata, calycibus compressis, ovatis acutis, dorso lateribusque nervosis, radice fibrosa*. Nob. V. Gior. Pis. T. 4. p. 225. fig. 1, 2, 3. *Gr. typhynum longissima spica molli albicante* Barrel ic 14. u 1. *Gr spicatum annum glabrum spica cylindracea longiore et tenuiore, locustis phalaridis versicoloribus*. Michel Cat H. Pis. p. 72 Scagliola sottile Fl. Pis

Culmi pedales, erecti, teretes, inferne ramosi, superne nudi, nitidi, amethystini. Fol. striata, retrorsum scabriuscula, vagina superiore laxa, ligula triangulari. Spica cylindrica tenuis, acuta, densa, in lobos divisibilis, tripollicaris. Valvae aequales, ovato-acutae, compressae, mucronatae, glabrae, albae, nervo dorsali et laterali viridi. Glumae obtusae, calice breviores - A Michelio in salebrosis collibus *Imprunetae*

lecta, a me vero rare in Monte Pisano observata, sed copiosissime in collibus argillosis tam prope Pientiam, quam prope Pagos Pisanae provinciae Casciana, il Bagno a Acqua et Lorenzana. Floret Junio. Ann.

41. *Phalaris Michelii*. Nob. P. *panicula spicata, cylindrica hirsuta: calycibus subcompressis, mucronatis, ciliatis*. Nob. V. Giorn. Pisan. T. 4, p. 230. fig. 2 *Phalaris alpina* Haenke ap. Jacq. collect. 2. *Phleum Michelii* Allion. *Phleum phalarideum* Villars Delph. T. 2, p. 60. *Gr. typhynum junceum perenne*. Barr. ic. 21. n. 2. *Gr. typhoides alpinum: spica graciliori, delicata et villosa* Scheuchz. Agrost. p. 65. *Gr. spicatum saxatile, glabrum perenne, spica cylindracea flavescens longa, locustis acutis, ciliis instar pilosis*. Michel. Catal. H. Pis. p. 72. Scagliola Micheliana.

Culmus erectus, 2-pedalis, glaber, striatus. Fol. erecta, striata, marginibus retrorsum scabris. Vaginae laxiusculae: ligula obtusa mucronata. Spica 4-pollicaris, erecta, cylindrica, obtusa, in lobos divisibilis. Valvae aequales, lanceolatae, acuminatae, breviter aristatae, glabrae, albae, dorso viridi, nervoso, ciliato pilis longiusculis patentibus. Glumae breviores obtusiusculae, glabrae, subaequales — In summitate montis Ferrati invenit Michellius; a me vero pluries cum antecedenti reperta. Floret Junio. *Peren.*

42. *Phalaris paradoxa*. L. P. *spica brevi obtusa, calycibus sterilibus pluribus erosis, fertilibus lanceolatis apice longe acuminatis, carina membranacea truncata*. Nob.



*Gr. spicatum* annuum, semine miliaceo albo, calyculorum glumis plerumque dentatis, et in perbreve aristam desinentibus. Mich. Herbar. et Catal. Gram. Agr. Florent. n. 3. Scagliola rosicata. Fl. Pis.

Culmus 2-pedalis, inferne ramosus, erectus. Fol. tenuissime striata, glabra, retrorsum scabriuscula. Vaginae laxae, suprema ventricosa. Ligula tenuissima, acuminata. Spica 2-pollicaris, obovata, obtusa. in lobos divisibilis. Cal. glabri: plures neutri, valvâ parvis erosâ: fertiles vero valvis duplo et triplo longioribus, carinatis, carina medio truncata et in lobum fere triangularem desinente, albidis, nervosis, nervo dorsali viridi, in mucronem aristam mentientem producto. Glumae minores, subaequales, ovato-acutae, glabrae. Communis inter segetes. Floret Majo. Ann.

43. *Phalaris erucaeformis*. L. *P. panicula cœræata, unilateralis, ramulis fructiferis erectis, calycibus 1-2floris glumis obtusis navicularibus, carina obtusa, corolla acuminata*. *Cynosurus erucaeformis* W. Gmel. Sibir. 1; p. 150; t. 29. *Gr. palustre locustis erucaeformibus*. Barrel. ic. 2. Scagliola aquatica. Fl. Pis.

Culmus 3-4pedalis. Fol. plana, striata, versus apicem scabra: Vag. glabrae, ligula triangulari lacera. Panícula semipedalis et quandoque pedalis, ramulis brevibus vix pollicem longis, inferioribus ternis, intermedio majore, superioribus solitariis, se-

cundis, patentibus, fructiferis erectis. Flores unilaterales, in quovis ramulo bifariam digesti, orbiculares. Calyces 1-2flori, valvis navicularibus, obtusis, carina integra obtusa, viridi, margine albo, membranaceo. Glumae calyce longiores, acutae, subaequales, externa acuminata. In fossis Agri Pisani, sed rara. Floret Majo. *Peren.*

44 *Phleum pratense*. L. *P. spica cylindrica longissima, glumis dorso ciliatis, mucrone longioribus*. Smith. Fl Brit. Fleo pratajolo. *Fl. Pis.*

*Var. α Spica longissima. Gr. typhoides maximum spica longissima. C. B. P. p. 4; Prod. 10; cum. icon Moris H. 3; s. 8; t. 4; f. 1. Gr. cum cauda muris longa majus. I. B. Hist. 2; p. 472.*

*Var. β Spica breviori. Gr. typhoides asperum primum. C. B. P. p. 4; Scheuchz. Agr. p. 6; Gr. cum cauda muris minus. I. B. Hist. p. 471. Gr. typhoides medium sive vulgatissimum. Moris Hist. 3; s. 8; t. 4; f. 2.*

*Var. γ Spica breviori, radice bulbosa. Phleum nodosum Lin. Gr. typhoides asperum alterum. C. B. P. p. 4. Scheuchz. Agr. p. 62. Gr. cum parva cauda muris, radice nodosa, repens. I. B. Hist. 2; p. 472. Gr. typhoides minus nodosum. Moris H. 3; s. 8; t. 4; f. 3.*

Folia scabra striata: vaginae laeviusculae, ligula brevis obtusa. Culmi erecti, superne nudi. Spica cylindrica, obtusa, densa. Cal. compressus, truncatus, valvis nervosis, margine interno membranaceo albo,

dorso viridi, carina ciliata, in mucronem brevem producta, mucronibus calyce clauso distantibus et divaricatis, - Var.  $\alpha$  gaudet radice fibrosa, culmo erecto 3-4 pedali, spica 4-6 pollicari. Radix crassiuscula subterosa in  $\beta$ ; bulbosa, bulbis ovatis, tunicis fuscis tecta in  $\gamma$  - Culmi adscendentes pedales et sesquipedales, et spicae 1-2 pollicares in  $\beta$  et  $\gamma$  - Antherae violaceae in  $\alpha$  et  $\beta$ , albae in  $\gamma$ . In pratis humidis  $\alpha$  reperitur;  $\beta$  et  $\gamma$  in argillosis et siccis collibus. Flor. Julio. Peren.

45. *Phleum alpinum* L. *P. spica ovato-cylindracea, mucronibus glumis subaequalibus*. Fl. Dan. t. 213. *Gr. typhoides alpinum, spica brevi, densa et veluti villosa*. Scheuchz. Agr. p. 64, Prod. t. 3. Fleo alpino. Due Centur.

Radix tuberosa subrepens. Culmus adscendens, glaber, striatus, superne nudus. Folia latiuscula, scabra, striata, vaginis glabris, laxiusculis, superiore subventricosa: ligula brevissima, triangularis. Spica densa ovato-cylindrica, obtusa, pollicaris, primum viridis, dein atro-purpurea. Calyces compressi, truncati, valvis pilosis, nervosis, carina ciliata, in mucronem subulatum, dentatum, valvae subaequalem, producta. In Apennino prope Scarperia. Floret Junio. Peren.

46. *Phleum paniculatum*. Huds. *P. panicula cylindrica spiciformi, glumis nudis sursum incrassatis, culmo ramoso*. Smith.

Fl Brit. *Phalaris aspera panicula spicata tereti*, calycibus obcordatis torulosis, angulatis. scabris, mucronatis. Flor. Pisan Retz. Enc. Bot. *Phleum viride* Allion Fl. Pedem. *Phleum asperum* Villars Fl. Delph tom. 2, p. 61. tab. 2, fig. 4. mala. *Gr. paniceum utriculatum amplo utriculo*. Barrel. ic. 28. n. 2. *Gr. spicatum annuum glabrum, spica cylindracea tenuiori, aspera, longa, locustis tumidioribus bicornibus*. Michel. Catal. Hort. Pisan. p. 72 Fleo ramoso.

Culmi pedales, adscendentes, basi ramosi. Fol. striata, retrorsum scabra. Vaginae striatae, glabriusculae: ligula acuminata. Spica cylindrica, densa, in lobos divisibilis. Flores rigidi. Cal. obcordatus, superne gibbus, valvis scabris, nervosis, nervo dorsali in mucronem brevem, obtusum desinente, marginibus, oculo armato denticulatis. Corol. calyce brevior: glumis inæqualibus. Frequens in saxosis et argillosis locis. Floret Julio. Ann. Est vere *Phleum*: dentes enim, vel mucrones calycis, etiam calyce clauso distant.

47. *Crypsis alopecuroides*. Nob. *C. caule ramoso procumbente, spica cylindrica nuda*. Nob. *Phleum alopecuroides*. Vitm. Sum. Plant. T. 1 *Gr. ramosum annuum glabrum perhumisparsum, spica cylindracea breviori*. Michel. Catal. H. Pisan. p. 72; et Herb. et Catal. Gram. Agr. Florent. n. 61. Brignolo codino.

Culmus pedalis et sesquipedalis, geni-

cutatus, procumbens, ramosus. Folia lanceolato-acuminata, plana, striata, glabra, superne aspera, inferne laevia. Vaginae laxae, striatae, et scabrae: loco ligulae pili breves. Spicae cylindricae, obtusae, sesquipollicares, culmo et ramis terminales, ante explicationem a vagina supremi folii involutae, deinde liberae, et ramulus ultra medium nudus. Flores parvi, dense imbricati. Valvae inaequales, albae, nervo dorsali viridi, ciliato. Glumae calyce longiores, conformes, inaequales. In salicetis fluviorem, sed rara. *Bien.*

48. *Crypsis* Schœnoides. *C. spicis ovatis, vagina foliacea cinffis, culmo ramoso procumbente.* Pers. Lamarck illustr. des genr. Pl. 42, fig. 1. Phleum Schœnoides Linn. Enc. tab. Jacq. Collect. 1 p. 111. Phleum Schœnoides var Cavanil. ic. Plant. hisp. T. 1. tab. 52; f. V. Ph. Schœnoides s W. Gr. typhnum brevi et crassiori spica, ad singula genicula prodeunte. Scheuchz. Agr. p. 86. Brignolo scheno. *Fl. Pis,*

Similis praecedenti, sed spicae ovatae, vaginis 2-foliorum superiorum obvolutae. Folia angustiora, breviora, et rigidiora. In Pratis humidis prope Pisas. *Bienn.*

49. *Crypsis* aculeata. *C. caule ramosissimo, spicis capitato-hemisphaericis, foliis vaginantibus brevibus pungentibus, cinffis.* Perso. Lamarck illustr. des genr. Pl. 42; f. 2. Anthoxanthum aculeatum. Lin. Suppl. Schoenus aculeatus. Lin. spec. Schreb.

*Phleum schænoides*. Jacq. Fl. Austr. Append. tab. 7. Cavanil. ic. pl. hisp. T. 1; tab. 52. *Agrostis aculeata*. Scopol. fl. carniol. *Phleum aculeatum* Lam. Fl. Franc. *Antitragus aculeatus*. Gaertn. t. 80. *Gram. album, capitulis aculeatis, italicum* C. B. P. p. 7. Scheuchz. Agr. p. 85. Moris. H 3; s. 3; tab. 15; f. 2. Brignolo pungente *Fl. Pis.*

Differt a praecedente spicis capitato hemisphaericis, vaginis duorum fol. superiorum obvolutis, foliisque rigido-pungentibus. In iisdem locis. *Bien.*

50. *Alopecurus geniculatus* L. *A. culmo adscendente geniculato, spica sublobata, cylindrica, glumis retusis pilosis*. Smith. Fl. Brit. Fl. Dan. t. 564. Leers herb. n. 45; tab. 2; f. 7. *Gr. alopecurum fluviatile geniculatum, procumbens*. Moris Hist. 3; s. 8; tab. 14; f. 15. *Gr. aquaticum geniculatum, spicatum*. Scheuchz. Agrost. p. 72. Codino aquatico.

Radix repens. Culmi 1-2 pedales, geniculati, inferne radicanter, natantes, ramosi. Folia scabriuscula. Vaginae glabrae, laxae, ligula oblonga, obtusa: Spica cylindrica, obtusiuscula, tripollicaris, lobata. Valvae subaequales, obtusae, pilosae, carina ciliata. Gluma: folliculus basi aristatus, aristata geniculata, calyce longiore. In Palude *Blentinae*. Floret. Junio. *Peren.*

51. *Lagurus ovatus* L. *spica ovata villosa*. L. Gaertn. tab. 1. *Alopecurus spica rotundiore*. Moris. Hist. 3; s. 8; t. 4; f. 1.

*Gr. alopecurum molle spica incana*. Barrel. ic. 1116. n. 1, 2. *Gr. spicatum tomentosum*, longissimis aristis donatum. Scheuchz. Agrost. p. 58; t. 2; f. 4; b. c. Piumino ovato. *Fl. Pis.*

Culmus tenuis, adscendens, pedalis. Fol. striata, pilosa, mollia. Vagina superior, ventricosa: ligula obtusa, ciliata. Spica densissima, ovato-obtusa. Cal. 1-florus. Valvæ æquales, lineari-lanceolatæ, in longam aristam productæ, pectinato-ciliatæ. Glumæ inæquales: major lanceolata, carina pubescente, apice biaristata, aristis rectis, glumæ subæqualibus, tertiaque arista dorsali geniculata, flore duplo longiore. Gluma minor apice 2-partita. In arenosis maritimis inter *Arnum* et *Auserim* et circa *Liburnum*, ubi a Scheuchzero ipso collectus. Floret Majo. *Ann.*

52. *Saccharum* Ravennæ. L. *S. panicula laxa: rachi lanata, floribus aristatis*. L. *Arundo farcta vallium Ravennæ*. Zanon. Hist. Bot. p. 64; t. 24. Moris II. 3; Sect. 8; t. 8; f. 32. *Gr. arundinaceum plumosum album*. Scheuchz. Agrost. p. 136; tab. 3; f. 7. a, b. Cannella sorda. *Fl. Pis.*

Culmus 10 12 pedalis, crassus, alba medulla repletus. Fol. 2 pedes longa, erecta, plana, margine scabra, nervo dorsali albo. Vaginæ striatæ, glabræ, ad os pilosæ. Panicula pedalis, et longior, patens, caudicans, holosericea. Pedunculi pilosi. Cal. 2-valves, 1-flori, pilis sericeis albis.

longis, circumdati, pedunculo et inferiori valvarum parte insertis. Valvæ angustæ, mucronatæ, spadiceæ. Glumæ glabræ, scariosæ, inæquales, minori in aristam calyce longiorem desinente. In Pratis inundatis Sylvæ Pisanæ. Floret Augusto. *Peren.*

53. *Saccharum cylindricum*. Enc. S. *pannicula spicata, cylindrica, pedunculis 1-floris, floribus muticis diandris, foliis planis*. W. Lamarck illustr. des genr. Planche 40. f. 2. *Lagurus cylindricus*. L. Imperata *arundinacea*. Cyril. Icon. rar. fasc. 2; tab. 11. *Gr. alopecuros spica longa, tomentosa, candicante*. I. B. Hist. 2; p. 474; *Cannella pumosa*. *Due Cent.*

Culmi 2-pedales. Fol. radicalia, culmo longiora, erecta, plana, acuminata, carinata, nervo dorsali albo, striata, glabra, in externa superficie lævia, scabra in interna. Vaginæ glabræ, læves, ad os pilosæ. Pannicula spiciformis, densa, 5-6 pollices longa: pedunculi pilis albis raris adspersi. Cal. 2-valvis, 1-florus. Valvæ subæquales, acuminatæ, albo-scariosæ, margine ciliatæ, in inferiori parte dense pilosæ, pilis albis, sericeis, longis, florem involventibus. Glumæ inæquales, acuminatæ, albo-scariosæ, margine ciliatæ. Stamina 2. Inveni prope fodinas sulphuris *Peretæ* in maritimis Senensis Provinciæ, et oritur etiam in aggeribus Arni prope *Uliveto*. Floret Junio. *Peren.*

54. *Andropogon hirtus*. L. *A culmo ra-*



*moso, vaginis ramis ventricosis, spicis conjugatis, calycibus pilosis, flore hermaphrodito aristato, masculo mutico. Nob. Bertol. pl. rar. Genuens. Bivena Centuria. Festuca junceo folio spica gemina. C. B. P. p. 9. Prod. p. 19. Gram. dactylon spica gemina. Scheuchz. Agrost. p. 95. Gram. dactylon siculum, multiplici panicula, spicis ab eodem exortu geminis. Pluckn. Alm. tab. 92; fig. 1. Mont. Prod. p. 62; fig. 97; Michel. Catal. Hort. Pis. p. 75. Barbone peloso. Due Cent.*

Culmi cæspitosi 1-4 pedes alti, superne ramosi. Fol. angusta, pallide viridia, vel glauca, striata, retrorsum scabra, pilis raris longis adspersa, præcipue versus basim: vaginæ glabræ arctæ; ligula truncata, dentata vel lacera. Vaginæ ramæ longiores, ventricosæ, viridi-rubræ, ex quibus 2-4 ramuli floridi prodeunt, basi vagina secundaria, aphylla, scariosa, pallide rubra vel carnea, acuminata, glaberrima, latente, instructi: tertia demum vagina supra dimidium ramuli adest, aphylla, glabra, rubella, margine albo. Ramulus versus apicem pilis brevibus patentibus, sericeis tectus. Spicæ conjugatæ, terminales, tenues, altera sessili, altera breviter pedicellata, pollicares. Flores binati, hermaphrodito sessili aristato, masculo pedicellato mutico; in rachi pilosa. *Flos hermaphroditus*. Cal. valvis æqualibus acuminatis integris, externa fusca, pilis albidis mollibus tecta, interna albida subgla-

bra. Cor. glumæ subæquales, albæ, scariosæ; Glum. externa major, calyce paulo brevior, ciliata; interna angustissima, basi emittens aristam 8-10. lin. longam, contortam, geniculatam, inferne fuscescentem, superne pallidam. *Flos masculus* pedicello compresso, angulis pilosis: Valvæ subæquales, acuminatæ, fuscæ, pilis albidis tectæ. Glumæ subæquales, calyce paulo breviores albo scariosæ. In maritimis Senensis Provinciæ, et in monte Pisano, a Calci e Uliveto. Floret Julio. Peren

55. *Andropogon Gryllus*. L. *A. panicula pedunculis simplicibus, trifloris, floribus omnibus aristatis, hermaphrodito ciliato, arista articulata*. Nob. Bertol. Pl. Rar. Gen. *Ægilops bromoides*, juba purpurascente. L. B. Hist. 2; p. 436. Scheuchz. Agrost. p. 267; t. 6; f. 1; a, b, c. *Gr. sparteum festuceum s. ægilops sparteum villosa*. Barrel. ic. 18; f. 2. Barbone pannocchiuto. *Due Cent.*

Culmi cæspitosi 2-3 pedales. Fol. striata, scabra, carinata, pilosa, pilis raris. Vaginæ glabræ, striatæ; loco ligulæ series pilorum brevissimorum. Panicula patens, simplex, pedunculis scabris, simplicibus, apice parum incrassatis, trifloris, floribus fusco violaceis. Flos medius *hermaphroditus*, sessilis, basi, sericea lanugine, longiuscula, fulva circumdatus, valvis lineari-acuminatis, rigidis, subæqualibus, quarum altera marginis dentibus validis, acutis, ciliata, apice bifida; altera vero superna tantum dorsi

parte ciliata, et in aristam longiorem terminata. Gluma huic valvæ subiecta brevissima, apice aristata, arista longissima, contorta, scabra, medio articulata. inferne atrorubra, superne flavescente: altera gluma longior, acuminata. Flores laterales masculii pedicellati: valvæ laeves, lanceolato-acuminatae, altera apice aristata: Glumae subaequales, calyce paulo breviores, acuminatae, marginæ ciliatae, majori-violacea, altera alba, diaphana. In maritimis Senensi Provinciæ, uti inter *Orbetellum* et *Marsilianam*. Floret Junio. *Peren.*

56. *Andropogon distachyon*. L. *A. culmo simplici, spicis conjugatis terminalibus, calycibus glabris, floribus omnibus aristatis*. Nob. Bertol. Pl. rar. Gen. Gram. bicornæ seu *distachyophoron*. Bocc. Sic. p. 20; t. 11; fig. 1 a. mala. *Gr. dactylon spica gemina, triunciali, glabra et aristata*. Michel. Cat. Hort. Pisan. p. 75. Barbone cornuto. *Due Centur.*

Culmus pedalis et bipedalis, simplex, tenuis, adscendens. Fol angusta, carinata, scabra, pilis raris adpersa. Vaginae laeves, margine et ore pilosae; ligula obtusa, in superioribus ciliata vel dentata. Spicae duae in summitate culmi, 1-3 pollicares: altera sessili, altera breviter pedicellata, fasciculo pilorum basi instructae. Rachis compressa. Flores binati. *Hermaphroditus sessilis*, basi brevi villo circumdatus. Valvae glabrae: externa major, lanceolato-acuminata, stria-

ta, apice bifida, pallide virens, margine scarioso amethystino: interna alba, subdiaphana, cymbiformis, carinata, glabra, apice bifida, aristata, arista tenui pallida, parum infra apicem inserta. Corolla calyce brevior, glumis subaequalibus, lanceolato-acuminatis, albis, scariosis, externa integra, ciliata, interna bipartita, e sinu prope basim aristam emittens, pollicarem et longiorem, medio articulatam, superne pallidam, inferne fuscam - *Flos masculus* pedunculatus, pedunculo compresso, angulo externo piloso. Valvæ lanceolato-acuminatæ, externa viridi lutescens, margine albo scarioso, apice bifida, arista tenui pallida in sinu inserta: interna paullo minor, albo-scariosa, margine ciliata. Glumæ calyce minores subæquales albo scariosæ, majore margine ciliata. Cum præcedenti. Flor. Jun. *Peren.*

57. *Holcus mollis*. L. *H. calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito sessili mutico, masculo pedicellato aristato, arista flore longiore.* Nob. Leers Fl. Herb. n. 769; tab. 7; f. 7. Roth. Fl. Germ. *Gram. caninum paniculatum molle.* Scheuchz. Agr. p. 225; Tab. 4; f. 25. Olco pubescente. *Due Cent.*

Radix repens. Culmi pedales et bipedales, adscendentes. Fol. plana, lanceolata, striata, retrorsum scabra, pubescentia. Vaginae glabrae: ligula brevis truncata. Panícula 2-4 pollicaris. Cal. 2-florus. Valvæ lanceolato-acuminatæ, glabræ, carina, ci-

niatæ, albo-virescentes, vel lutescentes, subæquales, flosculis longiores. Flosculus inferior *hermaphroditus*, sessilis, muticus, glumis subæqualibus, glabris, nitidis, externa latiore. Flosc. alter *masculus*, pedicellatus, glumis conformibus, quarum externa sub apice instructa est arista medio geniculata, leviter divaricata, calyce longiore. In collibus *Mugellanis*. Floret Julio. *Peren.*

58 *Holcus lanatus* L. *H. calycibus bifloris*, flosculo *hermaphrodito sessili mutico*, masculo *pedicellato aristato*, arista recurva, flore brevior. Nob. Leers herb. n. 770; t. 7; f. 6. Roth Fl. germ *Gr. pratense paniculatum molle*. Scheuchz. Agrost. p. 234; t. 4 f. 24. t. a, b *Olco lanato*. *Fl. Pis.*

Radix repens. Culmi 2-4 pedales. Folia lanceolata, striata, pubescentia, mollia. Vaginæ laxæ, pubescentes, ligula truncata, crenulata. Panicula 4-6 pollicaris. Cal 2-florus. Valvæ lanceolato-obtusiusculæ, pubescentes, carina ciliatæ, albæ. Flosculi calyce breviores: inferior *hermaphroditus*, sessilis, muticus: *masculus* pedicellatus, aristatus. Arista sub apice glumæ externæ inserta, demum recurva, calyce brevior. Communis in collibus *Etruriæ*. Floret Junio. *Peren.*

59 *Holcus halepensis*. L. *H. calycibus unifloris*, floribus *hermaphroditis sessilibus aristatis*, muticisve: masculinis *pedicellatis muticis*. W. *Gr. arundinaceum halepense*, *tragopogonis folio*, panicula *miliacea*. Pluk.

Phytogr. tab. 32; f. 1. Michel. Hort. Pis. p. 73; *Gr. arundinaceum paniculatum*, locustis partim muticis, partim aristatis. Scheuchz. Agr. p. 509; t. 11; f. 12. 13. 14. 15. Olco sciamica, *Fl. Pis.*

Culmi erecti, validi, 5-6 pedales. Fol. tripedalia et longiora, plana, striata, glabra, margine scabra, nervo dorsali albo, valido. Vaginae glabrae, striatae; ligula triangularis, obtusa, ciliata. Panicula pedalis, et longior, patens, ramis angulatis, scabris. Calyces 1-flori, valvis pubescentibus. Flores hermaphroditi sessiles, ovato lanceolati. Fl. masculi pedicellati, lanceolati, in inferiori rami parte plerumque solitarii, in superiori vero duo cuique flori hermaphrodito, hinc et inde altius adsurgentes adstant. Glumae floris masculi angustae, lanceolatae, albo-scariosae, subaequales, calyce breviores. Glum. Flor. hermaphroditi inaequales; minor apice emarginata, et in floribus superioribus, gluma haec ex emarginatura aristam emittit spadiceam, tortilem, geniculatam, flore longiorem. In aggeribus et incultis arvis. Floret Jun. Peren.

Scheuchzerus minus recte ait hermaphroditos flores corollam habere ex unica gluma, aristamque pro altera gluma haberi; ideoque erronea est fig. 13. eius tab. 11. In parem errorem incidit describens. *Gram. dactylon spica gemina*. Agr. p. 95. (Androp. hirtum. L.) uniglumas appellans corollas floris tum maris, tum hermaphroditi.

60. *Aira cespitosa*. L. *Aira foliis planis nervosis, panicula patente, pedicello flosculorum villosa, glumis basi aristatis, arista recta brevi*. N. Smith. Fl. Brit. Fl. Dan. t. 240. Leers herb. n. 59; t. 4; f. 8. *Gr. segetum panicula arundinacea* Scheuchz. Agr. p. 244; t. 5; f. 2. 3 *Gr. agrorum latiore, arundinacea, comosa panicula*. Morris. H. 3; s. 8, t. 5; f. 17. *Ghingola cespugliata*

Culmi 2-3 pedales. Fol. plana, lin. 2. lata, striata, nervosa, externe laevia, interne scabra, exsiccatione convoluta: ligula acuminata, 2-fida, 4-5 lin. longa. Panicula 6-12 poll. longa, densa, patens, semiverticillis alternis, ramis ramosis, multifloris, inaequalibus, scabris plerumque 6 in quovis semiverticillo. Flores parvi, lin.  $1-1\frac{1}{2}$  longi, obtusiusculi. Valvae subaequales, lanceolatae, margine apiceque scariosae, dorso virides vel amethystinae, majore obscure trinervia. Flosculi bini, calyce paulo longiores, altero pedicellato, pedicello piloso, pilis circa florum basim extensis. Glumae glabrae, subaequales; externa latior, lacero-emarginata, basi aristata, arista scabra retroflexa glumae subaequali: Glum. interior, emarginata, carina dentata. In argillosis collibus Senensis Provinciae, prope Pagum S. Quirici, et in monte Pisano, praecipue loco dicto *Pugnano*. Floret Junio. Peren.

61. *Aira alpina*. L. *A. foliis setaceis, panicula patente laxa, pedicello flosculorum villosa, glumis dorso aristatis, arista recta brevi* Nob. Fl. Dan. t. 961. Roth Fl. Germ. *Aira capillaris* Fl. Pisan. Gr. *avenaceum capillaceum, minoribus glumis, argenteis vix aristatis, foliis angustioribus* Scheuchz. Agrost. p. 222 *Ghingola alpina*.

Culmi adscendentes a 6-poll. usque ad 2-ped. longi. Fol. angustissima, cito convoluta, interna superficie striata et retrorsum scabra. Vaginae laeviusculae striatae. Ligula acuta, saepe laciniata. Panicula patens, ramis scabris, inferioribus plerumque ternis, intermedio longiore, superioribus binis ramosis, alternatim dispositis. Flores longiores et acutiores quam in praecedenti. Valvae subaequales, lanceolato-acuminatae, integrae, nitidae, apice margineque scarioso, albido vel stramineo, dorso viridi vel subcoeruleo, carina, versus apicem, armato oculo, minutissime denticulata. Flosculi bini, altero pedicellato, pedicello piloso, pilis circa basim et margines flosculorum extensis. Glumae glabrae, pallidae, subaequales, externa apice truncata, emarginato-dentata, dentibus 2 lateralibus longioribus, acutioribus, fere medio dorso aristata, arista recta, glumae subaequali. calyce inclusa: Gluma interior angustior, membranaea, apice lacera, margine denticulata. In aridis montis Pisan., sed rara: communis in Monte-Amiata, et in argillosis Agri Se-



nensis, densos cespites efformans. Floret  
Junio. *Peren.*

In icone floræ Danicæ folia nimis lata  
pinguntur.

Deceptus ab equivoca phrasi, qua Lin-  
neus *Airam alpinam* designat, nempe *pa-  
nicula densa, flosculis basi pilosis arista-  
tis*, non putavi ad hanc speciem referri  
posse plantam hic descriptam; ideoque pro  
nova specie illam in Flora Pisana desumpsi  
sub nomine *Airæ capillaris*.

62. *Aira flexuosa*. L. *A. foliis seta-  
ceis, culmo subnudo, panicula patente tri-  
chotoma, pedunculis flexuosis, aristis gen-  
tculatis*. Smith Fl. Brit Leers herb n 60;  
t. 5; f. 1; Fl Dan t. 157 *Gr avenaceum  
paniculatum, alpinum, fol capillaceis bre-  
vibus, locustis purpureo argenteis; splen-  
dentibus et aristatis*. Scheuchz. Agrost p.  
216. t. 4 f 16; a, b, c Prod. t. 4; f 4.  
*Ghingola tortuosa. Fl Pis.*

2 *Culmo magis folioso, panicula alba,  
vix flexosa*. Smith Fl. Brit *Gr nemorosum  
paniculis albis, capillaceo folio*. Scheuchz.  
Prod. t. 6; f 1.

Culmi teretes, nudiusculi, erecti, sub-  
pedales. Fol setacea, brevia, scabriuscu-  
la, ligula obtusa, 2-fida. Panicula patens,  
trichotoma, pauciflora, pedunculis tenui-  
bus, scabris. flexuosis. Valvæ subæqua-  
les, lanceolato-acuminatae, spadiceae, ni-  
tidae, carina versus apicem, oculo armato,  
denticulata. Flosculi eodem fere puncto in-

serti, inferne pilosi et aristati, arista geniculata, glumis sesquolongiori. *Var. γ* Differt foliis longioribus, pedunculis rectiusculis et minus patentibus. In *Monteamiata*. Floret Junio. *Peren.*

63 *Aira canescens*. Lin. *A. foliis setaceis, summo spathaceo, flosculis basi aristatis, aristis inclusis, clavatis*. Nob. Smith. *Fl. Brit Fl. Dan* t. 1022. Gaertn. t. 1. *Gr. fol. junceis, oblongis, radice alba*. Moris. *H.* 3; s. 8; t. 3; f. 10. Scheuchz. *Agrost.* p. 212 *Gr. fol. junceis radice jubata*. Sch; *Agr.* p. 243 *Gr. avenaceum, maritimum annuum minus, panicula sparsa, locustis parvis, argenteis, aristis erectis, ad extremitatem latis et complanatis*. Michel. *Cat. H. Pis.* p. 74 *Ghingola biancastra. Fl. Pis.*

Rad. fibrosa. Culmi adscendentes, laeves. Fol. setacea, scabra, rigida, striata; Vaginae striatae glabrae, superior ventricosa; ligula lanceolato-acuminata. Panicula subsecunda, densiuscula, angusta, ramulis plerumque binis, alternis, ramosis. Valvae subaequales acuminatae, dorso tenuissime ciliatae, cinereo, vel stramineo argenteae. Flosculi calyce duplo breviores, altero pedicellato, glumis inaequalibus, externa majore basi pilosa et aristata, arista calyce inclusa, inferne tortili nigrescente, medio zona denticulorum notata, superne clavata alba. Planta glauca Variat magnitudine a 4-pollic. ad 2 pedes. Communis in arenosis tumulis, vulgo i *Cotoni*. sylvae *Pisanae*, in

solo arenoso inter *Pisas et Liburnum*, nec non inter *Pisas et Petram-sandam*, quibus in locis et a Michelio lecta. Flor. Jun. Ann.

Figura Gaertneri optima: quae vero in Flora Danica observatur, bona quidem quoad habitum plantae, sed vitiosa eo quod aristae calyce longiores repraesentet.

Puto quod *Aira articulata*, calyce flosculo longiore acuto, nitido, arista medio nodosa, e basi glumae prodeunte. Desfont. Fl. Atlant. T. 1 p. 70; t. 13. nullatenus differat ab *Aira canescente* Lin., et facile quidem demonstrari potest, si comparentur descriptiones. *Graminis fol. junceis radice alba*, Scheuchz. Agr. p. 242; et *Gram. fol. junceis radice jubata* Scheuchz. Agr. p. 243, et descriptio *A. canescentis* Lin. quam Smithius protulit, cum figura et descriptione *Airae articulatae* Desfont. Discrimina in solis dimensionibus habentur, quas quidem dimensiones in hac planta, non secus ac in multis aliis, saepe observavi, varias esse solere pro soli, et cœli varietatibus. Desfontainesius superiorem vaginam in descriptione ventricosam non dicit, sed in icone ostendit. Persoonius *A. articulata* pro nova specie recepit, eandemque adhibuit phrasim specificam quam Desfontainesius adhibuerat. Quae vero, pro observatione, addita sunt verba *Folia lata, spica convoluta*, illa Typographi errori tribuo, qui aliunde huc transtulit, cum phrasi et figurae aperte adversentur. Demum advertam

Willdenowium et Smithium. *A. canescentem* veluti perennem, Michelium vero, Linneum, Lamarchium, et Decandollium veluti annuam considerare; meæ pariter observationes eam annuam confirmant: annuam quoque *A. articulatam* Desfontainesius dicit.

64. *Aira caryophyllea*. Lin. *A. foliis setaceis, panicula trichotoma divaricata, flosculis sessilibus, arista geniculata*. Smith. Fl. Brit. Leers herb. n. 62; t. 5; f. 7. Fl. Dan. t. 382. *Gr. paniculatum, minimum molle*. Scheuchz Agr. p. 215; t. 4; f. 15. Ghingola nebbia. Fl. Pis.

Culmi 2-pollicares, semipedales et pedales, erecti, basi ramosi, tennes, glabri. Fol. striata, margine scabriuscula; Vaginæ laxæ; ligula acuminata. Panicula laxa, ramis capillaribus, quandoque flexuosis, alternatim dispositis, geminatis vel ternis, trichotomis, divaricatis. Flores parvi, ovato-acuminati, valvis nitidis, margine, apiceque albis, cæterum purpureo-argenteis. Flosculi 2. sessiles: Glumæ inferne subfusæ, apice acuminatæ, scariosæ, externæ basi obsolete pilosæ, et paulo supra basim aristatæ, arista geniculata, ultra calicem protensa.

— Datur varietas flosculo altero mutico; quæ a Scheuchzero designatur per *Gr. paniculatum, purpureo-argenteis locustis delicatissimis*. Agrost. p. 233. In Agris argillosis, in arenosis, et glareosis frequens. Fl. Majo. Ann.

65. *Aira pubescens*. W. *A. panicula spiciformi oblonga, glumis ciliatis, vaginis, foliisque villosis* Vahl. *Phalaris pubescens*. Gerard. Enc. *Koeleria villosa*. Pers. Synops *Gr typhinum maritimum, longius radiculatum*. Barel. ic 717 *Ghingola pelosa*.

Culmi subpedales, adscendentes, superne nudi, teretes, nitidi. Fol. plana, acuminata, striata, utrinque dense et molliter villosa. Vaginæ laxiusculæ, præsertim superior: ligula brevissima, obtusa, ciliata, spica cylindrica, obtusa, crassiuscula, in lobos divisibilis. Calyc. compressi, valvis subæqualibus, lanceolato-acutis, villosis, dorso pallide-viridi, carina ciliata, marginibus scarioso-argenteis. Flosculi 2, altero pedicellato. Glumæ membranacæ, argenteæ, margine apiceque denticulatæ, externa carinata, carina in aristam brevissimam, prope apicem, prodūta. Calyces nonnulli 1-flori. Facies Phalaridis. Communis in arenosis *Sylvæ Pisane*. Floret Junio. Ann.

66 *Poa trivialis*. L. *P. panicula diffusa, spiculis trifloris, glumis lanceolatis quinquenerviis, basi villo connexis, stipula elongata*. Smith. Fl. Brit. *Poa trivialis panicula subdiffusa, spiculis trifloris, basi pubescentibus, culmo erecto, tereti*. Lin. Spec. *Gr. pratense paniculatum medium*. C B P. p. 2. Scheuchz p. 180. *Poa pratensis panicula diffusa, spiculis subquinquefloris, subpubescentibus, culmo erecto tereti, membrana foliorum, oblonga, acuta*. Leyss. Halens.

*Poa pratensis*. Pollich palat. *Poa dubia* panicula diffusa, spiculis ovatis, obtusis, subtrifloris, basi pubescentibus, vaginis, foliisque subtus scabris. Leers. Herb. n. 69. tab. 6; f. 5. *Poa trivialis*. Curt. Fl. Lond. Fasc. 2; t. 6. Willdew. Spec. Plant-Enc. Botan. — *Poa palustris*. Hofm. — *Poa scabra* Ehrh. — Decand. Fl. Franc. *Poa pratensis* panicula diffusa, spiculis subquinquefloris, foliis planis, vaginis scabris, ligula oblonga acuta. Gmel. Syst. *Poa trivialis* panicula subdiffusa, spiculis trifloris, basi pubescentibus, culmo scabro subancipite, ligula longa. Perso. Synop. Fienarola comune. Fl. Pis.

67. *Poa pratensis* panicula diffusa, spiculis quadrifloris, glumis lanceolatis, quinquenerviis, villo connexis, stipula abbreviata, obtusa. Smith. Fl. Brit. *Poa pratensis* panicula diffusa, spiculis 5-floris glabris, culmo erecto, tereti. Lin. Spec. — Gram. pratense, paniculatum majus, latiore folio. C. B. P. p. 2. Scheuchz. Agrost. p. 177. *Poa pratensis*. Curtis Fl. Lond. fasc. 2; tob. 5. Willden. Spec. — *Poa trivialis* spiculis 3-floris, basi pubescentibus, culmo erecto, tereti, membrana foliorum brevi, truncata, foliis planis vaginis scabris. Leiss. Fl. Halens-Roth. Fl. Germ. — Poll. palat. *Poa serotina*. Ehrh. *Poa pratensis* Leers. Herb. n. 68; t. 6; f. 4. (a). Enc. Botan. — Decand.

(a) Smithius fig. 4. tab. 6. Leersii dubie citat, forsitan eo quod spiculas nimia acutas exhibeat.

Fl. Franc. *Poa pratensis panicula diffusa* spiculis 5-floris, glabris, culmo erecto tereti, glabro, ligula brevi truncata, foliis planis. Perso. Synops - Fienarola pratajola. Fl. Pisan.

Var. *angustifolia*. Smith. Fl. Brit. Dignoscitur foliis superioribus angustissimis rigidis, panicula minori, vaginis inferioribus scabriusculis. Smith. - *Poa angustifolia panicula diffusa*, spiculis 4-floris pubescentibus, culmo erecto, tereti. Lin Spec. - *Gram. pratense paniculatum majus angustiore folio*. C. B. P. p. 2. Scheuchz Agrost. p. 118. *Poa angustifolia spiculis 4-floris pubescentibus culmo erecto, tereti, levi; membrana foliorum brevi, truncata; foliis radicalibus filiformibus involutis*. Leyss. Halens. *Poa angustifolia* Poll. palat. - Leers herb. n. 67; t. 6; f. 3. (a) Enc. Botan (b) Decand. Fl. Franc. - Peers. Synops - Communes hae species in pratis et in aggeribus. Flor. Majo. *Peren.*

Impossibile erat recte determinare has species, inter se admodum similes, ex eo quod de iis dixerat Linneus. Ille specificum veluti characterem, *P. triviali* spiculas trifloras, quadrifloras. *P. angustifoliae*, quin-

(a) Pollichius, Rothius, et Leersius vaginas omnes glabras dicunt.

(b) Ab iis quae in Botanica Encyclopaedia ad hanc speciem citantur, excludenda est *Poa trivialis* Leersii, quae ad varietatem *Poa nepetalis* spectat. Smith. Fl. Brit.

quefloras. *P. pratensi* tribuit; Sed nulla harum specierum flosculorum numerum habet constantem. *P. pratensi* tribuit flores glabros, pilosos ceteris duabus: at plerumque pilosi in omnibus observantur. Sic et character a panicula vel diffusa, vel subdiffusa desumptus, omnino insufficiens, quoniam paniculae expansio et ramificatio, a varia soli expositione et qualitate pendet, nullusque haberi potest certus majoris, minorisve ramificationis limes. Ex hac characterum incertitudine orta est multiplicitas, immutatio et confusio nominum, uti ex allata synonymia palam fit. Postquam vero ligulae figura et magnitudo, considerari coepit, non secus ac vaginarum superficies, tunc hae species patenter distinctae sunt, statutumque est ut *Poa trivialis* ea dicatur quae ligulam habet longam, vaginasque scabras; *Poa pratensis* quae ligulam brevem, et vaginas glabras, et *Poa angustifolia* quae ligulam brevem, et scabras inferiores vaginas; licet Smithius, qui vaginas nullatenus considerat. *Poam angustifoliam* putet esse tantum *Poa pratensis* varietatem, idque jure ac merito, ut mihi quidem viderur.

68 *Poa nemoralis*. L. panicula, foliis que attenuatis, spiculis lanceolatis subtrifloris, glumis acutis, absolute quinquenervis, stipula brevissima crenata. Smith Fl Brit. Leers Herb. n. 72; t. 5; f. 3. Fl Dan t. 749 *Gr. paniculatum, angustifolium alpinum, locustis rarioribus et angustioribus;*



*non aristatis*. Scheuchz. Agr. p. 164. Pro 1.  
p. 2; t/2. Fienarola boschiva.

Culmi tenues, compressi, 1-2 pedes alti. Fol. angusta, acuminata, superiora in utraque superficie scabra, inferiora glabra in externa: vaginæ compressae, glabrae: ligula brevis, obtusa, emarginata. Panicula erecta, diffusa, ramis tenuibus, scabris, flexuosis, ramosis, semiverticillatis, alterne dispositis. Spiculae 2 florum lanceolato-acutae, nitidae. Valvae subaequales, lanceolato-acuminatae, trinerviae, spicula paulo breviores. Glumae externae conformes, obscure quinquenerviae, basi pilosae, pilis liberis non intricatis, ut in praecedentibus speciebus: Gl. internæ margin: subpubescentes - In Monte Amiata et in montibus Pratae, Boccheggiani, et Montieri. Floret Junio, Peren.

69 *Poa dura* Scop. *P. panicula secunda, compressa, rigida, spiculis alternis sessilibus, obtusis, adpressis*. Roth. Fl. Germ. *Cynosurus durus*. Lin.-Will.-Pollich. palat. *Gram. arvense, polypodii panicula, crassiore* Barrel. ic. 50. *Gr. loliaceum supinum, annuum, minus, spica heteromalla incurva, locustis expansis, glumis marginatis*, Mich. Herb. et Catal. Gram. Agr. Florent. n. 12. Fienarola dura. Fl. Pis.

Culmi decumbentes, compressiusculi, basi ramosi, 4-6 poll. longi. Folia totum culmum vestientia, striata, glabra. Vaginæ glabrae, laxae, ligula brevis triangularis. Pa-

*panicula lanceolata, compressa, rigida, disticha, unilateralis, pedunculis brevissimis, rigidis, solitariis. Spicula compressa, lanceolata, obtusa, dura, imbricata, 3-5 flora. Valvae inequales, glabrae, carinatae, nervosae, pallide virides, margine albo: glumae conformes. In arenosis humidis Sylva Pisanae, sed rara. Flor. Majo. Ann.*

20. *Poa rigida*. L. *P. panicula lanceolata, disticho-secunda, coarctata: rachi marginata, spiculis 7 floris, flosculis teretibus, enerviis*. Smith. Fl. Brit. *Ficnarola rigida*. Fl. Pis.

Var. *α muralis*. Culmi fere per totam longitudinem vaginis tecti. *Gr. panicula multiplici minus*. C. B. P. p. 2. Scheuchz Agr. p. 272; t. 6; f. 3 *Gr. arvense filicina duriori panicula gracilius* Barrel. ic. 49.

Var. *β maritima*. Culmi maxima longitudinis parte nudi. *Gr. panicula multiplici majus*. C. B. P. p. 2. Scheuchz Agrost. p. 271; t. 6, f. 2. *Gr. filicinum rigidiusculum*. Vaill. paris t. 18; f. 4 *Gr. loliaceum murorum duriusculum, spica erecta rigida*. Moris. Hist. 3; s. 8; t. 2; f. 9. *Poa rigida*. Curtis Fl. Lond. fasc. 2. t. 4.

Culmi basi ramosi, adscendentes, nitidi, violacei. Fol. angusta, acuta, cito involuta, setacea, striata, superne scabra. Vaginae glabrae. Ligula obtusa, lacera. Panicula lanceolata, secunda, rigida, rachi flexuosa, alata, angulis scabris. Spicula breviter pedicellatae, multiflorae. Valvae su-

baequales, acuminatae, carinatae. Glumae obtusiusculae, euerviae, vix carinatae. -- Var.  $\alpha$  reperitur in muris siccis, in tectis, in collibus argillosis et tufaceis aridis. Culmi in hac 4-5 pollicares, fere per totam longitudinem vaginis foliorum tecti. -- Var.  $\beta$  habitat in arenosis maritimis. Culmi longiores sunt, 7-8 pollic. maxima ex parte nudi, colore violaceo saturatiore, spiculae rariores, sed nonnihil majores, flosculis arctius imbricatis. *Ann.*

71. *Poa decumbens*. *P. panicula sub-  
simplici, coarctata, erecta, spiculis ovatis  
4-floris, longitudine calycis, stipulis ciliari-  
bus*. Smith. Fl. Brit. *Festuca decumbens*.  
Lin. Fl. Dan. t. 162. Leers. Herb. n. 78;  
t. 7; f. 5. Perso. Synops. - *Danthonia decum-  
bens*. Decandol. Fl. Franc. *Gr. montanum  
avenaceum, locustis muticis, tumentibus pi-  
losum*. Scheuchz. Agrost. p. 170; t. 3; f.  
16. a, b, c. *Gr. triticeum, palustre, humi-  
lius, spica brevior*. Moris. H. 3; s. 8; t. 1;  
f. 6. Fienarola distesa. Fl. Pis.

Culmus subpedalis, decumbens, in flo-  
rescentia erectus. Fol. radicalia plana, cœ-  
tera involuta, striata, versus apicem sca-  
bra, pilis albis, mollibus, raris adpersae.  
Vaginae magis pilosae: pili dense dispositi  
loco ligulae. Panicula subsimplex, erecta,  
pauciflora: pedunculi breves, scabri. Spi-  
culae ovatae, 4-5 florum. Valvae spiculis  
subaequales, acuminatae, carinatae, nervo-  
sae, dorso scabrae nervosae, apice trifidae;

basi pilosæ internæ minores, margine cillatæ. In pascuis montanis. Flor. Jun. Peren.

72. *Poa compressa*. L. *P. panicula secunda coarctata, culmo adscendente, compresso, flosculis angulosis, basi villo complicato connexis*. Smith. Fl. Brit. Leers. Herb. n. 71; tab 5. f. 4. *Gr. paniculatum, radice repente, culmo compresso, locustis distichis, pulchellis*. Scheuchz. Agr. p. 198. Vaillant paris. t. 18; f. 15 *Gr. loliaceum procumbens, caulibus compressis, paniculis rigidiusculis*. Mont. Prod. p. 29. Fienarola compressa. Fl. Pis.

Culmi adscendentes, compressi, superne nudi, glabri. Fl. glabra, striata: vaginæ ancipites: ligula obtusa: Panicula coarctata secunda, rachi compressa, tereti, ramulis subflexuosis. Spiculæ sessiles, ovato-lanceolatæ, 2-9 floræ. Valvæ subæquales acutæ, nervosæ. Flosculi, basi, villis brevibus intricatis, connexi. Glumæ externæ, marginæ et apice scariosæ, albæ, macula purpureo-violacea infra apicem, carinatæ, angulatæ. Reperitur in muris, et collibus siccis. Floret Julio. Peren.

73. *Poa divaricata*. Gouan. *P. panicula divaricata, pedicellis incrassatis, spiculis 4-floris, foliis filiformibus*. Persoon Synops. Gouan illustr. p. 4; t. 2; f. 1. Fienarola divaricata. Fl. Pis.

Culmi 4-5 pollicares, inferne ramosi, teretes, tenues, nitidi, superne nudi. Folia glabra, striata: Vaginæ laxiusculæ, striatæ.

tæ et glabræ: ligula acuta. Panicula pollicaris, vel sesquipollicaris, ramis capillaribus glabris, geminatis, patentibus, divaricatis, 2-3 chotomis; spiculæ pedicellatæ, pedicellis clavatis, parvæ, lanceolatæ, subquadri-flore, floribus distantibus. Glumæ acuminatæ, margine argenteo, dorso subviridi, nitidæ. Valvæ conformes, persistentes flosculis delapsis, et tunc pedicelli forcati. In humidis prope mare, sed rara. Flor. Majo. Ann.

74. *Poa aquatica*. L. *P. panicula erecta, ramosa, laxa, spiculis 6-floris, linearibus, flosculis obtusis 7-nerviis* Smith. Fl. Brit. Leers Fl. Herb. n 65; t. 5; f. 6 Roth. Fl. Germ. Pollich. Palat. Gr. *palustre paniculatum altissimum*. Scheuchz. Agrost. p. 191; t. 14; f. 1. Gr. *aquaticum paniculatum, latifolium*. Moris. H. 3; s. 8; t. 6; f. 25. *Fienarola aquatica*. Fl. Pis.

Var. *g minor*.

Culmi crassi, ancipites, erecti, sexpedales et altiores. Fol. pollicem lata, ensiformia, acuta, striata, margine et carina scabra, vaginis glabris, macula ferruginea, triangulari, utroque latere ad folii basim; ligula integra, acuminata. Panicula pedalis et longior, laxa, patens, subnutans, ramulis pluribus simul eodem loco alternatim nascentibus, inæqualibus, flexuosis, ramosis, scabris. Spicæ pallide lutescentes, 5-8 floræ, floribus distantibus. Valvæ subæquales, ovato-acutæ, nitidæ. Glumæ æquales, ob-

tusæ, externæ 7-nerviæ, internæ emargina-  
tæ. Antheræ luteæ. Frequens in paludibus  
*Blentinae*, *Castilionis Piscariae*, et *Clusii*.  
Floret Junio. Peren.

Pollichius, Rothius, et Smithius liga-  
lam obtusam dicunt, sed semper acutam ob-  
servavi.

Var.  $\beta$  differt culmo breviorē, panicu-  
la angustiorē, et defectu macularum in va-  
ginis. Reperitur in fossis et in Pratis hu-  
midis prope Pisas.

75. *Briza maxima* L. *B. panicula nu-  
tante depauperata*, pedunculis simplicibus,  
*ligula mediocri*. Nob. Gaertn. tab 1; fig. 6.  
Jacq. observ. 3; p. 10; t. 60 Bertol. Pl.  
Rar. Gen. Gr. *phalaroides majus*, ferrugi-  
nea nutante panicula. Barrel. ic. 15. n 1.  
*Gr. tremulum maximum*. Scheuchz Agr.  
p. 202; t. 4; f. 7 Moris. H. 3; s. 8; t. 6;  
f. 48. *Gr. paniculatum*, locustis maximis,  
omnino candidis. Michel. Herb. et Cat. Pl.  
Agr. flor. n. 114. *Tremolina maggiore*. Fl.  
Pisan.

Pedunculi pauci (4-6) capillares, flo-  
xiosi, scabri, solitarii, simplices (inferio-  
res raro geminati vel divisi) uniflori. Spi-  
culæ magnæ 8-16 floræ, ovato-cordatæ, com-  
presso-torosæ, nutantes, tremulæ, nitidæ.  
Valvæ margine scarioso, albo, dorso viri-  
di, maturitate ochraceæ, obtusæ, cochleari-  
formes. Glumæ conformes, internæ minores,  
integræ. Culmus teres, pedalis, fol. striatis  
margine scabris, vaginis laxiusculis, ligula

obtusa mediocri, lineam vel sesquilineam longa. Inter segetes frequens. Floret Julio. Ann.

26. *Briza media*. L. *B. spiculis ovatis*; 7-9 floris, calyce flosculis brevior, ligula brevissima obtusa. Smith. Fl. Brit. Leers herb. n. 64; t. 7; f. 2. Fl. Dan. t. 258. *Gr. tremulum vulgare minus*. Moris. H. 3; s. 8; t. 6. f. 45. *Gr. tremulum majus*. Scheuchz. Agr. p. 204; t. 4; f. 8. *Gr. phalaroides minus, erecta, collectaque panicula*. Barrel. ic. 15; n. 2. *Gr. paniculatum majus perenne, locustis magnis tremulis*. Michel. Cat. H. Pis. p. 75. *Tremolina mezzana*. Fl. Pis.

Culmus erectus, pedalis, et sesquipedalis, laevis. Fol. erecta, plana, acuta, striata, scabra. Vaginæ longissimæ, laxiusculæ, glabræ: ligula obtusa, brevis, vix lineam longa. Panicula subsecunda, patens, ramulis geminatis, alterne dispositis, fuscis, capillaribus, scabris, ramosis, ramulis flexuosis. Spiculæ nutantes, tremulæ, ovato-cordatæ. Valvæ cochleariformes, obtusæ, glabræ, nitidæ, dorso subviolaceæ, margine albo-scarioso, glumis parum breviores. Glumæ conformes, pallidiores, internæ emarginatæ. In argillosis Senensis Provinciae. Floret Majo. Peren.

27. *Briza minor*. L. *B. spiculis triangularibus, sub-septemfloris, calyce flosculis longiore, ligula lanceolata, longissima*. Smith. Fl. Brit. *Gr. tremulum minus, locu-*

*sta deltoide*. Moris. H. 3; s. 8; t. 6; f. 47.  
*Gr. tremulum phalaroides minus, lata,*  
*sparsa panicula*. Barrel. ic. 16. *Tremolina*  
*minore*. Fl. Pis.

Culmus erectus, basi ramosus. pedalis et altior. Fol. lanceolata, acuminata, margine scabra. Vaginae laxiusculae glabrae; ligula acuminata, 3-lin longa, superne folio adnata. Panicula diffusa, aequalis, ramis geminatis, dichotomis, ramulis divaricatis, flexuosis, capillaribus, scabris, viridibus; Spiculae nutantes, tremulae, triangulares, glabrae, nitidae. Valvae obtuse striatae, dorso viridi, margine albo, glumis longiores. Glumae conformes, interne minores, emarginatae. Inter segetes vulgaris. Floret Junio. Ann.

78 *Sesleria argentea*. Nob. *S. spica cylindrica, spiculis 4-floris, involucro denticulato, foliis planis*. Nob *Festuca argentea*. Savi apud Uster. Annal an. 1800 cum icone. *Cynosurus cylindricus* Balbis Miscell. Bot. p. 12 *Sesleria argentina*.

Culmus simplex, teres, erectus, pedalis, vel sesquipedalis. Fol. plana, acuta, laete aut ex flavesciente viridia, erecta, striata, superficie interna scabra, radicalia culmo subaequalia vel longiora: ligula vix conspicua. Spica cylindrica, obtusa, densa, 1-2 poll. longa, nitida, albo-argentea, quandoque subcœrulescens. Spiculae subsessiles, 4-florae, compressae, valvis scariosis, subaequalibus, longe acuminatis: glu-



mis apice lacero-dentatis, scariosis, subaristatis. Involucra brevissima, oblongo-triangularia, denticulata. In monte Pisano, loco vulgo *Pugnano*. Floret Julio. *Peren.*

79 *Cynosurus echinatus*. L. *C. bracteis pinnato-scariosis, longissime aristatis, spica composita, ovata*. Smith. Brit. Gaertner Tab. 1. *Gr. alopecurum spica aspera*. Barr. ic. 123; n. 2. Scheuchz. Agr. p. 80; t. 2; f. 8; b, d. *Gr. spicatum, echinatum, elatius, locustis unam partem spectantibus, spica longiore*. Michel. Herb. et Catal. Gram. Agr. Florent. n. 64. *Ventolana ispida*. Fl. Pis.

Culmus 2-3 pedalis. Fol. striata, superiori superficie scabra: Vaginae glabrae, laxiusculae, ligula lanceolata. Panicula ovata, vel oblongo-lanceolata, ramis angulatis, scabriusculis. 2-3fidis. Spiculae 2-3florae, subsessiles, plures in quavis ramulorum divisione, externe rectae bractea composita ex squamis glumas mentientibus, planis, lanceolato-linearibus, in aristam desinentibus, pinnatim dispositis. Valvae membranaceae aequales, acuminatae, carina, margineque scabrae. Glumae externae nervosae, scabrae, longe aristatae, interiores muticae. Inter segetes frequens. Flor. Junio. *Ann.*

80. *Festuca segetum* Nob. *F. panicula aequali, patente, ramis capillaribus, spiculis glabris nitidis, 3-4 floris, longe aristatis, foliis planis, pilosis*. Fl. Pisan. T. 1; p. 116. t. 1; f. 3, et Giorn. Pisano Tom. 4; p. 231. *Gr. paniculatum arvense latifolium, hirsu-*

tum annuum, locustis, viridibus et aristatis. Michel. Catal. H. Pis. p. 75. Paleo campestre. Fl. Pis.

Culmi a semipede ad duos pedes alti, adscendentes. Fol. latiuscula, plana, striata, scabriuscula, pilosa: vaginis pilosis, ligula brevi truncata, ciliata. Panicula aequalis, patens, pyramidalis, ramis semiverticillatis, alterne dispositis, capillaribus, inaequalibus, scabris, ramosis; Spiculae viridi-argenteae, nitidae, dense dispositae, breviter pedunculatae, 3-4 florum. Valvae inaequales, lanceolato-acuminatae, carina scabra, aristata, arista longa scabra, oculo armato, non exacte terminalis, sed parum infra apicem inserta. Gl. interna minor, angustior, membranacea, diaphana, apice truncato lacero, margine, non ciliato. In Agro Pisauo, communis inter segetes. Floret Junio. Ann.

81. *Festuca serotina*. Lin. Spec. Decand. Fl. Franc. *F. panicula patente, ramis divaricatis, valvis acutis brevibus, glumis lanceolatis subaristatis, viridi nigroque variegatis*. Nob. *Agrostis serotina*. Lin. Will. Persoon. *Gr. paniculatum autumnale minus, arundinis folio et facie, panicula ex viridi nigricante*. Michel. Catal. Hort. Pis. p. 75. *Gr. loliaceum, serotinum, panicula dispersa*. Segnier Veron. 3; p. 146; t. 3; f. 2. Paleo tardivo.

Culmi sesquipediales, erecti, tenues, fe-

re per totam longitudinem vaginis foliorum  
 tecti. Fol. patentia, striata, retrorsum sca-  
 bra, inferiora approximata, sesquipollica-  
 ria, superiora remota, brevissima: ligula  
 nulla: pili pauci ad os vaginae. Panicula  
 2-3 pollicaris, pauciflora, ramis in anthesi  
 patentibus. Spiculae ramis adpressae, 2 5  
 florum, floribus distantibus, basi pilis brevis-  
 simis circumdatis. Valvae breves, inequa-  
 les, acuminatae, albae. Glumae lanceo-  
 latae, externae subaristatae, atro-virides,  
 maculis transversis undulatis, atrovioleaceis  
 pictae. In montibus Pisanis praecipue in  
*Ulliveto*. A Michelio reperta in *Monte Bo-  
 no*, quarto a Florentia lapide. Floret Au-  
 tumno. *Peren.*

Figura quam exhibet Seguiérius minus  
 bona, spiculas enim confusas ostendit, et  
 flores juxta breviores et crassiores.

82. *Festuca bromoides*. L. *F. panicula  
 erectiuscula, secunda, laxiuscula, spiculis  
 levibus, flosculis longissime aristatis*. Per-  
 soon. Sinops. Lamarck illustr. tab 46; f. 4.  
*Gr. paniculatum, bromoides minus, panicu-  
 lis aristatis, unam partem spectantibus*.  
 Pluk. phyt. t. 33; f. 10. *Gr bromoides pa-  
 nicula heteromalla, longioribus aristis dona-  
 ta*. Schenchz. Agrost. p. 290; t. 6; f. 10.  
 Paleo Forasacco. *Fl. Pis.*

Culmi altitudine variant a 4 poll. ad  
 sesquipedem, tenues, erecti. Fol. tenuia,  
 involuta, glabra: Vaginae laxiusculae, fo-  
 liis longiores: ligula brevissima. Panicula

gracilis, laxiuscula, secunda, ad summum bipollicaris, ramis plerumque simplicibus, et solitariis, inferioribus raro geminis et bifidis. Spiculae lanceolatae, distichae, compressae, nitidae, 6-florae, floribus distantibus, subulatis, glumis externis dorso scabris, arista longa terminatis: internis angustis, acutis, margine ciliatis. Valvae inaequales, dorso scabrae, majore trinervia. In arenosis Sylvae Pisanae. Flor. Junio. Ann.

83. *Festuca myuros*. L. *F. panicula secunda nutante, elongata, flosculis subulatis, aristatis, margine scabris, foliis setaceo-subcarinatis, brevissimis*. Smith. Fl. Brit. Leers herb. n. 77; t. 3; f. 5. Roth. Fl. Germ. 2; p. 128. *Gr. avenaceum murorum spica longissima, nutante, aristata*. Moris. H. 3; s. 8; t. 7; f. 43. *Gr. festuceum myurum elatius, spica heteromalla gracili*. Scheuch. Agr. p. 293; t. 6; f. 11. Paleo sottile. Fl. Pis.

Culmi pedales et sesquipedales, vaginis undique tecti. Fol. setacea, radicalia perpauca, brevissima: culmea longiora. Vaginae striatae, glabrae, superior spathacea: ligula brevissima, obtusa. Panicula semipedalis et longior, secunda, nutans, ramis inferioribus ternis vel geminis, altero longiore. Spiculae compressae 5-8 florae. Valvae inaequales, altera minima. Glumae inaequales: externae majores, lanceolato-subulatae, dorso, praecipue versus apicem scabrae, in aristam scaberrimam longam ter-

minatae. Stamen unicum, observavi. Variat glumis pilosis, et tunc est. *Gr. festuceum myurum*, *minori spica heteromella* Scheuchz. Agr. p. 294; tab. 6; f. 12. — Oritur in muris siccis, et terris sterilioribus. *Ann.*

84. *Festuca uniglumis*. Smith. *F. panicula secunda*, *erecta*, *subsimpli*c*i*, *flosculis subulatis*, *compressis*, *aristatis*, *calycis valvula altera brevissima*. Smith Fl. Brit. *Gram. bromoides spicatum maritimum*, *glabrum*, *annuum et strigosum*, *spica heteromalla*, *locustis minoribus*, *longissimis*, *aristatis*. Mich. Cat. H. Pis. p. 76. *Paleo marino*.

Culmi a semipede ad sesquipedem longi, inferne ramosi, adscendentes. Fol. subinvoluta, glabra, striata. Vaginae ventricosae, glabrae; ligula brevis, obtusa. Panicula erecta, 2-4 pollicaris, densa, subunilateralis, pedunculis compressis, angulosis, scabris, inferioribus ramosis. Spiculae erectae, lanceolatae, compressae, 5-8 florum. Valva externa spiculae subaequalis, subulata, compressa, carinata, carina scabra, in aristam capillarem producta: interna minutissima, vix lineae quadrantem longa. Flosculi remoti: Gluma externa valvae majori similis, interna minor, angustior, margine scabra. Communis in arenosis prope mare. Floret Majo. *Ann.*

85. *Bromus arvensis*: L. *B. Panicula patente*, *pedunculis ramosis*, *spiculis lanceolatis octofloris*, *flosculis ellipticis*, *imbri-*

*catis*, *depressis*, *glabriusculis*. Smith. Fl. Brit. Leers Herb. n. 84; tab 2; f. 3. *Festuca graminea effusa juba* Scheuchz. Agr. p 262: tab. 5; f. 15. *Gr. bromoides serotinum annuum*, *panicula rariore*, *magisque sparsa*, *locustis angustioribus*, *purpurescen- tibus*, *glabris et aristatis*. Michel. Catal. Hort. Pis. p. 76. Forasacco campestre.

Culmi a 6-poll. ad 3-ped. alti, basi ra- mosi. Fol. patentia, pilosa, retrorsum sca- bra: Vaginae pilosae, ligula obtusa, laci- niata. Panicula lata, ramis patentibus, te- nuibus, scabris, alterne semiverticillatis, inaequalibus, saepe simplicibus. Spiculae 7-10 florum, ovato-lanceolatae, acutae. Val- vae inequales, ellipticae, glabrae, dorso scabrae, nervis 2-lateralibus approximatis, primum pallide virides, dein subviolaceae, margine membranaceae albae. Glumae ex- terne conformes, aristis longioribus scabris, parum infra apicem in emarginatura inser- tis Glumae internae minores, obtusae, mar- gine ciliato. Frequens haec species in col- libus *Mugellanis*, praecipue prope *Cæno- bium P. P. Cappuccinorum*. A Michelio le- cta in Monte Sinario, et circa Florentiam in aggeribus fossarum veluti extra por- tam vulgo *del Prato*. Reperitur etiam in Agro Pisano. Floret Julio. Ann.

86. *Bromus asper*. Lin. Suppl. B. pa- nicula nutante, ramosa, flosculis lanceola- tis, teretiusculis subnerviis, foliis unifor- mibus hirsutis. Smith. Fl. Brit. Br. ramo-

*sus*. L. Syst. *B. montanus*. Pollich. *palat.*  
*Br. ramosus*. Villars Delph. *Gr. avenaceum*  
*dumetorum*, *juba longiore*, *spica divisa*.  
 Moris. H. 3; s. 8; t. 7; f. 27. *Poa panicula*  
*nutante laxa*, *spicis oblongis multifloris*,  
*sæpe aristatis*. Gmel Fl. Sibir. T. 1; p. 110;  
 t. 21. Forasacco scabro.

Culmi erecti, 3-4 pedales. Fol. plana  
 uniformia, nervosa, pilosa, scabra. Vaginæ  
 saltem inferiores, pilis deflexis hirsutæ. Pa-  
 nicula patens, nutans, ramis ramosis, sca-  
 bris, plerumque binatis, sed quandoque ter-  
 nis et quaternis. Spicula pendula, lineari  
 oblonga, post anthesin triangulares, 5-9flo-  
 ra. Valvæ inæquales, majore nervosa. Glu-  
 mæ externæ carinatæ, obsolete trinerves,  
 pubescentes, dorso fusco-viridi, margine  
 albo-scarioso, sub apice aristatæ: internæ,  
 margine ciliatæ. In argillosis collibus pro-  
 pe *Lorenzana*. Flor. Julio. Biennis.

87. *Bromus mollis*. L. *B. panicula ere-*  
*cta coarctata*: *pedunculis ramosis*, *spiculis*  
*ovatis*, *flosculis imbricatis*, *depressis ner-*  
*vosis*, *pubescentibus*. Smith. Fl. Brit. Leers  
 herb. n. 82; t. 11; f. 1. *Gr. avenaceum pra-*  
*tense*, *gluma brevior squarrosa*, *et villosa*,  
 Moris. H. 3; s. 8; t. 7; f. 18. *Gr. avena-*  
*ceum*, *locustis villosis*, *angustis*, *candican-*  
*tibus et aristatis*. Scheuch. Agr. p. 254; t.  
 5; f. 12. Forasacco pelofo. Fl. Pis.

Culmus erectus, 2-3 pedalis. Fol. stri-  
 ta, villosa, scabriuscula: Vaginæ villosæ:  
 ligula triangularis, obtusiuscula, lacera. Pa-

nicula erecta, densa, 2-3 pollices longa, ramis simplicibus et ramosis, inæqualibus, alterne semiverticillatis, pubescentibus, angulatis. Spiculæ erectæ, ovato-acutæ, 5-10 florum, flosculis imbricatis. Valvæ inæquales, mucronatæ, multinerviae, dense pubescentes, nervis viridibus, validis, margine scarioso albo. Glumæ conformes, externæ apice bifido, aristatæ, arista aequali. Gl. internæ angustiores, margine ciliato. In pratis frequens. Floret Majo. *Ann.*

88. *Bromus rubens*. L. *B. panicula fasciculata, spiculis subsessilibus, villosis, aristis erectis*. Lin. *Festuca rubens*. Persoon. *Gr. panicula molli rubente*. I. B. Hist. 2; p. 464. *Gr. bromoides murorum lanuginorum erectum, locustis amplioribus aristatis, in panicula compacta prope modum spicata, et veluti alopecuroide dispositis* Michel. Catal. H. Pis. p. 76. Forasarco granatino.

Culmus 6-8 poll. altus, basi plerumque ramosus, vaginis fere per totam longitudinem tectus. Fol. striata, pilis brevibus, mollibus utrinque pilosa: Vaginæ similiter pilosæ: ligula brevis, ciliata. Panicula pollicaris vel 2-pollicaris, densa et veluti fasciculata, ramulis brevissimis, simplicibus vel bifidis, 6-7 in quovis semiverticillo. Spiculæ 8-10 florum, erectæ, compressæ. Valvæ lanceolato-acuminatæ, inæquales, dorso striato et piloso. Glumæ externæ conformes, marginibus scariosis, arista breviori, parum infra apicem inserta. Reperitur in muris siccis et in collibus glareosis. *Ann.*



89. *Bromus ligusticus*. Allion. *Br panicula contracta, nutante secunda, pedunculis dilatatis, valvula calycina altera vix conspicua*. Nob. Viviani Annal Botan. v 2. p. 145. Bivona Centur. *Gr. bromoides festucea, tenuique panicula minus*. Scheuchz. Agrost. p. 296; t. 6; f. 13. Barrel. ic 76. n. 2. Forasacco ligure.

Var.  $\beta$  major.

Culmus pedalis et sesquipedalis, gracilis, adscendens. Folia striata, externe glabra. interna superficie pilosa. Vaginæ glabræ, striatæ: ligula brevissima. Panicula 1-4 pollices longa, contracta, unilateralis, nutans, ramis inæqualibus, geminatis, ramosis. Spiculæ 3-5 floræ, compressæ, distichæ, nitidæ, pedunculatæ, pedunculis, compressis, dilatatis. Valva externa spiculæ subæqualis, subulata, in brevem aristam terminata, striata, dorso scabra: Valva altera minutissima, nudo oculo vix conspicua. Gluma externa, arista terminali striata, 2-3 lin. longa: interna minor, margine ciliato. In muris, tectis, et agris incultis. Floret Julio. Ann.

Figura Barrelierii, auctoritate Scheuchzeri citatur. sed reapse speciem non bene repræsentat.

Var  $\beta$  major. *Gr. bromoides pratense annuum minus, panicula lata, speciosa heteromalla aristata* Mich. Cat. et Herb. Gram. Agri Florent. n. 131. *Gr. festuceum pumilum, panicula heteromalla, locustis majoribus, longius aristatis*. Scheuchz. Agr. p. 298.

Differt culmo altiore, panicula magis expansa, spiculisque majoribus, nec non pedunculis scaberrimis.

90. *Bromus Michellii*. Nob. *B. panicula contracta, secunda, spiculis 4-floris, floribus subulatis, pedunculis linearibus*. Nob. *Gr. bromoides annuum minus, capillaceo folio, glabrum, panicula contractiore, locustis minimis aristatis, e glumis tenuissimis conflatis*. Mich. Cat. et Herb. Gram. Agr. Florent. n. 130, et Cat Hort. Pis. p. 76. Forasacco micheliano.

Culmus pedalis, teres, glaber, supra medium nudus. Folia angusta, striata, superne pilosa, inferne glabra. Vaginæ folio longiores, glabræ, striatæ: ligula brevissima, obtusa. Panicula pollicaris et sesquipollicaris, contracta, unilateralis. Rami paniculæ inæquales, tres et plures simul, ramosi; superiores gemini, simplices. Spiculæ 4-floræ, distichæ, nitidæ, stramineæ, pedicellis linearibus. Valvæ inæquales: major longitudine spiculæ, lanceolato-acuminata, obsolete nervosa, dorso scabra, margine scarioso: altera angustissima, longitudine, vix quartam spiculæ partem adæquante. Gluma externa lanceolato-subulata, superna dorsi parte scabra, margine scariosa, apice bifida, paulo infra apicem arista mediocri scabra instructa. Gl. interna minima, apice 2-fida, margine ciliata. In Agro Florentino. Ex Herb. Micheliano. — *Facies Bromi ligustici*.

91. *Bromus sterilis*. L. *B. panicula* nutante, subsimplici, flosculis lanceolatis, nervosis, sulcatis, foliis pubescentibus. Smith. Leers Herb. n. 33; t. 11; f. 4. *Gr. avenaceum* panicula sparsa, locustis majoribus et aristatis. Schenchz. Agrost. p. 258; t. 5; f. 14. *Gr. bromoides* annuum, caule pedali, locustis majoribus compressis, lanuginosis et aristatis Michel. Catal. Hort. Pis. p. 75. *Gr. bromoides* annuum præcox, caule pedali vix se sustinente, foliis glabris, pilosis, mollibus, duas lineas latis, panicula sparsa, locustis pilosis, simul cum aristis duas cum dimidium uncias longis. Mich. Herb. et Catal. Gram. Agri Florent. n. 146. Forasacco sterile. *Fl. Pis.*

Culmi 1-4 pedales. Folia nervosa, pilis mollibus utrinque tecta, scabra. Vaginæ nervosæ, pilosæ, pilis deflexis: ligula triangularis, lacera. Panicula semipedalis, et pedalis, laxa, ramis fere semper simplicibus et 1-floris, 3-6 in quovis semiverticillo, inaequalibus, scabris, nutantibus, parum sub spicula incrassatis. Spiculæ 6-8 floræ, sesquipollicares, aristis non computatis, nutantes, primum lanceolatae, in florescentia triangulares. Valvæ inaequales, acuminatae. Glumæ externæ pubescentes, scabræ margine albo-scarioso, nervisque septem instructæ, quorum dorsalis et marginales fortiores. Arista rigida, scabra, longior, ex emarginatura glumæ externæ exorta. Glu. interna minor, margine ciliata. Com-

munis inter segetes et in sepibus. Floret Majo. Ann.

92. *Bromus diandrus*. Smith. *B. panicula erecto-patente, sub-ramosa, flosculis lanceolatis nervosis, sulcatis, diandris*. Smith. *Br. madritensis*. Lin. *Br. madritensis*. Cavanil Plant. Hisp. *Br. maximus*. Desfont. Fl. Atlant. *Br. sterilis, erecta panicula major*. Barrel. ic. 76; n. 1. *Festuca avenacea sterilis, paniculis confertis, erectioribus, aristis brevioribus*. Pluk. phyt. t. 299; f. 2. *Festuca graminea annua, spicis erectis*. Morris H. 3; s. 8; t. 7; f. 13. *Gramen bromoides, pumilum, locustis erectis, majoribus aristatis*. Scheuchz Agrost. p. 260. *Gr. bromoides annuum caule pedali, locustis compressis glabris et aristatis*, Michel. Cat. H. Pis. p. 76. Catal. et Herb. Gram. Agr. Flor. n. 148. Forasacco ordinario.

Distinguitur a *Bromo sterili* statura minore, pedunculis brevioribus erectis; valvis et glumis scabris sed minime pilosis, nervis debilioribus: floribus diandris. Folia intendum sunt glabra, sed saepius pilis longis tecta: ligula obtusa, lacera. Cum praecedenti. Ann.

*Bromus maximus*. Desfont. F. Atl. et *Bromus madritensis*. Cavanil. licet tribus staminibus instructi, ad hanc speciem pertinere videntur.

Fig. t. 26. Barrel. Persoonius ad *Festucam stipoidem* (*B. stipoidem*. L.) refert, minus accurate. Primo enim ei similis

non est, et Scheuchzerus ait, hanc Barrelierii figuram repraesentare suum *Gramen bromoides pumilum &c.* Agrost. p. 260; cuius exemplar a Scheuchzero ad Scherardum missum, in Scherardii herbario Smithius observavit, agnovitque ad *B. diandrum* pertinere.

93. *Bromus pinnatus*. L. *B. spica simplicis erecta, disticha, spiculis sessilibus teretiusculis, aristis gluma brevioribus, foliis nudiusculis*. Smith. Fl. Brit. Bertol. Pl. rar. Genuens. *Gramen sparteum, spicata Brizæ panicula et corniculata*. Barrel. ic. 25. Forasacco pennato. *Fl. Pis.*

Culmi 2-3 pedales, erecti. Fol. plana, latiuscula, laeviter pubescentia, striata, scabra: vaginae striatae, pubescentes: ligula obtusa, ciliata. Spica erecta, 3-6 poll. longa, spiculis sessilibus distichis, lineari-lanceolatis, erectis. Valvae subaequales, lanceolato-acutae, nervosae, pubescentes, mucronatae. Glumae conformes, externae, arista terminali brevior, quandoque brevissima. Gluma interna margine ciliata. Communis in locis montosis, sepibus, et nemoribus. Floret Julio. *Peren.*

94. *Bromus distachyos* L. *Br. spiculis sessilibus, erectis, compressis, approximatis, arista terminali*. Bertol. Pl. rar. Gen. Gr. *spica Brizæ minus*. C. B. P. p. 9. Prod. p. 19. Forasacco gracile. *Fl. Pis.*

Culmus semipedalis et pedalis, adscendens, basi ramosus. Fol. breviora, acumi-

nata, striata, pilosa, ciliata, scabra. Vaginae striatae, glabriusculae, ligula brevi, obtusa, ciliata. Spiculae 2-lanceolatae, sessiles, rigidae. Valvae lineari-lanceolatae, nervosae, scabrae inaequales acuminatae. Glumae conformes: externae in aristam longiorem terminatae: internae valide ciliatae.

*Var. 8 Br. polystachyos.* Lam. Illustr. *Festuca gracilis paucis utriculis.* Barrel. ic. 83, f. 2. Reperitur in collibus aridis, et in muris siccis. *Ann.*

95. *Avena elatior.* L. *A. glumis inaequalibus glabris, flosculo hermaphrodito superiore submutico, masculo arista geniculata.* Smith. Flor. Brit. Sub *Holco avenaceo.* Leers herb. n. 8; t. 10; f. 4. *Gr. avenaceam elatius juba argentea longiore.* Morris. Hist 3; s. 8; t. 7; f. 37. *Gr. avenaceum elatius juba longa splendente.* Scheuchz. Agr. p. 239. Vena maggiore. *Fl. Pis.*

Culmus 4-pedalis et altior, foliis striatis, scabris, ligula brevissima, denticulata. Panícula semipedalis et pedalis, contracta, ramis semiverticillatis, nutans. Valvae inaequales, scariosae, nitidae, acuminatae, carina denticulatae, majore trinervia. Flores 2, subaequales, glumis nervosis, pubescentibus, basi pilosis, altero masculo basim versus aristato, arista tortili geniculata, fuscescente, longiore: hermaphrodito superiore vel mutico, vel gluma in mucronem desinente, vel brevissime aristato, arista paulo infra apicem glumae inserta. *Gl.*

internae tenuissimae, angustiores. — Variat radice bulbosa, ramisque paniculae brevissimis. *Gramen nodosum*, *avenacea panicula*. C. B. Pin. 2. Scheuchz. Agrost. p. 237. In nemoribus frequens. Floret Junio. *Peren.*

96 *Avena flavescens*. L. *A. panicula ramosissima laxa*; calycibus subtrifloris inaequalibus, receptaculis pilosis, foliis planis subpubescentibus. Smith. Brit. Bertol. plant. rar. Gen. Leers herb. n. 93; t. 10; f. 5. *Trisetum pratense*. Persoon Synops. *Gr. avenaceum pratense*, *elatus*, *panicula flavescens*, *locustis parvis*. Scheuchz. Agrost. p. 223; t. 4; f. 18. *Gr. avenaceum spica sparsa flavescens*, *locustis parvis*. Moris. Hist. 3; s. 8; t. 7; f. 42. Vena giallognola. *Fl. Pis.*

Culmus adscendens tenuis, glaber, striatus. Fol. brevia, angusta, acuminata, striata, interna superficie villis brevibus obsita, externa plerumque glabra. Vaginae longae striatae, inferiores quandoque villosae: ligula brevis truncata, lacera. Panicula ramosissima, post anthesim contracta, pedunculis alterne semiverticillatis, flexuosis. Spiculae compressae, nitidae. Valvae flavescens, carina scabra, acuminatae, altera duplo majore, trinervia. Flosculi plerumque tres, subremoti. Rachis pilosa. Glumae florales apice bifidae, externa dorso pallide viridi, apice lutescente, margine albo, dorso aristata. Arista, gluma duplo longior,

scabra, geniculata. Gl. interna membranaea, candida, paulo minor, — Multum variat statura, ramificatione et expansione paniculae. In collibus Mugellanis. Floret Majo. Perenn.

97. *Avena neglecta*. Nob. *A. panicula densa*, spiculis glabris, nitidis, subsexfloris, glumis apice bifidis, foliis planis, pilosis, mollibus. Nob. Fl. Pis. T. 1; p. 132. tab. 1; f. 4. An. *Gr. alopecuroides maximum?* Scheuchz. Agrost. p. 247; t. 5; f. 6. *Gr. spicatum maritimum serotinum*, hirsutum, minus, spica breviori molli et laxa, locustis ex albo et viridi variegatis et aristatis. Michel. Cat. H. Pisan. p. 72. *Avena foliis hirsutis, panicula striffa, locustis trifloris, gluma interiori bifida, arista exterioris floris longitudine*. Haller. suppl. ad Agr. Scheuchz. n. 18. *Trisetum hispanicum* & *pisanum*. Persoon. Synops. Vena biancastra. Fl. Pis.

Caules basi ramosi, tenues adscendentes, a 2-poil. ad 2-pedes alti. Folia plana, striata, molliter pilosa. Vaginae pilosae: ligula brevis, obtusa, lacera. Panicula pollicaris et semipedalis, pyramidalis, densa, ramulis alterne semiverticillatis, ternis, medio longiore. Spiculae compressae, nitidae, viridi et argenteo variegatae, subquadriflorae ut plurimum, raro subsexflorae. Valvae inaequales, dorso virides, margine albo membranaceo, acuminatae, carina ciliatae. Glumae conformes, apice bifidae, externa



supra dorsi dimidium aristata, arista pallida, tenui, subgeniculata, glumae subaequali. Communis in Agro Pisano. Floret Junio. Ann.

98. *Avena pratensis*. L. *A. spica erecta*, calycibus subquinquefloris, receptaculis pilosis, foliis involutis, serrulatis, nudis. Smith Fl. Brit. Leers Fl. Herb. n. 92; tab. 9; f. 1. Fl. Dan. tab. 1083. *Gr. avenaceum angustifolium*, alpinum, spicata panicula, ex purpureo viridi et argenteo variegata. Scheuchz. Agrost. p. 230. *Gr. avenaceum alpinum*, glabrum, angustifolium, locustis aristatis in spicam dispositis. Scheuchz. Agrost. p. 228; t. 4; f. 21, 23. Vena pratensis. Due Cent.

Culmi pedales et bipedales. Fol. glauco-viridia, striata, marginibus scabra, convoluta; ligula acuminata. Spica 2-4 poll. longa, spiculis binatis, altera sessili; vel ternis, et tunc 2-sessiles, altera pedunculata, inferioribus remotioribus. Valvae inaequales acuminatae, carinatae, trinerviae, nitidae, maturitate pubescentes. Flosculi 3-5 insidentes rachi pilosae, pilis ad basin flosculorum longioribus. Glumae externae nervosae, scabriusculae, acuminatae, apice membranaceae, lacerae, supra medium dorsi aristatae, arista longa, divaricata, inferne purpurascente. Gl. interna minor, minute ciliata. In collibus aridis, prope pagum dictum Capalbio in maritimis Senensis provinciae. Floret Junio. Peren.

99. *Avena spicata*  $\beta$  *calycina*. L. *A. calycina*. Villars. *A. spicata*, calycibus spiculis 5-floris longioribus, gluma florali externa, apice aristata, furcataque. Villars Fl. Delph. T. 2; p. 148; tab. 2; f. 9, rudis. *Danthonia provincialis*. Decand Fl. Franc. Gr. avenaceum erectum annuum glumis parvis aristatis, in amplo calice reconditis. Mich. Cat. et Herb. Gram. Agri Florent. n. 133 — Catal. Hort. Pisan. p. 74. Monti prod. fig. Vena spigata. Fl. Pis.

Culmus adscendens, pedalis et bipedalis. Fol. angusta, acuminata, striata, superne scabriuscula, ligula nulla, sed pili albi ad os vaginae, quorum marginales longiores, patentes. Spiculae 4-5, approximatae in spicam, breviter pedunculatae, 4-5-florae, quandoque 6-florae. Valvae spiculae longiores, pallide virides, saepe subviolaceae, glabrae, nitidae, subaequales, acuminatae, obsolete nervosae, carina scabriusculae. Glumae externae basi pilosae, margine ciliatae, apice emarginato-bimucronatae, arista e sinu prodeunte, gluma, longiore, medietate inferiore contorta, fulva, nitida, pilosa, superne viridi, filiformi. Glumae internae minores, ovato-acuminatae. Floret Majo. In Apennino Mugellano, loco dicto il Giogo di Scarperia primum reperi: posterius nonnulla individua in monte Pisano prope Ripam-fractum, demum copiose in Horto PP. Capucinatorum prope Vicum S. Laurentii. Ann.

Nil differt ab *A. spicata americana*,  
cujus exemplar possideo ex dono celeberrimi  
Botanici Jo. Daniel Schreberi.

100. *Avena fragilis*. L. *A. spica tere-  
ti fragili*, calycibus 4-floris, flosculis di-  
stantibus. L. Gr. loliaceum, spurium hirsu-  
tum, aristis geniculatis. Barrel. ic. 905; f.  
1, 2, 3. Gr. loliaceum, lanuginosum, spi-  
ca fragili articulata, glumis pilosis (et glu-  
mis glabris), articulatis. Schenckz. Agrost.  
p. 32, et 33. Vena fragile. Fl. Pis.

Culmi tenues, adscendentes, pedales,  
et bipedales. Fol. brevia, angusta, acumi-  
nata, striata, pilosa, scabra. Vaginæ stria-  
tæ et pilosæ; ligula brevissima, obtusa, den-  
ticulata. Spica tenuis 4-10 pollicaris, rachi  
articulata, in articulis fragilis. Spiculæ 4-5-  
6 floræ, articulis longiores. Valvæ inæqua-  
les, nervosæ, scabræ, dorso pallide virides,  
margine scarioso albo, vel amethystino.  
Glumæ externæ supra dorsum dimidium ari-  
statæ, arista tenui geniculata longiore. Gl.  
internæ paullo breviores et angustiores, mem-  
branaceæ, margine acuto armato, denticu-  
latæ. Variat valvis glabris, vel pilosis. Com-  
munis in muris, tectis, et in solo argillo-  
so. Flor. Junio. Ann.

101. *Arundo colorata*. L. *A. calyci-  
bus unifloris*, corollam æquantibus, pani-  
cula erecta, glomerata, floribus secundis  
muticis, foliis planis. Smith. Fl. Brit. Pha-  
laris arundinacea, Lin. - Fl. Pis. - Fl. Dan.  
t. 259. Leers Herb. n. 49; tab. 7; f. 3. Gr.

*aquaticum paniculatum phalaridis semine*. Scheuchz. Agr. p. 125; t. 3; f. 4. a, b, c. Canna scagliola.

Culmus 4-5 pedalis; erectus. Fol. plana, striata, glabra, margine in superficie superiore deorsum scabro: Vaginæ glabræ, striatæ: ligula triangularis, obtusiuscula, crenulata, vel lacera. Panicula erecta, lobata, ramis alternis, geminatis, vel solitariis, ramosis, angulatis, scabris. Flores dense dispositi, secundi. Calyces 1-flori. Valvæ subæquales, compressæ, acuminatæ, albicantes, nervo dorsali, et 2-lateralibus viridibus. Glumæ calyce paullo breviores, subæquales, altera latior, pilosæ, pilis ad basin longioribus. In paludibus et secus fossas frequens. Floret Majo. Peren.

102. *Arundo arenaria*. L. *A. calycibus uniformis, corolla longioribus, panicula spicata, floribus erectis, muticis, foliis involutis, pungentibus*. Smith. Fl. Brit. Fl. Dan. t. 917. *Calamagrostis arenaria*. Roth. Fl. Germ. *Gr. spicatum secalinum maritimum, maximum, spica longiore*. Scheuchz. Agr. p. 138; t. 3; f. 8; a, b, c. Canna marina. Fl. Pis.

Culmus pedalis et bipedalis. Fol. erecto-patentia, rigida, involuta, pungentia, interna superficie sulcata, striis ex pilis brevissimis confectis, altera superficie glabra: ligula elongata, acuminata, plerumque bipartita. Panicula in spicam contracta, ramulis flexuosis. Flores erecti, pedicellis sca-

bris. Calyces 1-flori. Valvæ subæquales, compressae, lanceolato-acutae, glabrae, nervo dorsali scabro, nervisque 2-lateral; albido-glaucescentes, vel purpurascentes, flosculo longiores. Glumae basi pilis candidis, triplo circiter brevioribus cinctae, inaequales, acutae, scabrae, nervosae, majori apice erosa. In arenosis maritimis. Flor. Julio. *Peren.*

103. *Arundo ampelodesmos*. Ciril Plant. rar. R. Neapolitani Fasc. 11. *A. foliis radicalibus planis, caulinis convolutis, calycibus subquadrifloris, glumis subaristatis*. N. *Arundo festucoides*. Desfont. Fl Atlant. T. 1; p. 108; tab. 24. *Arundo tenax* W. Gr. *avenaceum altissimum glabrum, foliis asperis, panicula pene aristata, glumis ad basin villosis, caule pleno, rigido*. Michel. Cat. Pis. p. 74. Canna Saracchio. *Due Cent.*

Culmus 4-5pedalis, cylindricus, firmus. Fol. rigida, radicalia plana, erecta, caulina convoluta, externe atroviridia, glabra, nitida, interna superficie pallidiora, striata, scabra. Vaginæ glabrae: ligula longa, apice lacera. Panicula magna, patens, subsecunda, ramis ramosis scabris. Calyc. plerumque 4-flori, valvis inæqualibus, acuminatis, dorso scabris, cœterum glabris, violaceis, margine scarioso-argenteo. Glumae inaequales, externa majori, nervosa, apice subaristata, dorso basique pilosa: altera glabra, apice leviter bifida. In collibus maritimis Provinciae inferioris Senensis. Flor Majo et Junio. *Peren.*

104. *Arundo Phragmitis*. L. *A. calycibus 5-floris*, *panicula laxa* L. Leers Herb. n. 94; t. 7 f. 1. *Arundo vulgaris palustris* I. B. Hist. 2; p. 485. Moris H. 3; s. 8; t. 8; f. 1. *Arundo vulgaris seu phragmitis Dioscordis*. Scheuchz. Agr. p. 161; t. 3; f. 14; d. *Canna spazzola*. Fl. Pis.

Culmus 8-10 pedalis, erectus, teres, fistulosus. Fol. plana, patentia, lanceolata, acuminata, striata, lævia, margine scabra. Vaginae glabræ; ligula brevissima, pilis longis, patentibus ciliata. Panicula patens, ramulis capillaribus, scabriusculis. Spiculæ 4-6 floræ, nitidæ, subviolaceæ. Valvæ lanceolato-acuminatae, inaequales, majore trinervia. Glumæ inaequales, externa triplo longior; lanceolato-subulata: interna retusa, pilis sericeis longis circumdatae. Communis secus fossas, in paludibus, et pratis hyeme inundatis. Floret Julio. Peren.

105. *Lagurus ovatus*. Lin. *L. spica ovata villosa*. L. Gaertn. Tab. 1. *Alopecurus spica rotundiore*. Moris. Hist. 3; s. 8; t. 4; f. 1. *Gr. alopecurum molle*, *spica incana*. Barrel, ic. 116; n. 12 *Gr. spicatum tomentosum*, *longissimis aristis donatum*. Scheuchz. Agr. p. 58; t. 2; f. 4 B. C. *Piu-mino ovato*. Fl. Pis.

Culmus tenuis, ascendens, pedalis. Fol. striata, pilosa, mollia. Vagina superior ventricosa: ligula obtusa, ciliata. Cal. 1-florus. Valvæ æquales, lineari-lanceolatae, in longam aristam productæ, pectinato ciliatæ.

**Glumae** inaequales: major lanceolata, carina pubescente, apice 2-aristata, aristis rectis, glumae subaequalibus, tertiaque aristata dorsali geniculata, duplo longiore. Gluma minor apice bipartita. In arenosis maritimis inter Arnum et Auserim, et circa Liburnum, ubi a Scheuchzero repertus. Floret Majo. Ann.

106. *Lolium* perenne. Lin. *L. spica mutica*, spiculis calyce longioribus, flosculis lanceolatis. Smith. Fl. Brit. Leers Herb. n. 97; t. 12; f. 1. *Gr. loliaceum spica simplici*, vulgare. Moris, H. 3; s. 8; t. 2. f. 2. *Gr. loliaceum*, angustiore folio et spica. Scheuchz. Agr. p. 25. Gioglio perenne. Fl. Pisan.

**Calmus** adscendens, pedalis et altior, glaber. Fol. striata, superne scabra: vaginae striatae et scabrae: ligula brevis truncata. Spica disticha; spiculae alternae in eodem plano cum rachi glabra et scrobiculata positae, latere in scrobiculo inserto. Cal. 1-valvis. Valva glabra, lanceolato-acuta, nervosa. Spiculae calyce duplo longiores, compressae, distichae, 7-11 florum, lanceolatae. Gluma externa glabra, lanceolata, nervosa: Gl. interna paullo minor, margine oculo armato, ciliata. Commune in aggeribus. Flor. Majo et Junio. Peren.

Var. 1. *Gr. loliaceum spicis brevioribus et latioribus compressis*. Moris Hist. 3; s. 8; t. 2; f. 2. *Gr. loliaceum spica lata, e plurimis spicis duplici versu dense dispositis*.

*constante*. Scheuchz. Agrost. p. 29. Prod. t. 2. In Herb. et Catal. Agri Florent. Michellii n. 11.

107. *Lolium temulentum*. Lin. *L. spica aristata*, *spiculis calyce brevioribus*, *flosculis ellipticis*, *culmo superne scabro*. Smith. Fl. Brit. Leers herb. n. 98; t. 12; f. 2. Fl. Dan. t. 160. Gioglio zucco. *Fl. Pis.*

Culmus 2-3 pedalis. Fol. striata, superne scabra: Vagine scabriusculae, ligula brevis, obtusa. Rachis scabra. Valva linearilanceolata, acuta, mutica, nervosa, scabra. Spiculae 6-9 florum, turgidiusculae, calyce plerumque breviores. Gluma externa ovata, vel elliptica, scabra, obsolete nervosa, paulo infra apicem aristata, arista recta, longiore. Gl. interna minor, oculo armato, subciliata. Inter segetes: Floret Julio. *Ann.*

108. *Lolium arvense*. Smith. *L. spica submutica*, *spiculis longitudine calycis*, *flosculis ellipticis*, *culmo glaberrimo*. Smith. Fl. Brit. *Lolium verum Gesneri*. Moris. H. 3; s. 8; t. 2; f. 1. *Gr. loliaceum annuum*, *lolio vulgari simile*, *sed minus*, *spica non aristata*. Mich. Cat. Hort. Pis. p. 71. Gioglio campestre.

Culmus pedalis. Fol. striata, superne scabra. Vaginae glabrae ligula brevissima truncata. Spica glabra. Valva lanceolato-acuta, nervosa. Spiculae 4-8 florum, longitudine calycis, vel paulo longiores. Glumae externae, ovato, lanceolatae, obsolete nervosae, parum infra apicem arista breviss-



sima alba, instructae. Gl. internae minores, glabrae. Inter segetes. Floret Majo. *Ann.*

109. *Ægilops triuncialis*. — *Æ. spica cylindrica*, calycibus superioribus biaristatis, reliquis triaristatis, aristis florum binorum terminalium, reliquis duplo longioribus. W. Gr. spicatum durioribus et crassioribus locustis, spica longissima. Scheuch. Agr. p. 12. Vaill. paris. t. 17; f. 1. *Egilo-  
pe maggiore*.

Culmus pedalis et sesquipedalis. Fol. plana, striata, scabra, pilosa. Vaginae striatae, inferiores pilosae, superiores glabrae: ligula brevissima. Spica cylindrica, 3-4 pollicaris. Cal. plerumque biflorus. Valvae crassae, durae, striatae, scabrae, hirtae. Aristae valva multo longiores: florum superiorum longissimae, duae in valvis inferioribus, in cœteris tres, subpatentes, rigidae, rufescentes. In montibus siccis. Floret Junio. *Bien*

110. *Secale villosum*. L. *S. glumarum ciliis villosis, squamis calycinis cuneiformibus*. Lin. Segale peloso. *Fl. Pis.*

Culmus 2-4 pedalis, erectus. Fol. striata, pilosa, scabriuscula: Vaginae laxiusculae, striatae, glabrae. Spica 2-pollicaris. Spiculae 3-4 florum. Valvae cuneiformes, nervosae, virides, margine scarioso, albo, glabrae: nervo dorsali pilis albis patentibus ciliato, et in aristam scabram, rectam, triplo longiorem producto. Glumae externae lanceolatae, nervosae, glabrae, suprema

tantum dorsi parte ciliata, arista duplo longiori. Gluma interna membranacea, angusta, mutica, retusa. Flores 2-superiores submutici, plerumque steriles. In maritimis, praecipue inferioris Senensis provinciae. Floret Majo et Junio. *Ann.*

111. *Triticum repens*. L. *T. calycibus subulatis, multinervis, quinquefloris, flosculis acuminatis, foliis planis, radice repente*. Smith. Fl. Brit. Leers Herb. n. 95; t. 12; f. 3. *Triticum caninum vulgatius*. Moris. H. 3; s. 8; t. 1; f. 8. Grano graminigina. *Fl. Pis.*

Radix longa repens. Culmus 2-3 pedalis, erectus. Fol. viridia, plana, striata, supra pubescentia et scabra: subtus glabra laevia. Vaginae arctae, ligula brevissima, truncata. Rachis compressa, scabra articulata. Spicula 4-florae, sessiles, articulo longiores, scabrae. Valvae subaequales, lanceolato-acuminatae, nervosae, spicula paulo breviores. Glumae conformes: internae ciliatae. In campis et ad vias frequens. *Peren.*

Datur varietas in arenosis tota glauco-virescens, culmo proceriori, spiculis 8-9 floris; latioribus, approximatis, flosculis aristatis. An ad *Triticum repens* & *glaucum*. Persoon Synops. referenda?

112. *Triticum junceum*. L. *T. calycibus truncatis quinquefloris, foliis involutis, mucronato-pungentibus*. Smith. Fl. Brit. Fl. Dan. t. 196. *Gr. maritimum spica lodicea, foliis pungentibus nostras*. Pluck.

Phyt. t. 33; f. 4. Grano rucolo. *Fl. Pis.*

Culmus adscendens, pedalis, tenax, striatus. Fol. erecto-patentia, involuta, rigida, pungentia; supra striis pilosis, subtus glabra: vaginæ arctæ, glabræ: ligula brevissima, truncata. Spica 4-5 pollicaris, erecta, tota glabra. Rachis compressa, articulata, glabra. Spiculæ sessiles, 5-6 floræ, compressæ, articulis longiores. Valvæ subæquales dimidiam spiculæ longitudinem superantes, lanceolatæ, obtusæ, nervosæ, glabræ. Glumæ conformes, apice truncatæ vel denticulatæ: internæ paullo breviores, oculo armato, ciliatæ. Planta glauca. In arenosis maritimis. Floret Julio. *Peren.*

113. *Triticum festucoides*. Bertol. *T. spica secunda simplicì, spiculis subsexfloris, aristatis, calycibus muticis*. Bertol. *Pl. rar. Gen. Festuca maritima*. Lin. *Spec. Triticum hispanicum*. Reich. Wild. Persoon. Viviani *Annal.* Vol. 2; p. 152; tab. 3; f. 2. Grano paleino.

Culmi tenues, adscendentes, 2-8 pollicares. Fol. striata glabra, convoluta, brevissima. Vaginæ striatæ: ligula brevis, obtusa, lacera. Spica tenuis, 1-4 pol. longa, rachis flexuosa, angulosa. Spiculæ subsessiles, alteræ, distichæ, compressæ, ovato-lanceolatæ, 4-6-7 floræ, glabræ, valvis ovatis muticis, glumis externis arista tenuissima, lineari, terminatis. In Monte Pisano prope Capronam. Floret Majo. *Ann.*

114. *Triticum maritimum*: L. *T. cal-*

*mo et spica ramosa: spiculis sessilibus compressis, lineari-lanceolatis, flosculis muticis*. Viviani Annal. Bot. T. 2; p. 188. *Gr. maritimum, panicula loliacea*. C. B. Prod. p. 19; n. 63; ic. p. 18. *Gr. loliaceum panicula ramosa maritimum*. Scheuchz. Agr. p. 127; t. 6; f. 5. Grano marino. *Fl. Pis.*

Culmi semipedales, adscendentes, ramosi, purpurascens, geniculis, obscure rubris. Fol. striata, supra scabriuscula: vaginæ laxæ, striatæ, glabræ, inferiores purpurascens, ligula brevi truncata, denticulata. Spica ramosa, vel potius panicula, ramis compressis: Spiculæ sessiles, 5-7 floræ, lanceolatæ, acutæ. Valvæ subæquales, nervosæ, acutæ, spicula plusquam dimidio breviores. Glumæ conformes. In arenosis maritimis. Florct Majo et Junio. *Bien.*

115. *Triticum unilaterale*. Lin. Mant. *T. spiculis ovato-lanceolatis, unilateralibus, calycibus corollisque obtusis, muticis, rachi flexuosa*. Vivian. Annal. T. 2; p. 149. t. 3; f. 1. *Triticum loliaceum*. Smith. Fl. Brit. Wild. Spec. plant. - Bertol. pl. rar. Gen. *Poa loliacea*, Persoon Synops. *Gr. exile duriusculum maritimum, foliolis circumvolutis, junceis, brevibus*. Pluk. Phyt. t. 32; f. 7. *Gr. parvum marinum spica loliacea*. Moris. H. 3; s. 8; t. 2; f. 6. *Gr. exile duriusculum maritimum*. Scheuchz. Agrost. p. 272; t. 6; f. 4. Grano unilaterale.

Culmi 2-6 poll. alti, simplices, vel basi ramosi, subcompressi, obscure spadicei.

Fol. linearia, glabra, striata: vaginæ laxiusculæ striatæ, glabræ, ligula brevis, truncata. Spica simplex, secunda, rachi compressa, flexuosa, altero latere alterne sinuata, sinubus spiculas excipientibus. Spiculæ distichæ, lanceolatæ, compressæ, approximata, subsessiles, pedunculo crasso subcuneiformi, plerumque solitaria, interdum inferiores geminata, 4-8 floræ, valvis muricis margine scariosis, subæqualibus, nervosis, acutiusculis. Glumæ conformes sed obtusæ. Facies *Poa*. In planta culta culmi altiores evasere, et nonnullæ spicæ basi ramosæ. *Ann.*

Reperii hanc speciem inter scopulos marinos prope *Talamonem* anno 1789, et quamvis synonyma et icones Pluknetii, et Scheuchzerii, eam esse. *T. unilaterale* Lin. suaderent, tamen ausus non sum eam in meis *Centuriis* inserere, eo quod cæteri Botanici valde dissentire viderentur. Vivianius tandem plantæ istius synonymiam optime illustravit.

116. *Lappago racemosa*. W. *L. panicula spicata*, *glumis muricatis*, *setis ciliatibus*. W. *Cenchrus muricatus*. Lin. *Gr. caninum maritimum asperum*. C. B. Prod. 2. ic. Moris. H. 3; s. 8; t. 2; f. 4. *Gr. caninum maritimum spicatum*, *echinatis glumis*. Barrel. ic. 718. *Gr. caninum maritimum spica echinata*. Scheuchz. Agr. p. 76; t. 2; f. 7; c, d. *Lappagine echinata*.

Culmus ramosus, semipedalis. Fol. glabra, undulata, ciliata, pilis rigidis longioribus. *Vol. I.*

sculis distantibus, superiora brevissima. Vaginae laxiusculae, glabrae: ligula brevissima, ciliata. Spica simplex, teres. Spiculae solitariae, breviter pedicellatae, 3-4 florum, virides vel atropurpureae, ovato-acutae. Cal. 3-4 valvis. Valvae muricatae, aculeis in striis longitudinalibus dispositis. Cuique valvae flosculus unus interne adnascitur, biglumis, glumis membranaceis, glabris, gluma maiore valvam spectante. Flosculus superior imperfectus. In collibus aridis, praecipue in maritimis. Floret Julio. Ann.

117. *Carex ovalis*. W. C. spica androgyna composita, spiculis subsenis, subrotundo-ellipticis, alternis, subapproximatis, inferne masculis, stigmatibus binis; fructibus ovatis marginatis bidentatis, ciliato-serratis. W. C. *ovalis*. Gooden. -- Smith. Fl. Brit. -- Fl. Dan. t. 1115. *C. leprina*. Pollich. palat. -- Roth. Germ. -- Leers Herb. n. 707, t. 14; f. 6. *Gr. cyperoides palustre majus*, spica divisa. Moris. H. 3; s. 8; t. 12; f. 29. *Gr. cyperoides spica e pluribus spicis brevibus, mollibus composita*. Scheuchz. Agr. p. 465; t. 10; f. 15. *Carex radice fibrosa, caule triquetra, spica spadicea, brevi, capsulis marginatis*. Michel. N. P. Gen. p. 67; O. 3; n. 3. Ex herb. Micheliano. *Carex radice ovale*.

Rad. fibrosa. Culmus pedalis et sesquipedalis, acute triqueter. Folia culmo breviora, plana, striata, margine et carina scabra. Spiculae 4-6, plus minus approximatae

alternae, erectae, ovatae vel ellipticae, androgynae, floribus inferioribus masculis, paucis. Valvae ovato-lanceolatae, acuminatae, ferruginae, nitidae, nervo viridi, margine albo. Bractea ad basim spiculae inferioris oblonga, triangularis, apice subulata, valvis concolor, spicula brevior. Fructus ovato-lanceolatus, acuminatus, hinc convexus, inde planus, margine ciliato-serrato, apice bidentato. Stigmata 2. In pascuis humidis *Montis-Amiatae*. *Peren.*

118 *Carex muricata*. *C. spica androgyna composita, spiculis ovatis, superne masculis approximatis, stigmatibus, binis, fructibus horizontalibus, ovatis, plano-convexis, bidentatis, basi marginatis, margine ciliato-serratis.* W. *C. canescens.* Leers herb. n. 712; t. 14; f. 3. *C. muricata.* Smith. Gooden. *Gr. sylvaticum tenuifolium rigidiusculum.* Moris. H. 3; s. 8; t. 12; f. 27. *Carex palustris media, radice fibrosa, caule exquisite triangulari, spica brevi compaffiori.* Mich. N. Pl. Gen. p. 69; O. 6; t. 33; f. 14. *Carice muricata.*

Rad. fibrosa. Culmus pedalis vel sesquipedalis, erectus, acute triqueter, superne angulis scabris. Fol. plana, angusta, margine scabra. Spiculae 5-8: super. approximatae, infer. remotae, sessiles, ovatae, masculae. Bractae ovatae, scariosae, apice subulato, spicula longiores, saltem inferiores. Valvae scariosae, ovato acuminatae, rubiginosae, nitidae, capsula breviores, ner-

sculis distantibus, superiora brevissima. Vaginae laxiusculae, glabrae: ligula brevissima, ciliata. Spica simplex, teres. Spiculae solitariae, breviter pedicellatae, 3-4 florum, virides vel atropurpureae, ovato-acutae. Cal. 3-4 valvis. Valvae muricatae, aculeis in striis longitudinalibus dispositis. Cuique valvae flosculus unus interne adnascitur, biglumis, glumis membranaceis, glabris, gluma maiore valvam spectante. Flosculus superior imperfectus. In collibus aridis, praecipue in maritimis. Floret Julio. Ann.

117. *Carex ovalis*. W. C. *spica androgyna composita*, *spiculis subsenis*, *subrotundo-ellipticis*, *alternis*, *subapproximatis*, *inferne masculis*, *stigmatibus binis*; *fructibus ovatis marginatis bidentatis*, *ciliato-ser-ratis*. W. C. *ovalis*. Gooden. -- Smith. Fl. Brit -- Fl. Dan. t. 1115. *C. leprina*. Pollich. palat. -- Roth. Germ. -- Leers Herb. n. 707, t. 14; f. 6. *Gr. cyperoides palustre majus*, *spica divisa*. Moris. H. 3; s. 8; t. 12; f. 29. *Gr. cyperoides spica e pluribus spicis brevibus*, *mollibus composita*. Scheuchz. Agr. p. 465; t. 10; f. 15. *Carex radice fibrosa*, *caule triquetro*, *spica spadicea*, *brevi*, *capsulis marginatis*. Michel. N. P. Gen. p. 67; O. 3; n. 3. Ex herb. Micheliano. *Carex* radice ovale.

Rad. fibrosa. Culmus pedalis et sesquipedalis, acute triqueter. Folia culmo breviora, plana, striata, margine et carina scabra. Spiculae 4-6, plus minus approximatae



alternae, erectae, ovatae vel ellipticae, androgynae, floribus inferioribus masculis, paucis. Valvae ovato-lanceolatae, acuminatae, ferruginae, nitidae, nervo viridi, margine albo. Bractea ad basim spiculae inferioris oblonga, triangularis, apice subulata, valvis concolor, spicula brevior. Fructus ovato-lanceolatus, acuminatus, hinc convexus, inde planus, margine ciliato-serrato, apice bidentato. Stigmata 2. In pascuis humidis *Montis-Amiatæ*. *Peren.*

118 *Carex muricata*. *C. spica androgyna composita, spiculis ovatis, superne masculis approximatis, stigmatibus, binis, fructibus horizontalibus, ovatis, plano-convexis, bidentatis, basi marginatis, margine ciliato-serratis*. *W. C. canescens*. *Leers herb. n. 712; t. 14; f. 3. C. muricata. Smith. Gooden. Gr. sylvaticum tenuifolium rigidiusculum. Moris. H. 3; s. 8; t. 12; f. 27. Carex palustris media, radice fibrosa, caule exquisite triangulari, spica brevi compaffiori. Mich. N. Pl. Gen. p. 69; O. 6; t. 33; f. 14. Carice muricata.*

Rad. fibrosa. Culmus pedalis vel sesquipedalis, erectus, acute triqueter, superne angulis scabris. Fol. plana, angusta, margine scabra. Spiculae 5-8: super. approximatae, infer. remotae, sessiles, ovatae, masculae. Bractae ovatae, scariosae, apice subulato, spicula longiores, saltem inferiores. Valvae scariosae, ovato-acuminatae, rubiginosae, nitidae, capsula breviores, ner-

vo dorsali viridi, margine albido. Fructus divergentes, ovato-acuminati, hinc convexi, hinc plani, glabri, margine versus apicem scabri, apice 2-dentati, Stygmata 2 — In pratis montanis. *Peren.*

119. *Carex divulsa*. L. *C. spica androgyna composita, basi subramosa, spiculis ovatis, superne masculis approximatis, inferioribus, remotis, stigmatibus binis, fructibus erectiusculis ovatis, plano convexis, bidentatis, marginatis, margine glabris*. W. *C. divulsa*. Gooden. — Smith. Bertol. pl. rar. Gen. *C. nemorosa, fibrosa radice, caule exquisite triangulari, spica longa divulsa seu interrupta, capitulis solitariis, præterquam ultimo*. Mich. N. P. G. p. 69; O. 5; n. 4; t. 33; f. 10. et *Carex* . . . . *capitulis omnibus solitariis*. Id. ibid t. 33; f. 1. Carice triviale.

Rad. repens fibrosa. Culmus sesquipedalis, gracilis, triqueter, angulis scabris. Fol. angusta, margine et carina aspera. Spica elongata, interrupta. Spiculae androgynae, ovatae, floribus terminalibus masculis, distantes: inferior composita, interdum subramosa, superiores approximatae. Bractae minutae, ovatae, carinatae, in foliolum setaceum, scabrum desinentes, in bractea inferiori spicula longius, in cæteris bracteis brevius. Valvae albae, ovato-acutae, carina subviridi. Fructus ovati-acuminati, erectiusculi, altero latere convexi, margine versus apicem scabri, bidentati,

Stigmata. 2 In aggeribus frequens. Floret Majo. Peren.

120. *Carex remota*. L. C. *spica androgyna composita, spiculis alternis remotis, inferne masculis, bracteis foliaceis longissimis suffultis, fructibus ovatis, acuminatis bifidis, compressiusculis*. W. Leers. Herb. n. 710; t. 15; f. 1. Fl. Dan. t. 370. Smith. Brit. — Gooden. — Gr. *cyperoides angustifolium, spicis paucis sessilibus, in foliorum alis*. Pluk. phyt. t. 34; f. 3. Gr. *cyperoides, paniculis pluribus sessilibus in foliorum alis*. Moris. H. 3; s. 8; t. 12; f. 17. *Carex angustifolia, caule triquetro, capitulis pulchellis &c.* Michel. N. P. Gen. p. 70; O. 7; n. 2, et 3; t. 33; fig. 15, 16. Carice remota.

Radix repens. Culmus gracilis, pedalis, aut sesquipedalis, triqueter, superne angulis scabris. Fol. angusta, margine imprimis aspera, radicalia culmo breviora. Fol. caulina conformia, bractearum vicem gerentia. Spiculæ 6-8 axillares, subsessiles, alternæ, albidæ, remotæ, præsertim 2-inferiores quarum bractæ culmo æquales vel longiores sunt. Spiculæ 3-superiores approximatae, bractea brevi. Flor. masculi in infima spiculæ parte. Valvæ ovatae, scariosæ, carina viridi. Fructus ovato-acuminatus, valva longior, superne margine scabro, apice 2-fido. In monte Pisano prope *Olivetum*. Flor. Julio. Peren.

121. *Carex paniculata*. L. C. *spicis an-*

*drogynis paniculatis, superne masculis, stigmatibus binis, fructibus ovatis, superne marginatis, 2-dentatis, margine ciliato-ser-ratis, culmo triquetro. W. C. paniculata. Leers Herb. n. 713; t. 4; f. 4 Cyperus alpinus longus inodorus, panicula ferruginea minus sparsa. Scheuchz Agrost. Prod. t. 8; f. 2. Carex radice repente, caule exquisi-te triangulari, spica multiplici ferruginea. Mich. N. P. Gen. p. 68; O. 4; n. 1, et C. radice repente, culmo exquisite triangulari, spica multiplici fusca. ibid. n. 2; t. 33; f. 7 Carice pannocchiuta.*

Rad. fibrosa. Culmus 2-3 pedalis; ere-ctus, acute triqueter, angulis scabris. Fol. culmo longiora, erecta, margine et carina scabra. Spica androgyna, paniculato-racemo-sa, ramulis alternis. Spiculae ovato-acutae, sessiles, floribus superioribus masculis, in-ferioribus foemineis paucis. Valvae ovato-acutae, concavae, fuscae, margine albido, nervo dorsali viridi. Bractee conformes, sed carina scabra, in mucronem setaceum de-sinentes. Fructus ovato-lanceolatus, longe acuminatus, apice bidentatus, superne mar-ginatus, margine serrulato. In Apennino prope *Marradium* inventa, mihiq; tran-smissa a D. I. M. Morellio, Botanices stu-diosissimo, ad maximum scientiae detrimen-tum, immatura morte praerapto. *Peren.*

122. *Carex pilulifera. C. spica mascu-la solitaria, foemineis subternis, approxima-tis, elliptico-subrotundis, sessilibus, stigma-*

*tibus tribus, fructibus subrotundis breve rostratis, pubescentibus, squama oblonga, acuta brevioribus, culmo (debili). W. C. pilulifera. Smith. Brit. -- Gooden. - C. filiformis. Fl. Dan. t. 1048. Carice pallottina.*

Rad. fibrosa, crassa. Culmus tenuis, triqueter, superne scaber, debilis, saepe decumbens. Folia culmo breviora, plana, superne et carina scabra. Spica mascula oblonga, tenuis. Spicae femineae 2-3 sessiles, approximatae, elliptico-subrotundae. Valvae ovato-acutae, margine et nervo dorsali viridi, lutescente. Fructus valvae subaequalis, subrotundus, rostratus, pubescens. Bractae setaceae, absque vagina: inferior spicula sua longior. Ex *Apennino Pistoriensi. Peren.*

123. *Carex praecox. C. spica mascula solitaria, femineis geminis approximatis oblongis sessilibus, stigmatibus tribus, fructibus subgloboso-triquetris pubescentibus, squamam ovatam, acutam aequantibus. W. C. praecox. Smith. Brit. -- Gooden. Cyperoides vernalis caule rotundo triquetro, spicis terminalibus densioribus, vel ternis, squamis ferrugineis, obtuse mucronatis, et tanquam in aristulam prolongatis, capsulis turbinatis, subhirsutis, trilateris. Mich. N. P. Gen. O. 11; p. 64; n. 70. Carice primaticcia.*

Rad. repens. Culmus tenuis, obtuse triqueter, semipedalis, aut paulo longior. Fol. angusta, carinata, recurva, supra scabra, culmo paulo breviora. Spica superior mascula, obovata, valvis lanceolato-acutis.

ferrugineis, nervo dorsali, viridi-lutescente. Spicæ fœmineæ 2-subapproximatae, ovato-lanceolatae, breviter pedunculatae. Bractea vaginaus ad basim spiculæ inferioris, vagina pedunculo subæquali, in foliolum filiforme, culmo subæquali producta. Bractea spiculæ superioris vagina imperfecta, foliolo brevissimo. Valvæ ovatae, mucronulatae, ferrugineae, nervo dorsali virescente. Fructus valvæ subæqualis, triquetro-pyriformis, pubescens. Communis in aggeribus. Floret Majo et Aprili. *Peren.*

124. *Carex flava*. L. *C. spica mascula solitaria, fœmineis subternis subapproximatis, ellipticis, incluse pedunculatis, stigmatibus tribus, fructibus ovatis reflexis rostratis, rostro curvato bidentato, squama ovato-lanceolata longioribus*. W. *C. flava*. Smith. Brit. - Goodeu. - Leers Herb n. 714; t. 15; f. 6 Fl. Dan. t. 1047; *Gr. cyperoides palustre echinatum, germanicum*. Moris. H. 3; s. 8; t. 12; f. 19. Carice giallastra.

Rad. repens. Culmus erectus triqueter, lævis. Fol. plana, culmo quandoque longiora, margine et carina scabra. Spica mascula lanceolata, erecta, absque bractea. Spicæ fœm. ovato-subrotundæ, patentes, plerumque tres, approximatae, breviter pedunculatae. Bractæ vaginantes foliaceæ, inferior foliolo culmo longiore, cœteræ brevior, vaginis pedunculis subæqualibus. Valvæ ovato-obtusiusculæ, flavæ, margine albido, nervo dorsali viridi. Fructus patentes vel

reflexi, valvis longiores, ovati, inflati, subtriquetri, nervosi, læves, rostrati, arcuati, bidentati. In pratis humidis Sylvæ Pisanæ. Floret Junio. *Peren.*

Variat. 1. altitudine a 4-poll. usque ad pedem. 2. spica altera fœminea circa culmi dimidium longius pedicellata. 3. spicis omnibus distantibus. 4. defectu spicæ masculæ, et tunc una alterave spicarum superiorum est androgyna, apice mascula.

125. *Carex distans*. L. C. *spica mascula solitaria, fœmineis tribus ovatis, distantibus, suprema sessili, reliquis pedunculatis, stigmatibus tribus, fructibus ovatis acuminatis bicuspidatis, squamam ovatam acuminatam subæquantibus*. W. C. *distans*. Smith Brit. — Gooden. — Fl. Dan t. 1049. *Cyperoides spicis parvis longe distantibus*. Schenchz. Agrost. p. 451. Mich. N. P. G. p. 58; O. 3; n. 16. Gram. *cyperoides palustre, spicis tribus subrotundis vix aculeatis, spatio distantibus*. Moris. H. 3; s. 10. t. 12; f. 18. Carice gracile. Fl. Pis.

Culmus sesquipedalis, tennis, triquet, lævis. Fol. plana, brevia, margine scabra. Spica mascula erecta, lanceolata, valvis obovatis, obtuse mucronatis, carinatis, pallide ferrugineis, dorso margineque flavescentibus. Spicæ fœminæ plerumque tres, ovato-oblongæ, distantes, bracteata, bractea vaginante, in folium abeunte; inferiores pedunculo exserto, superior pedunculo incluso. Valvæ ovatæ, mucronatæ, ferrugi-

neæ, dorso viridescente, trinervio. Fructus ovatus, glaber, valvâ paulo longior. Communis secus fossas, et in aggeribus. *Peren.*

126. *Carex alpestris*. Allion. *C. spica mascula solitaria, fæmineis tribus, quinquefloris, binis approximatis sessilibus, infima radicali longissime pedunculata, stigmatibus tribus, fructibus obovatis, ore obliquo, squamam oblongam æquantibus*. W. *C. gynobasis*. Villars Delph. -- Bertol. pl. rar. Gen. cum bona descriptione. Carice alpestre.

Culmus tenuis, debilis, 5-8 poll. longus, sulcatus, scabriusculus. Fol. linearia. culmo subæqualia. Spica mascula lineari-lanceolata. Spica fæm. paucifloræ, sæpius. 2. approximatae, subpedunculatae, ovato-acutae, bractea vaginante, subauriculata, in foliolum setaceum producta, instructae. Vagina pedicellis subaequali. Spica fæm. 1, et quandoque plures, a radice ex vagina folii oritur, pedunculo filiformi longo, culmo tamen brevior. Valvae ovato-oblongae, acutae, rufo-ferrugineæ, dorso virides. Fructus oblongus, triqueter, acutus, striatus glaber, valvae subaequalis. In montibus frequens. Flor. Junio. *Peren.*

Reperitur etiam unica tantum spica in culmo, mascula vel androgyna. Bertol. loc. citat.

127. *Carex pendula*. Good. - Smith. *C. spica mascula solitaria, fæmineis subquinis cylindræis, pendulis sessilibus, infima exserte pedunculata, stigmatibus tribus fru-*



*Stibus ellipticis, brevissime rostratis, ore bidentatis squamam ovatam, submucronatam subaequantibus.* W.-- Bertol. pl. rar. Gen. Bivon. Centur. *C. maxima* Scopol.-- *Cyperoides spica pendula longiore et angustiore.* Schenchz Agrost. p. 445. Michel. N. P. G. p. 59; O. 5; n. 28. *Gr. cyperoides latifolium typha pendula longiore.* Barrel. ic. 45. *Carice maxima.* Fl. Pis.

Culmus 4-6 pedalis, firmus, superne angulis scabris. Fol. lata, erecta, rigida, dura, margine et carina scabra. Spicae cylindricae, arcuato-pendulae; mascula solitaria: foemineae 5-6 distantes, interdum duae superiores, ex eadem vagina, in medietate superiori plerumque masculae. Bractee foliaceae, inferiores longissimae, vaginantes. Spicae superiores sessiles, inferior pedunculo exserto. Flores dense imbricati. Valvae oblongae, acuminatae, saturate ferrugineae, carina viridi. Fructus ovato-triqueter, mucronatus, apice bidentatus, valva paulo brevior. Planta glaucescens. In sepibus frequens. Floret Majo. *Peren.*

128. *Carex pallescens.* L. *C. spica mascula solitaria, foemineis subternis, pedunculatis, cernuis, ellipticis, stigmatibus tribus, fructibus obovato oblongis, obtusis, squamam oblongam cuspidato mucronatam aequantibus, foliis pubescentibus.* W. *C. pallescens.* Good.-- Smith. Brit.— Fl. Dan. t. 1050. Leers herb. n. 721; t. 15; f. 4. *Cyperoides polystachion flavicans spicis brevi-*

qus, prope summitatem caulis. Michel. N. P. Gen. p. 61; O. 7; n. 45, t. 32; f. 13. Carice pallida.

Rad. fibrosa. Culmus sesquipedalis, erectus, triqueter, angulis superne scabris. Fol. plana, erecta, culmo subaequalia vel paulo longiora, pubescentia, subtus scabra. Spica mascula lineari-lanceolata, valvis obovato-acutis, pallidis, dorso viridi, spicæ femineæ 3. ovatae, approximatae, exserte pedunculatae, primum erectae, demum patentes. Bractæa foliaceæ, culmo longiores, breviter vaginantes. Valvae ovato-acuminatae, pallide-lutescentes, carina viridi. Fructus obovato-oblongus, obtusus, muticus, glaber, valvae subaequalis. Planta pallide viridis. In Monte Argentario: a Michelio vero in Monte Sinaro, et prope Cænobium Vallis Umbrosæ reperta. Floret Majo. Peren.

129. *Carex Drymeia*. W. C. spica mascula solitaria, femineis quaternis, remotis, filiformibus, pedunculatis, cernuis, stigmatibus tribus, fructibus ovatis rostratis bifidis, squamam ovatam, membranaceam mucronatam subaequantibus. W. C. vesicaria  $\beta$ . L. Spec. C. sylvatica. Gooden. - Smith. Brit. - Fl. Dan. t. 404. C. capillaris. Leers herb. t. 15; f. 2. Gr. *Cyperoides sylvarum tenuius spicatum*. Moris. H. 3; s. 8; t. 12; f. 9. Michel. N. P. Gen. p. 56; O. 1; n. 4. Carice filiforme.

Rad. fibrosa. Culmus bipedalis, erectus, triqueter, glaber, superne scaber. Fol.

breviora, erecta, plana, supra et carina scabra. Spica mascula lanceolata, glumis obovatis, obtusis, pallide ferrugineis, dorso viridi, margine scarioso albido. Spicae foemineae 4-5 distantes, exserte pedunculatae, pedunculis filiformibus superioribus longioribus, arcuato-pendulae, lineari-lanceolatae. Bractea foliaceae, longe vaginantes. Valvae ovato-lanceolatae, acuminatae, pallidae, dorso viridi scabro. Fructus ovato-triqueter, glaber, rostratus, apice bifido, valvae subaequalis. Planta luteo-viridis. In humidis et umbrosis Sylvae Pisanae. Floret Maio. *Peren.*

130. *Carex recurva*. W. C. *spicis masculis gerninatis, foemineis cylindricis subternatis, pedunculatis, pendulis, stigmatibus tribus, fructibus ellipticis, obtusis, scabriusculis, squamam ovatam, cuspidatam, aequantibus*. W. C. *recurva*. Good. -- Smith. Brit. -- Fl. Dan. t. 1051. *C. flacca*. Schreb. Scur. -- Bertol. pl. rar. Gen. C. *glauca*. Scop. Gr. *nemorosum spica subnigra, recurva*. Moris. H. 3; s. 8; t. 12; f. 14. *Cyperoides foliis caryophylleis, caule exquisite triangulari, spicis habitioribus, squamis curtis, obtuse mucronatis, capsulis turbinatis, brevibus, confertis*. Mich. N. P. Gen. p. 62; O. 9; n. 51; t. 32; f. 12. Carice glauca.

Radix repens. Culmus erectus a semipede ad 2-ped. altus, triqueter, angulis superne scabris. Fol. culmo breviora, erecta, margine et carina scabra. Spicae ma-

sculae 1-3, lineari-lanceolatae, valvis obovatis, obtusis, atro-purpurascensibus, velut rore glaucis, margine albido, nervo dorsali lutescente. Spicae faem. 2-3 subcylindricae, valvis mascul. conformibus, raro submucronatis, pedunculatae, pedunculis filiformibus, inferiori longiore. Bractee foliaceae: inferior culmo subaequalis, vaginis brevibus, plerumque auriculatis, auriculis rubris. Fructus ovato-subtriqueter, obtusus, apice integer, glaber, vel subpubescens, valvis paulo longior. Tota planta glauca. In montibus frequens. Floret Majo. *Peren.*

Certe ad hanc speciem pertinet citata icon. Michellii. *Caricem* vero *Michelianam*. Smith. Brit. sen *C. ambleocarpam*. W. suspicor hujus speciei varietatem esse.

131. *Carex riparia*. *C. spicis masculis tribus, fœmineis tribus, erectis, cylindraceis, attenuatis, inferioribus pedunculatis, stigmatibus tribus ovatis rostratis, multinerviis, bifurcatis, longitudine et latitudine squamæ ovatae, aristatae*. W. Good. -- Smith. Brit. *Cyperoides aquaticum maximum*, foliis vix unciam latis, caule exquisite triangulari, spicis habitioribus erectis, squamis in aristam longius productis, capsulis oblongis, bifidis. Mich. N. P. Gen. p. 57; O. 2; n. 10; t. 32; f. 7 et *Cyper. aquaticum maximum*. . . . *squamis curtis &c.* ibid. n. 11; t. 32; f. 6. *Carice sala*.

Rad. crassa, repens. Culmus erectus, 3-4 pedalis, validus, acute triqueter, angu-

lis scabris. Fol. erecta, lata, saturate viridia, glabra, margine et carina scabra, culmo subaequalia vel longiora. Spicae masculae 3-5 erectae, approximatae, triquetrae, valvis oblongis, mucronatis, fusco-nigris. Spicae foemineae 2-4, subremotae, quarum 2 super. apice masculae, cylindrico-attenuatae, pedunculatae: valvae ovatae, mucronatae, nigricantes, carina pallida. Fructus ovato-acutus, nervosus, apice bifurcatus, valvae subaequalis. Bractee foliaceae, inferior culmo longior; superiores brevissimae auriculatae, auriculis pallidis. Communis secus fossas, Flor. April. *Peren.*

132. *Carex hirta*. L. C. *spicis masculis binis, foemineis tribus, obovatis, remotis, inferioribus breve pedunculatis, stigmatibus tribus, fructibus oblongis, acuminatis, hirtis, bicuspidatis, squama oblonga, aristata majoribus, vaginis, foliisque subhirtis*. W. Good. Smith. Brit. Leers herb. n. 725; t. 16; f. 3. *Cyperoides polystachion lanuginosum*. Moris. H. 3; s. 8; t. 12; f. 10. Michel. N. P. Gen. p. 57; O. 11; n. 15. *Carice pelosa*.

Rad. repens. Culmi cespitosi, adscendentes, semipedales et pedales, triquetri, angulis scabris. Fol. plana, erecta, culmo paulo breviora, margine scabra, pubescentia, vaginis pilosis. Spicae masculae 2-3, inaequales, erectae, subapproximatae, valvis obovatis, mucronatis, pubescentibus, ferrugineis, dorso viridi, bracteis sessilibus,

setaceis, brevibus. Spicae foemineae 2-3 distantes, erectae, pedunculatae, florentes graciles, fructiferae obovatae, bracteis foliaceis, vaginis pedunculis subaequalibus. Valvae ovato-oblongae, aristatae, glabrae, pallide ferrugineae, margine lato albo, dorso viridi. Fructus ovatus acuminatus, apice bifurcatus, nervosus, hirtus, gluma longior. Secus fossas et in palustribus maritimis. Floret April. et Majo. Peren.

133. *Juncus acutus*. L. *J. culmo nudo tereti, panicula terminali, involucro diphyлло spinoso, capsulis subrotundis, mucronatis*. Smith Brit. *J. pungens* S. *acutus*, capitulis sorghi. Moris. H. 3; s. 8; t. 10; f. 15. *J. maritimus*, sorghi panicula utriculata. Barrel ic. t. 203; f. 2. Gianco pungente. Flor. Pis.

Culmi 2-3 pedales, teretes, nudi, rigidi. Folia conformia, sed breviora, mucronato-pungentia. Panicula corymbosa, terminalis, erecta, involucro diphyлло, foliis inaequalibus, longitudine variabili, basi dilatata, spathacea, apice mucronato-pungentia. Bractae lanceolato-acuminatae, membranaceae, ad ramulorum divisiones. Fol. calycina ovata, acuta. Capsula triquetrosbrotunda, mucronata, calyce duplo longior, aetate spadicea, nitida. In arenosis Sylvae Pisanae. Floret Junio. Peren.

134. *Juncus effusus*. L. *J. culmo nudo, strisso, panicula laterali effusa, supra decomposita, capsulis obtusis*. Smith. Brit.

*J. lavis*, panicula sparsa major. Moris. H. 3. s. 8; t. 10; f. 4. Mich. N. P. Gen. p. 37; O. 1; n. 2. Giunco sparso. *Fl. Pis.*

Culmi 2-3 pedales, teretes, nudi, rigidi. Fol. conformia, pungentia. Panicula lateralis, sparsa, ramis ramosis. Bracteae ad pedunculorum divisiones, membranaceae subulatae. Fol. calycina lanceolato-acuminata: bracteae sub calyce 2, parvae, inaequales, acutae. Caps. subtrigona, obovato-obtusae, calyci subaequalis. Communis secus fossas, et in pascuis humidis. Floret Junio. *Peren.*

135. *Juncus niveus*. L. *J. foliis planis pilosis, corymbo composito, pedunculis subquinquefloris, calycinis foliolis acutis, interioribus duplo longioribus, radice repente.* *W. Luzula nivea.* Decand. *Fl. Franc. Juncoides montanum nemorosum flore nivo.* Scheuchz. Agr. p. 320; t. 7; f. 7. Michel. N. P. Gen. p. 42; O. 2; n. 3. *Cyperus palustris hirsutus minor, paniculis albis.* Moris. H. 3; s. 8; t. 9; f. 39. Giunco bianco.

Rad. repens. Culmus pedalis vel sesquipedalis, erectus, tenuis, foliosus. Fol. plana, striata, margine et basi pilis albis longis raris, adpersae. Corymbus terminalis compositus: pedunculi tenues, basi et ramificationibus bracteis 2. albis, acutis, inaequalibus instructi. Flores 4-5 in quovis fasciculo, foliolis calyc. albis, nitidis, acutis, 3-internis duplo longioribus. In montibus prope Florentiam; et in Monte Pisano.

arope *Cucilianam*, in rupium fissuris invenit amicus Jacobus Jacoponi Medicus prudentissimus, et Rei Herbariae studiosus.

136 *Juncus pilosus*. L. *J. foliis planis, pilosis, panicula cymosa, divaricata, floribus solitariis*. Smith. Brit. - Leers herb. n. 268; t. 13; f. 10. *J. nemorosus*. Enc. *Luzula vernalis*. Decand. Fl. Franc. *Gr. nemorosum, latifolium majus*. Moris. H. 3; s. 8; t. 9; f. 1. *Gr. rose lucidum, nemorense, sive luzula*. L. B. Hist. 2. p. 492. *Juncoides nemorosum villosum, latifolium majus, flore minore*. Michel. n. p. Gen. p. 41; O. 1; n. 1. *Giunco salvatico*. Fl. Pis.

Culmi subpedales, tenues, teretes, foliosi. Fol. lineari-lanceolata, plana, striata, laevia, margine pilis mollibus, albis, longiusculis, distantibus ciliata. Panicula cymosa, ramis simplicibus vel furcatis, filiformibus, divaricatis, inferioribus nutantibus, foliolo lineari breviori instructa. Bractee ad ramorum basim, membranaceae, amplexantes, apice filiformes, spadiceae. Flores solitarii. Bractee sub calice 2. inaequales, membranaceae, albae, acutae. Fol. calyc. lanceolato-acuminata, spadiceo-purpurea, margine alba, nitida. Caps. ovato-obtusa, nitida, flavescens, calyci subaequalis. -- In umbrosis Montis Pisani, in Monte-Amiata &c. Floret Martio. Peren.

137 *Juncus campestris*. L. *J. foliis planis, pilosis, spicis terminalibus sessilibus, pedunculatisque, calycinis foliolis mucrona-*



*tis*, capsula obtusa longioribus. Leers Herb. n. 270; t. 13; f. 5. *Luzula campestris*. Decand. Fl. Franc. Gr. *hirsutum capitulis Psyllii*. C. B. Prod. 15. cum icone. *Juncioides villosum capitulo Psyllii*. Schenchz Agr. p. 310. Mich. N. P. G. p. 42; O. 3; n. 3. Giunco peloso. Fl. Pis.

Culmus semipedalis et pedalis, foliosus. Fol. ut in antecedenti. Spicae ovatae, densae, multiflorae, plures pedunculatae; paucae sessiles, bracteis membranaceis, spadicis, acuminatis ad basim pedunculorum. Fol. calycis lanceolato-acuminata, atro-spadicea, nitida, margine lutescentia. Bractae 2. subaequales, scariosae, ovato acutae, ad basim calycis. Capsula obovato-obtusa, calyce paulo brevior. Communis in pratis montanis. Fl. Majo. Peren.

138. *Juncus bufonius*. L. J. culmo dichotomo, foliis angulatis, floribus oblongis solitariis, sessilibus. Persoon Synops. - Leers. Herb. n. 267; t. 13; f. 8. Fl. Dan. t. 1098. Gr. *nemorosum*, calycutis paleaceis, species altera procerior. Schenchz. Agrost. p. 327. Gr. *bufonium erectum*, angustifolium majus. Barrel. Ic. 264. J. *palustris annuus erectus*, caule cubitali. Michel. N. P. Gen. p. 40; O. 8; n. 1. Giunco palustre. Fl. Pis.

Culmus pedalis, ramosus, dichotomus. Fol. linearia, canaliculata; angulata. Flores solitarii, erecti, sessiles; axillares in ramificationibus culmi: unilaterales; distantes,

in ramis. Fol. calyc. lanceolato acuminata, pallide viridia, margine scarioso albo, Caps. oblonga, subtrigona, obtusa, calyce brevior. Bracteae 2. ad basim calycis, lato-ovatae, acutae, vaginantes, scariosae: quae vero ad dichotomias lanceolato-setaceae. Communis in alveis fluviorum, et in locis inundatis. Flor. Julio. *Ann.*

139 *Juncus Tenageja* L. suppl. *J. culmo ramoso, paniculato, floribus solitariis sessilibus, foliis calycinis ovato-oblongis, capsula subglobosa.* -- Fl. Dan. t. 1160. *Juncus annuus floribus inter ramulos sparsis.* Vaill. Paris. t. 20; f. 1. *J. palustris exiguus erectus annuus, capsulis seminum rotundis.* Mich. N. P. Gen. p. 40; O. 7; n. 2. *Gr. Juncum milii panicula.* Barrel. ic. 747; n. 2. *Giunco gracile.*

Culmi erecti, filiformes, debiles 5-6 poll. alti, ramosi, paniculati, foliis perpau- cis, radicalibus vaginantibus. Flores solitarii, erecti, subsessiles in ramorum divisionibus, bracteis 2 brevibus, inaequalibus, acutis, membranaceis, vaginantibus. Fol. calyc. ovato-oblonga. Capsulae rotundatae, obtusae, rubescentes, calyci subaequales. In palustribus per saltum. PP. *Capucino- rum* prope vicum *S. Laurentii*, et in humidis prope *Blentinam*. Floret Junio. *Ann.*  
Icon *Barrelierii* quae dubie a *Michelio* refertur, huic plantae melius convenire videtur, quam *Junco bulboso* pro quo a *Wilden.* citatur.

140. *Juncus bulbosus*. L. *J. folis linearibus canaliculatis, culmo basi folioso, panicula cymosa, capsulis obtusis*. Smith. Fl. Brit. -- Leers Herb. n. 266; t. 13; f. 7. Fl. Dan. t. 431. *J. parvus cum pericarpis rotundis*. I. B. Hist. 2; p. 522. Mich. N. P. G. p. 40. *J. repens apocarpus minor botryoides*. Barrel. ic. 114; n. 1. *Gr. junceum sorgi capitulis*. Barrel. ic. 747; n. 1. Giunco bulboso. Fl. Pis.

Culmus subpedalis, simplex, compressus, basi parum incrassatus. Fol. culmea 2-3, quorum unum ad basim paniculae, radicalia plura; omnia glabra, striata, canaliculata. Panicula cymosa, ramis 3-4 inaequalibus, ramosis, bracteatis, bracteis membranaceis, vaginantibus, lanceolato-setaceis. Flores parvi. Fol. calycina lanceolata, obtusiuscula, viridia, margine scarioso, aetate spadicea. Bractee sub calyce 2, inaequales, ovatae. Caps. obovatae, obtusae, calyce longiores, fuscae, nitidae. Communis in aggeribus, et in pratis humidis. Floret Janio. Peren.

141. *Montia fontana*. L. Fl. Dan. t. 131. *Montia aquatica minor*. Mich. N. P. Gen. p. 18; t. 13; f. 2. Gaertn. t. 129. Cintonchiello palustre. Fl. Pis.

Caulis herbaceus, 2-pollicaris, ramosus, dichotomus, ramis diffusis, decumbentibus, cylindricis, rubicundis. Fol. opposita, sessilia, connata, ovato-lanceolata, integerri-  
ma, viridi latea. Flor. 2-3 in apice rami

larum, pedunculati, primum erecti, dein nutantes. Cal. inferus diphyllus. Cor. alba, 1-petala, lacinis 5, quarum 3. minores. Caps. 1-ocularis, 3-valvis, 3-sperma. In pratis humidis di Coltano. Flor. Majo. Ann.

142. *Scabiosa leucantha*. L. S. foliis lyrato-pinnatifidis, paleis obtusis, semine tetragono, urceolo dentato glanduloso. Nob. Sc. fruticans, angustifolia alba. C. B. P. p. 270. Moris. H. 3; s. 6; t. 13; f. 12. Montana scabiosa, calidarum regionum. Lob. ic. 538 Vedovina biancastra. Due Cent.

Caulis 3-4 pedalis, cylindricus, ramosus, sulcatus. Folia coriacea, basi connata, lyrato-pinnatifida, profunde laciniata, laciniis decurrentibus: in fol. inferioribus, ovatis, in superioribus lanceolato-acutis, dentatis, vel incis, margine et nervis pilosis. Capitula globosa. Involucrum polyphyllum brevius, foliol. ovato-obtusis: Corollulae 4-fidae, albae: paleae receptaculi, ovatae, obtusae, striatae. Sem. 4-gona, striata, calyce brevi denticulato coronata, papoque urceolato, margine denticulato-glanduloso. In collibus apricis Mugelli, et Provinciae inferioris Senensis. Floret Julio. Peren.

143. *Scabiosa Succisa*. L. S. foliis ovato-lanceolatis acutis, plerumque integris, paleis apice foliaceis, semine subtetragono striato, calyce 4-dentato, urceolo, sub 5-seto. Nob. Fl. Dan. t. 279. Succisa glabra. C. B. P. p. 269. Morsus diaboli. Mattiol. p. 658.

*Succisa*. Fuchs. H. p. 715. *Pycnocomon*.  
Column. Phytobas. p. 37. *Vedovina* *Suc-*  
*cisa*.

Caulis sesquipedalis, cylindricus, solidus, striatus, superne ramosus. Fol. opposita, ovato-lanceolata, acuta, in petiolum decurrentia: caulina angustiora, petiolis, connatis: superiora linearia. Capitula subglobosa. Involucri folia inaequalia, rigida, lanceolato-acuta. Corollulae 4-fidae, violaceæ. Paleæ receptaculi lanceolatae, apice foliaceæ, virides, triangulares, acuminatae. Sem. subtetragona, striata, pilosa, coronata calyce 4-dentato, dentibus triangulis. Pappus urceolatus 4-5 setis instructus. — Folia interdum dentata, vel incisa. — *Expertissimus Hortulanus Botanicus Joseph Piccioli, Florentino Lyceo addictus, invenit hanc Scabiosam in Vallis Nebulae provincia, prope Villam, quae vulgo dicitur Bellavista. Peren.*

144. *Scabiosa sylvatica*. L. *S. hispida foliis ovato-acuminatis, dentatis, connatis, semine ovato-compresso, urceolo setis 8-12 coronato*. Nob. Jacq. *Observat.* 1; p. 28. *Obs.* 3; p. 20; t. 72. *Sc. latifolia rubra non laciniata*. C. B. P. p. 270. *Sc. rubra austriaca*. Lob. ic. 538. *Vedovina ispidi*.

Caulis erectus fistulosus, superne ramosus. Fol. ovato-lanceolata, sessilia, connata, plus minusve profunde dentata. Capitula hemisphaerica. Involucri fol. ovato-lanceolata, acuminata. Coroll. 4-fidae, pur-

pureo cœruleæ: externae radiantes. Recept. pilosum. Sem. ovato-compressa, calyculo dentato, pappo urceolato, 8-12 sedis rigidis coronato. Planta nigro-punctata, punctis piliferis, hispida. In Apeanino, prope *Mar-radium*. *Peren.*

145. *Scabiosa integrifolia*. L. *S. foliis radicalibus ovato-spathulatis crenatis, caulinis lanceolatis, semine ovato-compresso, urceolo denticulato glanduloso.* Nob. Flor. Pis. tav. 2; f. 1. Roth. Fl. Germ. 2; p. 164. *Vedovina comune* Fl. Pis.

Caulis fistulosus, cylindricus, ramosus, pedalis et bipedalis. Fol. radicalia ovato-spathulata, obtuse crenata, vel lyrata, laciniis obtusis, obtuse crenatis: caulina subconnata, lanceolato-acuta, integra, vel parum laciniata aut dentata, basi ciliata. Capitula modice convexa. Involucrum polyphyllum, brevius, foliis lanceolato-acutis, margine et nervo medio ciliatis. Coroll. 4-fida, externae radiantes, pallide roseæ: centrales albae. Semen pilosum, ovato-compressum, apice sinuatum, dentibus inaequalibus coronatum, urceolo piloso, margine denticulato, glanduloso. Planta pallide viridis, pilosa, pilis pluribus glanduliferis. Communis inter segetes. Flor. Majo. *Ann.*

146. *Scabiosa arvensis*. L. *S. foliis lyrato-pinnatifidis lacinis acutis, semine ovato-compresso, urceolo dentibus 8 setaceis.* Nob. Fl. Pis. t. 2; f. d. -- Fl. Dan. t. 447. *Sc. pratensis hirsuta*. C. B. P. p. 269. *Sc.*

*major satorum vulgarior*. Lob. ic. 536. *Sc. major communis hirsuta, folio laciniato, et non laciniato*. I. B. Hist. 3; p. 2. *Vedovina campestre. Fl. Pis.*

Caulis pedalis et bipedalis, scaber, ramosus. Folia lyrato-pinnatifida, lacinis acutis, denticulatis: caulina connata: superiora simplicia, fere linearia. Capitulum convexum: fructiferum hemisphaericum. Involucrum polyphyllum, brevius, foliol. lanceolatis. Coroll. 4-fidae, purpureo-violaceæ, externæ radiantes. Recept. pilosum. Sem. ut in antecedenti, sed apice minus profunde sinuata, urceolo dentibus 8 setaceis, lineam fere longis, coronato. Planta saturate viridis, piloso-scabra, sed datur et varietas glabra. Communis in pratis siccis. Floret Junio. *Peren.*

147. *Scabiosa columbaria*, L. *S. foliis radicalibus ovatis, crenatis, pinnatifidis: calyce plicato, stellata 5-radiata*. Nob. Fl. Pis. t. 2; f. g. Bertol. Pl. rar. Gen. -- Fl. Dan. t. 314. *Sc. capitulo globoso major et minor*. C. B. P. p. 207. *Phyteuma Dioscoridis*. Column. Phytobas. t. 98. *Sc. minor, s. Columbaria*. Lob. ic. 380. *Vedovina salvatica. Fl. Pis.*

Caulis pedalis et bipedalis. Fol. radicalia primaria simplicia ovato-spathulata, crenata: secundaria lyrato-pinnatifida, laciniiis apice dilatatis, crenatis, dentatis, incisis: sæpe 2-pinnatifida. In fol. caplinis laciniae successive angustiores, et minus in-

cisæ. Fol. superiora, non raro simplicia, linearia. Capitulum hemisphaericum, fructiferum ovatum. Involucrum polyphyllum, brevius, foliol lanceolato-acutis. Coroll. 5-fidæ purpureo-cæruleæ, externæ radiant. Semen turbinatum, pubescens, foveolis 8, imperviis marginatis: calyce membranaceo rugoso, intus plicato; stellula radiis 5, setaceis, scabris. Paleæ recept. lineari-lanceolatæ, ciliatæ, longitudine seminum. Communis in incultis et secus vias. Floret Junio. *Peren.*

148. *Scabiosa graminifolia*. L. S. foliis lineari-lanceolatis, integerrimis, calyce extenso, stellula 5 radiata. Nob. Sc. stellata argentea, angustifolia. C. B. P. p. 270. Moris. H 3; s. 6; t. 15; f. 36. Vedovina argentina. *Due Cent.*

Caules simplices, pedales, adscendentes. Fol. radicalia spathulata, caulina lineari-lanceolata, acuta, integra, basi connata. Capitulum hemisphaericum, fructiferum ovatum. Involucrum polyphyllum, brevius, fol. lanceolato-acutis. Coroll. 5-fidæ roseo-cærulescentes: externæ radiant. Semen conicum, foveolis 8, tomento albo testis. Cal. membranaceus extensus, margine crenulato: stellula radiis 5. Paleæ recept. ut in antecedenti. Planta tomento albo-argenteo testis. In Apennino Lucensi. Floret Julio. *Peren.*

150. *Scabiosa tenuifolia s. cærulea* Roth. Fl. Germ. 2; p. 168. Sc. foliis radicalibus



*spathulatis, caulinis pinnatis, bipinnatisque, calyce extenso, stellula imperfecte 5 radiata. Nob. Sc. uniseta. Fl. Pis. t. 2; f. h, f. Vedovina montana.*

Caulis 3-4 pedalis, cylindricus, glaber. Fol. radicalia primaria spathulata, crenata; secundaria lyrato-pinnatifida, dentata: caulina connato-perfoliata, pinnatifida, laciniis apice latioribus, non raro bipinnatifida, superiora laciniis linearibus. Capitalum hemisphaericum, fructiferum ovatum. Coroll. 5-fidæ, pallide cœruleæ, externae radiantes. Involucr. polyphyllum, brevius, foliol. lineari-lanceolatis. Paleæ et semina ut in *S. columbaria*. Calyx membranaceus, extensus, margine denticulato. Stellula radio interdum unico; sed et 2-3-4, raro 5, et tunc uno alterove brevior. Radii nigrescentes, rigidi. In monte Pisano. Flor. Junio. *Bien.*

Cum Pisanam Floram jam in lucem dedissem, observavi radiorum stellæ numerum in plantis spontaneis variare, et vel 3, vel 4 esse, quandoque etiam, 5, quod in cultis quam frequenter. Quamobrem nomen *unisetae* conservare non potui, eamque *Sc. ochroleuca* varietatem a Rothio indicatam esse duxi.

151. *Gallium rubioides. L. G. foliis quaternis lanceolato-ovatis, trinerviis, rigidis, subtus scabris, caule erecto, fructibus glabris. Lin. Pollich. palat - Roth. Fl. Germ. 2; p. 178. Gaglio robbiforme.*

Caules, adscendentes, ramosi, subpeda-

les, 4-goni, angulis scabriusculis. Fol. quaternaria, ovato-lanceolata, atro-viridia, nitida, venosa, nervis 3, piloso-scabris in pagina inferiori. Flores albi in panicula terminali, densa et corymbosa, pedicellis scabris, bracteis ciliatis. Fructus lævis. In monte *Argentario*, loco dicto, la punta delle tre *Croci*. *Bien.*

152. *Valantia Aparine*. L. *V. pedunculis trifloris*, flore intermedio sessili, lateralibus masculis trifidis subpedicellatis, fructu tuberculato. Perso. Synops. -- Roth. Fl. Germ. 2; p. 548. *Aparine semine coriandri Parkinsonii*. Vaill. paris. t. 4; f. 3 b. *Aparine annua minor*, foliis brevibus, spinulis rarioribus perexiguis, sursum spectantibus in margine munitis, floribus albis, fructu verrucoso. Michel. Catal. H. Flor. in Append. p. 112. *Valanzia Appiccamane* Fl. P.

Caules subpedales, ramosi, diffusi, decumbentes, 4-goni, sulcati, angulis, aculeatis, aculeis deorsum versis. Fol. verticillata, sena, octona, sessilia, lanceolato-acuminata, margine et carina aculeis parvis antrosum versis, cæterum glabra. Pedunculi axillares, solitarii, alterni, foliis subæquales, 3-fidi, flore medio hermaphrodito sessili 4-fido, lateralibus masculis 3-4 fidis. Corollæ albæ. Fructus solitarii, vel binati, globosi, tuberculati. In maris siccis, et in montibus aridis. Floret Junio. *Ann.*

153. *Valantia spuria*. Perso. *V. pedunculis 3-floris*, floribus omnibus pedicellatis,

*fructu granulato, reflexo, caule decumbente, simplici, aculeato.* Pers. Synops. -- *Gallium tricornis.* Smith Brit. *Aparine sem. levi.* Vaill. Paris t. 4; f. 3 a, a. *Aparine annua minor foliis brevibus, lineam circiter latis, spinis creberrimis, deorsum spectantibus in margine munitis, floribus albis, seminibus asperis.* Mich. Catal. H. Flor. in Append. p. 112. *Valanzia spuria.*

Habitus præcedentis a qua præcipue differt, aculeis in margine et carina foliorum retrorsum versis, tuberculisque fructuum minoribus. In collibus maritimis Senensis Provinciae. Floret Junio. *Ann.*

154. *Valantia muralis.* L. V. *foliis quaternis ellipticis, floribus masculis trifidis, germi hermaphroditici insidentibus.* W. *Cruciata muralis minima romana.* Column. Euphr. 1; p. 298; t. 297. *Valantia annua quadrifolia, verticillata, floribus ex viridi pallescentibus, fructu echinato.* Mich. N. P. Gen. p. 13; t. 7. *Valanzia muraria.*

Caulis 3-6 pollicaris, ramosus, diffusus, 4-angulus, sulcatus, pilosus, præcipue versus apicem. Fol. quaterna, elliptica, in petiolum angustata, punctis prominulis adspersa, basi ciliata. Flores terni, axillares, medio hermaphrodito sessili: lateralibus masculis pedicellatis, germi insidentibus. Coroll. pallidæ; hermaphroditi 4-fidæ, masculi 3-fidæ. Præctus, capsula rostrata, cristata, apice, et crista echinata. In muris et in rupium fissuris prope *Campitiam*; ab amico

Jo. Carboncini Pharmacopola expertissimo, lecta. Flor. Majo. Ann.

155. *Gentunculus minimus*, L. Fl. Dan. t. 177. Gaertn. t. 50. *Anagallis paludosa*, minima. Vaill. t. 4; f. 2. *Anagallidastrum exiguum*, foliis lanceolatis &c. Mich. N. P. Gen. p. 14; t. 18; f. 2. Gentinello minimo. *Duc. Cent.*

Caulis 1-2 poll. altus, basi ramosus, foliis alternis ovato-acutis, basi in petiolum angustatis. Flores minimi axillares, solitarii, sessiles, calyce infero 4-fido. Coroll. tubulosa, limbo 4-fido, patente albo, vel rubro. Caps. globosa, unilocularis, circumscissa, polysperma. — In humidis, umbrosisque locis secus fluviam Sieve in *Mugello*, et in Monte Pisano ad scaturigines aquarum. Floret Julio. Ann.

156. *Alchimilla vulgaris*. L. *A. foliis reniformibus*, 9-lobis acute dentatis, corymbis terminalibus, W. Fl. Dan. t. 693. *Alchimilla vulgaris*. C. B. P. p. 319. *Alchimilla*. Lob. ic. 663. *Stellaria*. Mattiol. p. 1236. *Alchimilla Stellaria*.

Caules semipedales et pedales, cylindrici, decumbentes. Fol. radicalia longa petiolata, rotundato-lobata, lobis 8-10, acute dentatis, dentibus apice albis; caulina minora, alterna, breviter petiolata, stipulis vaginantibus, dentatis. Flores parvi, virides, fasciculati, pedunculis ramosis, bracteis rotundatis et acute dentatis instructis, ad caulis et ramorum apicem. Tota planta

pallide viridis, dense et molliter pilosa. In Apennino Mugellano, præsertim loco dicto Monte Ovolo. Flor. Julio. Peren.

157. *Pulmonaria officinalis*. L. P. calyce longitudine tubi, foliis ovatis, hirsutis. Smith. Brit. -- Fl. Dan. t. 482. *Symphytum maculatum*, sive *Pulmonaria latifolia*. C. B. P. p. 259. *Pulmonaria maculosa*. Lob. ic. 586. *Pulm. vulgaris maculoso folio*. Clus. H. 2; p. 169. *Pulmonaria comune*.

Caules herbacei, erecti, angulati, subpedales. Fol. radicalia petiolata, ovato-lanceolata, sessilia, subamplexicaulia. Fl. rubro-cerulei in racemis geminatis, brevibus, terminalibus, incurvis. Flos planta pilis brevibus, albis, rigidis adspersa. Fol. superiori pagina albo maculata. In Apennino, in Monte-Amiata, in Montibus Massæ maritimæ &c. Floret Aprili. Peren.

158. *Atropa Belladonna*. L. A. caule herbaceo, foliis ovatis integris. L. Fl. Dan. t. 758. Savi Mater. Med. t. 48. Gaertn. t. 131. *Solanum melanocerasos*. C. B. P. p. 166. *Solanum lethale*. Dod. pempt. p. 453. Clus. H. 2; p. 86. *Atropa Belladonna*.

Caules herbacei, cylindrici, erecti, dichotomi, pubescentes, 2-3 pedales. Fol. geminata, lateraliter, inæqualia, ovato-lanceolata, acuta, integra, in petiolum angustata glabriuscula. Flor. solitarii, axillares, pendunculati, nutantes. Corol. campanulata; sordide-violacea, pubescens. Anthere crassæ, albæ. Cal. inferus, viscido-pubescent;

*persistens*. Bacca subglobosa, stria longitudinali utrinque insculpta, 2-locularis, glabra, nitida, atra, pulposa, pulpa atropurpurea. Semina numerosa. In Apennino Mugellano, et in nemoribus prope Campiliam. Floret Junio. Peren.

159. *Menyanthes trifoliata*. L. *M. foliis tematis, corolla superne villosissima*. Smith. Brit. Fl. Dan. t. 541. Savi Mater. Medic. t. 47. Gaertner suppl. t. 198. Scarfano Trifoglio fibrino.

Caulis herbaceus, cylindricus, crassus, radicans, adscendens. Fol. ternata, petiolata, foliol. ovato-obtusis, glabris, nitidis, dentato-repandis. Racemi simplices erecti, axillares, pedunculati, folio longiores. Flores pedunculati, bracteis basi pedunculorum, ovato-obtusis subrubentibus. Cal. persistens, campanulatus, 5-partitus, lacin. obtusis. Cor. 1-petala, infundibuliformis, albo-incarnata, limbo 5-partito, lacin. recurvo-patentibus, supra villosis, villis candidis, carnosus, apice parum incrassatis. Stam. longitudine tubi, antheris sagittatis, rubris. Stylus brevis, stigmate bilobo. Germen poris 5-negariferis versus apicem, basi vero squama membranacea, ciliata, cinctus. Caps. ovato-oblonga, 1-locularis, 2-valvis, polysperma. In Palude Blentina. Floret Aprili. Peren.

160. *Primula vulgaris*. Smith. *P. foliis dentatis, rugosis, scapis 1-floris, corollae limbo plano*. Smith. Brit. P. veris 7. L. Sp.

Fl. Dan. t. 194. *P. sylvestris*. Scop. *P. elatior* & W. *P. acaulis*. Enc. Persoon - *Verbasculum sylvestre majus singulari flore*. C. B. P. p. 241. *Primula veris minor*. Dod. Pempt. p. 147. *Sylvarum Primula*. Lob. ic. 569. *Primula veris pallido flore humilis*. Glus. Hist. p. 302. *Alisma sylvarum*. Column. Phytobas. p. 21. *Primula comune*.

*Acaulis*. Fol. obovato-oblonga, rugosa, venosa, obtuse crenata, superiori pagina viridia, glabriuscula; inferiori albida, pubescentia. Scapi plures, uniflori, foliorum longitudine, basi bracteis subulatis instructi. Cal. pyramidatus, 5-angularis. Corol. tubus calyce angustior, cylindricus, superne dilatatus, limbus planus, laciniis 5, rotundatis, emarginatis, pallide luteus, maculis 5-obscurioribus circa faucem. — Variat quandoque laciniis rubro-violaceis centro luteo. Ubique in montanis nemorosis, et sepibus. Floret Martio. *Peren.*

161. *Lobelia Laurentia*. L. *Lob. caule prostrato, ramoso, foliis lanceolato-ovalibus, crenatis, pedunculis solitariis 1-floris longissimis*. W. *Laurentia annua minima flore cæruleo*. Michel. N. P. Gen. p. 18. t. 14. *Lobelia tenera*.

Caules debiles, teneri, diffusi, prostrati, 2-6 poll. longi, simplices vel ramosi. Fol. alterna, ovato-lanceolata, obtuse crenata, in petiolum angustata. Pedunculi terminales, longi, filiformes, 1-flori, bractea lineari, circa dimidium longitudinis instru-

Ati. Cal. 5-dentatus. Corol. 1-petala, irregularis, limbo cœruleo, lacin. 5 inæqualibus, patentibus, tubo albido. Antheræ connatæ: stigma obtusum. Caps. ovata, 2-locularis. In monte Pisano, præcipue in *Ascianni*, *Agnani*, et *Verruca*, humidis. Floret Junio. Ann.

162. *Bupleurum semicompositum*. L. *B. foliis lanceolatis, mucronatis, inferioribus obtusis, involucris subulatis, partiali flore longiore, umbellæ radiis inæqualibus, semine aspero*. Desfont. Fl. Atlant. p. 230. Gouan. illustr. p. 9; t. 7; f. 1. *Bupleuro semicomposito*.

Caulis 6-8 pollicaris, erectus, glaber, angulosus, ramosus, ramis adscendentibus. Fol. lanceolata, vel spathulata, mucronata, trinervia, glabra: superiora acutiora. Umbellæ terminales, vel axillares, radiis 4-6 inæqualibus, altero brevissimo. Involucr. univers. 5-phyllum, fol. lanceolato-acuminatis, trinerviis, inæqualibus. Umbellulæ plerumque 5 floræ, floribus nonnullis pedunculatis. Involucr. part. floribus longius, 5-phyllum, foliol. subæqualibus. Umbellæ axillares plerumque simplices. Semina scabra. Prope *Carthusiam Florentinam* reperi, et ex *Agro Cortonensi* accepi a D. Josepho Diligenti. Peren.

163. *Sium angustifolium*. L. *S. foliis pinnatis foliol. inæqualiter lobatis, serratisque, umbellis pedunculatis oppositifoliis, caule erecto*; Smith. Flor. Brit. - Roth. Fl.



.31

Germ. *Sium nodiflorum*. Fl. Dan. t. 247.  
*S. umbelliferum*. I. B. Hist. 3; p. 173. Sio.  
aquatico. Fl. Pis.

Caulis erectus, basi repens et radicans,  
pedalis et sesquipedalis, ramosus, striatus.  
Fol. impari-pinnata; foliol. 9-13 ovato-lan-  
ceolatis, acute serratis et incis, basi obli-  
quis, impari 3-partito. Umbellæ solitariae,  
oppositifoliae, pedunculatae, erectae. Involu-  
crum univers. polyphyllum, foliol. lanceola-  
tis, deflexis, integris, vel incisis. Invo-  
lucr. part. 5-phyllum, foliol. ovatis, integris,  
vel dentatis. Petala subæqualia, uniformia  
alba. Fructus ovatus. Planta glabra. In  
fossis Agri Pisani, præcipue secus viam  
quæ ducit ad *Pisanas Thermas*. Floret Ju-  
lio. Peren.

164. *Sium latifolium*. L. *S. caule elon-  
gato, sulcato, angulato, foliis pinnatis, fo-  
liol. lanceolatis, æqualiter serratis, umbel-  
la terminali*. Persoon Synops — Fl. Dan. t.  
246. *Coriandrum latifolium*. Roth Fl. Germ.  
*Sium*. Dodon. pempt. p. 579. Sio mag-  
giore.

Caulis herbaceus, erectus 4-5 pedalis,  
fistulosus; sulcatus, angulosus; parum ra-  
mosus. Fol. impari-pinnata, foliol. 7-11 ses-  
silibus, oppositis, obliquis, lanceolatis, vel  
lanceolato-acuminatis, acute serratis. Um-  
bellæ solitariae, terminales, planæ, Flor.  
regulares: pet. alba, subæqualia. Involucr.  
universale et part. 6-8 phyllum, foliol. lan-  
ceolato-acutis; patentibus, vel reflexis. Fru-

\*

Stus globoso-compressus, costato-sulcatus. Planta glabra, nitida. Abundat in Palude Blentina. Floret Junio. Peren.

165. *Sison inundatum*. Lin. *S. repens foliis submersis capillaribus, emersis pinnatis, umbellis bifidis*. Roth. Fl. Germ. sub *Sio* cum bona descriptione. Fl. Dan. t. 89. *Sium aquaticum pumilum, foliis inferne sæniculaceis, superne lobatis*. Moris. H. 3; s. 9; t. 9; f. 5. Sisonte palustre.

Caules 1-3 pedales, repentes, versus apicem erectiusculi, cylindrici, fistulosi. Fol. inferiora submersa, pinnato-multifida, laciniis capillaribus, dichotomis; emersa pinnata, foliol. 3-5, cuneatis, trifidis, vel tridentatis. Umbellæ oppositifoliæ, pedunculatæ, bifidæ, parvæ, 4-6 floræ, floribus albis. Involucrum nullum. Involucella dimidiata, 2-3 phylla. Semina ovata, 4 sulcata, obtusa. In pratis inundatis circa Blentinam. Floret Junio. Peren.

166. *Ligusticum aquilegifolium*. W. L. *foliis triternatis, foliolis trifidis, dentatis, stylis divaricatis, persistentibus*. W. *Danaa aquilegifolia*. All. Fl. Ped. n. 1392; t. 63. *Ligusticum alterum belgarum*. Lob. ic. 786. *Ligustico aquilegifolio*.

Folia radicalia magna, longe petiolata, triternata, foliol. trifidis, incis, crenatis, venosis. Caulis 5-pedalis et altior, subnudus, ramulis brevibus alternis, stipula triangulari acuminata instructis. Umbellæ solitariæ, cauli ramisque terminales,

planæ, densiusculæ, radiis subæqualibus; invol. universali 6-phyllo, foliol. lineari lanceolatis, acuminatis; invol. part. 3-4 phyllo. Petala alba. Styli divaricati, persistentes. Fructus didymi, inflati, glabri, nitidi, maculis 4-longitudinalibus rufescentibus. Tota plaura glabra. In collibus Pisanis, præcipue à *Fauglia*. Floret Julio. *Peren.*

167. *Sambucus racemosa*. L. *S. racemis compositis, ovatis, caule arboreo*. L. *Sambucus racemosa rubra*. C. B. P. p. 456. *Sambucus montana racemosa*. Lob. ic. 2; p. 163. *Sambucus racemosa acinis rubris*. I. B. Hist. 1; p. 551. *Sambuco montano*.

Frutex 10-12 pedalis, ramis cylindricis, cortice atro-rubente. Fol. decidua, opposita, impari-pinnata, foliolis 5-7 ovato-lanceolatis, acuminatis, glabris: stipulæ geminatae, parvæ, ovato-obtusæ, callosæ. Racemi terminales, erecti, compositi, ovati, densi. Corollæ albo-viridescentes. antheræ luteæ: bæccæ rubræ. In Apennino Pistoriensis. Floret Aprili.

168. *Lilium Martagon*. L. *L. foliis verticillatis, ovato-lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis*. W. *Lilium floribus reflexis montanum*. C. B. P. p. 77. *Lilium montanum*. Lob. ic. 168. — Clus Hist. 134. *Asphodelus fæmina*. Fuchs. Hist. p. 115. *Giglio Martagone*.

Caulis 2-3 pedalis, saturate viridis, maculis parvis atris variegatus. Fol. lanceolata, nervosa, nonnulla verticillata, cætera

sparsa. Flores in racemo terminali, nutantes, distantes, pedunculati, pedunculis horizontalibus, bractea lanceolato-acuminata instructis. Petala rubra, punctis saturatioribus adspersa, lanceolato-obtusa, crassa, medio sulcata, arcuatim retrorsum curvata. Odor fortis ingratus. Floret Junio. Datur varietas foliis, petalisque externa superficie pilosis, pilis longiusculis, albis, intricatis. In Apennino Pistoriensi et Mugellano. Floret Junio. *Peren.*

169. *Peplis Portula*. L. *P. floribus hexandris axillaribus, solitariis, foliis petiolatis, subrotundo-ovatis*. W. Fl. Dan. t. 64. Gærtn. t. 51. *Glaux altera subrotundo folio*. Vaill, paris. t. 15; f. 5. *Glaucoides palustre, portulacæ folio, flore purpureo*. Mich. N. P. Gen. p. 21; t. 18. Lamarck. illustr. t. 26. *Peplide palustre*.

Caules herbacei, diffusi, cylindrici, striati, 3-6 pollicares. Fol. opposita, spatulata, rotundata, extipulata, superiora approximata. Flores axillares, solitarii, subsessiles, bracteis 2-lineari subulatis, sub calyce. Cal. campanulatus, 12-dentatus, dentibus alterne majoribus. Petala 6, ovato-obtusa, rubella, diaphana, dentibus calycinis majoribus respondentia. Capsula super, globosa, bilocularis, evalvis, polysperma. Tota planta glabra. In Monte Pisano ad scaturigines aquarum. Floret Jun. *Ann.*

Individua nonnulla apetala reperii.

170. *Alisma ranunculoides*. L. *A. foliis*

*linearis lanceolatis, fructibus globoso-squar-  
rosis*. L. Fl. Dan. t. 122. *Plantago aqua-  
tica humilis angustifolia*. I. B. Hist. 3. p.  
788. Lob. ic. 300. *Mestolaccia Ranuncu-  
lio*.

Folia longe petiolata, erecta, lineari-  
lanceolata, integerrima, plana, carnosa,  
glabra. Scapi foliis longioris, purpurascen-  
tes. Flores in umbella terminali, quando-  
que etiam in verticillo umbelliformi circa  
dimidium scapi dispositi. Pedunculi 1-flori,  
inæquales, tennes, bracteis parvis, lineari-  
acuminatis, scariosis, ad basim involucrati.  
Petala 3, obtusa et obtuse crenata, rosea,  
prope unguem alba, ungue lutea. Stami-  
na et germina lutea. Folia calycis 3, co-  
chleariformia, obtusa, lutescentia. Semina  
ut in Ranunculis, in capitulum digesta,  
ovata, acuta, sulcata. In palustribus Syl-  
va Pisanæ, et circa *Blentinam* frequens.  
Floret Junio. *Peren*.

171. *Anagyris fœtida*. L. -- C. B. P. p.  
391. Camer. Epit. p. 671. *Anagyris vera  
fœtida*. Jo. Bauh. Hist. 1; p. 2; pag. 364.  
*Anagride fœtida*. *Due Cent*.

Frutex 6-7 pedes altus. Fol. decidua,  
alterna, sparsa, petiolata, ternata, foliolis  
lanceolatis, acutis, pallidis, superne gla-  
bris, inferne pubescentibus; Stipulæ acutæ  
oppositifoliæ, amplexicaules, caducæ. Flo-  
res in racemis axillaribus, bractæati, bra-  
cteis concavis, ovato-acutis, caducis. Pet.  
luteo-viridia. Vexillum breve, rotunda-

tum, emarginatum, nigro punctatum. Alæ lanceolatæ. Carina longior lanceolata. Legumen oblongum, compressum. In Provincia inferiori Senensi prope *Manlium* (*Magliano*). Floret Januario.

172. *Dittamnus* albus. L. Bertol. pl. rar. Gen. *D. albus* vulgo *frassinella*. C. B. P. p. 222. *Fraxinella Cordi &c.* Lob. ic. 2; p. 96. *Dittamo bianco*. Mattioli. p. 74. *Fraxinella alba*. Gærtn. t. 69. *Frassinella Dittamo bianco*.

Caulis simplex cylindricus, solidus, erectus, sesquipedalis. Fol. radicalia primaria, simplicia, cœtera impari-pinnata; Foliola opposita, in foliis inferioribus ovato-rotundata, in caulinis ovato-acuta, serrata. Flores pedicellati, in racemum ovalem dispositi, grandes, speciosi. Calyx ruber, 5-phyllus. Pet. 5-unguiculata, ovato-lanceolata: 2 superiora erecta paulo majora, inferius declinatum, externa purpurascencia, interne alba, venis rubris picta. Stam. 10 declinata. Bractæ 3 cuique flori. quarum inferior cauli, et 2-laterales pedicello adnexæ. Capsulæ 5 introrsum coalitæ compressæ, 2-valves. Glandulæ punctiformes, impressæ, diaphanæ in foliis: in calycibus autem, in bracteis, petalis, staminum vertice, et caulis superiori parte, glandulæ globosæ, rubræ, e quibus foetidus viscidusque humor exsodat. In Apennino Magellano et Pistoriensi. Floret Junio et Julio. *Peren.*

173. *Gypsophyla muralis*. L. *G. foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule dichotomo, petalis crenatis*. L. Fl. Dan. t. 1268. *Caryophyllus minimus, petalis parvis in summitate complanatis et cordatis, extus purpureis, interne dilutioribus et lineis tribus saturatioribus distinctis*. Mich. Cat. H. Flor. p. 23; n. 10. *Gissofila minore*. Caules 4-5 pollicares, tenues, ramosi, articulati, diffusi. Fol. linearia, acuminate, basi connata. Flores solitarii in apice ramorum et dichotomia. Calyces striis 5-viridibus. Petala obtusa, leviter emarginata, vel crenata, pallide rubra, venis 3 purpureis picta. Bractæ 2 parvæ, lanceolato-acuminatæ, dorso viridi, margine acarioso albo. In collibus argillaceis Senensis et Cortonensis provinciæ. Flor. Julio. Bien.

174. *Gypsophyla saxifraga*. L. *G. foliis linearibus, calycibus angulatis, squamis quatuor, corollis emarginatis*. L. *Caryophyllus saxifragus strigosior, sive Caryophyllus sylvestris, flore minimo*. G. B. P. p. 211. *Betonica coronaria, s. Tunica minima*. I. B. Hist. 3; p. 337. *Lychnis pumila caryophyllata, flore rubello, italidis Hemorroidalis*. Barrel. ic. 998. *Caryophyllus minimus Laricis folio, petalis parvis obtusis, cordatis, dilute purpurascens, ac interne lineis tribus saturatioribus distinctis*. Mich. Cat. Hort. Flor. p. 23; n. 9. - et *Caryophyllus minimus cretus, su-*

*basper*, caulibus palmaribus, ramis magis expansis, foliis tenuissimis, floribus purpureis solitariis, petalis cordatis, integris, tres lineas longis, et unam latis, calyce costulato. Mich. ibid. in Append. p. 125 *Gissofila muraria*. Fl. Pis.

Caules caespitosi, subpedales, basi decumbentes et lignosi, teretes, superne filiformes, articulati. Fol. opposita, linearia, acuminata, basi connata. Flores in apice ramorum et dichotomia, solitarii. Calyx angulatus, cinctus bracteis 4-ovatis, apice subulatis, margine membranaceo. Petala pallide incarnata, emarginata, striis 3-purpureis basi picta. Frequens in muris antiquis, et rupium fissuris. Flor. Julio. Peren.

175. *Saponaria Vaccaria*. L. *S. calycibus pyramidalis, 5-angulatis, foliis ovatis acuminatis, sessilibus*. Lin. Bertolon. Plant. rar. Gen. *Lychnis segetum rubra, foliis perfoliatis*. C. B. P. p. 204 *Vaccaria*. Dodon. Pempt. p. 104. *Vaccaria rubra major*. Dalech. Hist. p. 515. *Saponaria campestre*.

Caules subpedales, erecti, plerumque simplices, geniculis incrassatis. Fol. opposita, sessilia, subconnata, cordata, ovato-lanceolata, acuta. Florescentia 2-3-chotoma, corymbosa. Calyces 5-goni, angulis acutis, exsertis. Petala rosea, striis saturatioribus picta, apice denticulata. Inter segetes, sed non frequens. Flor. Majo. Ann.

176. *Silene bipartita*. Desf. *S. foliis*



*inferioribus spathulatis, floribus racemosis, secundis, nutantibus, petalis bipartitis.* Desfont. Fl. Atlant. p. 352; t. 100. *Silene bifida*.

Caules adscendentes 6-10 poll. longi. Fol. opposita, infer. spathulata, basi ciliata, apice mucronulata: superiora lanceolato-acuta. Flores in summitate caulis et ramorum, distantes, secundi, pedunculati, nutantes, post anthesim erecti, bracteis 2-lanceolatis, pedunculo brevioribus. Cal. subcylindricus, basi angustatus, striis 10-viridi, rubescentibus, dentibus ciliatis, et pilorum fasciculo terminatis. Petala rosea, profunde 2-partita, laciniis obtusis, obliquis; corona faucis obtusa. Caps. ovata. Tota planta pallide viridis, holosericea. Communis in arenosis Sylvarum Pisanarum. Floret Majo et Junio. *Ann.*

177. *Arenaria marina*. Sm. *A. foliis semicylindricis carnosis muticis, stipulis scariosis, vaginantibus, seminibus compressis marginatis glabris.* Smit. Brit. Fl. Dan. t. 740. *A. marginata*. Decand. *Alsine maritima*, sive *spergula marina major perennis, foliis angustis succulentis, unum latus spectantibus, flore pentapetalo purpurascente, petalis subrotundis et integris, semine fusco compresso, margine foliaceo aucto.* Michel. Cat. H. Flor. p. 5; n. 10. *Arenaria marina.* Fl. Pis.

Caules basi ramosi 4-8 pollicares, decumbentes, glaberrimi, Fol. opposita, semicylindrica, carnosae, glabra, subsecunda,

internodiis æqualia, vel longiora. Stipulae extrafoliaceae, oppositae, amplexicaules, albo-scariosae acutae, lacerae. Petala subrotunda, purpurascentia: Calyc. et pedunculi piloso-viscidi. Caps. calyce longior. Sem. compressa, nigra, margine dilatato, albo. In arenosis maritimis. Floret Julio. *Peren.*

178. *Arenaria rubra*. Smith: *A. foliis linearibus mucronulatis, stipulis scariosis vaginantibus, seminibus compressis angulatis scabriusculis*. Smith. Fl. Brit. *Arenaria rubra* & *campestris*. L. *Spergula purpurea*. I. B. Hist. 2; part. 2; p. 722 *Alsine maritima annua, glabra, sive spergula marina media, foliis longioribus angustis succulentis, floribus pentapetalis purpurascentibus ferme sine pediculo, petalis subrotundis integris, lineam longis, semine exiguo non marginato*. Michel. Cat. Hort. Flor. in Append. p. 109.; n. 17. *Arenaria campestre*. *Due Cent.*

Caules 3-6 pollicares, prostrati, ramosi, diffusi. Fol. opp. plana, filiformia, mucronulata, internodiis breviora vel æqualia. Stipulae ut in antecedenti. Petala purpureo-cœrulea, pallida, calyci subaequalia. Cal. longitudine capsulae. Sem. fusca, angulata, minima, absque margine. Pedunculi et calyces piloso-glandulosi. In incultis et arenosis Agri Pisani. Floret Junio. *Ann.*

179. *Asarum europaeum*. L. *A. foliis reniformibus, obtusis*. L. Fl. Dan. t. 633.

Savi Mat. Med. T. 19. Gart. t. 14. *Asarum* C. B. P. p. 197; Fuchs. Hist. p. 10. I. B. Hist. 3; part. 2; pag. 548. *Asaro nostrale*.

Radix repens, cauliculos breves emittens, teretes, squamosos, bifolios. Fol. reniformia, obtusa, coriacea, venosa, superne atro-viridia, glabra, nitida; inferne pallidiora pubescentia, petiolis pubescentibus. Flos 1, inter folia, pedunculo petiolis brevior, Cal. 1-phyllus, urceolatus, 3-fidus, externe viridis et pubescens, interne atro-purpureus. Stamina 12, germini inserta: Antherae medii filamentis adnatae. Stigma 6-fidum, stellatum, Caps. 6-locularis, calyce coronata. In Apennino Mugellano, et in montibus *Fauglia*. Floret Martio. Peren.

180. *Euphorbia exigua*, L. *E. umbellata trifida*, dichotoma, involuclis lanceolatis, foliis linearibus. L. Bertol. pl. rar. Gen. - Fl. Dan. p. 592. *Tithymalus sive esula exigua*. C. B. P. p. 291. *Titimalo leptifillo*. Mattioli p. 1317. *Tithymalus minimus angustifolius annuus*. I. B. Hist. 3; part. 2; p. 664. *Tithymalus arvensis annuus minimus*, foliis lini angustissimis, flore perexiguo, sectionibus quaternis ovatis aut reniformibus, lutescentibus, barbula longe concolore auctis, fructu trigono ad angulos verrucoso, semine levi. Mich. Cat. H. Flor. in App. p. 177; n. 6. *Euphorbia minuta*.

Plantula 3-6 poll. alta, ramosa, ramis

patentibus. Fol. linearia, integra, acuta, vel emarginato-mucronulata, vel apice rotundata. Umbella 3-4-fida, radiis 2-fidis, vel dichotomis. Invol. universale, fol. lanceolato-acutis, angustis, subcordatis. Involucella conformia. Laciniae externae calycis 4, luteo-virides, lunulatae, bicornes. Caps. glabrae, nutantes, Sem. reticulata. In sterilibus et incultis. Flor. Jul. Ann.

Michelii Synonymum retuli Targionii auctoritate permotus, licet apprimè non convenire videatur, eo quod planta haec non habent capsulas in angulis verrucosae, quae potius rugosae in statu siccitatis dici possent.

181. *Euphorbia platyphylla*. L. *E. umbella subquinquefida, trifida, dichotoma, involucellis ovato rhombeis, carina pilosis, foliis serrulatis, capsulis verrucosis*. Smith. Brit. *Tithymalus platyphyllos*. Fuchs. Hist. p. 813. - L. B. Hist. 3; p. 670. *Tithymalus arvensis annuus, latifolius germanicus*. Morris. H. 3<sup>e</sup> s. 10; t. 3; f. 1. *Euphorbia campestre*.

Caules pedales et bipedales, glabri, inferne rubicundi. Fol. patentia vel deflexa, lanceolato-acuta, cordata et fere auriculata, inferiora in petiolum decurrentia minute serrata, superne glabra, vel paucis brevibusque pilis adspersa, inferne pilis longioribus praecipue supra nervum munita. Umbella plerumque 5-fida; sed etiam 3-fida, radiis 3-fidis et dichotomis. Invo-

lucrum primar. et secundar. foliis conforme: involucella ovato-rhombea, versus apicem minute serrata, carina pilosa. Præter umbellam, rami floridi plures axillares, per caulem sparsi observantur. Cal. ventre pilosus, laciniis 4, externis rotundatis glabris, flavis. Capsulae glabrae, obsolete verrucosae. In pratis humidis Agri Pisani, circa *Blentinam*, et in Mugello secus flumen *Sieve*. Floret Junio. *Ann.*

182. *Euphorbia spinosa*. L. *E. umbella subquinquefida simplici, involucellis ovatis: primariis triphyllis foliis oblongis integerrimis, caule fruticoso*. Lin. *Tithymalus ragusinus, flore luteo pentapetalo*. Herm. H. Lugd. p. 600. t. 601 *Esula frutescens s. Pithyusa romanorum*. Barrel. ic. 197. *Tithymalus montanus saxatilis, fruticosus et cespitosus, humilis, caulibus lignosis, tenuiter et dense ramificatis, hyperici folio glauco, florum sectionibus quinis, subrotundis, fructu verrucoso, semine levi*. Targioni in Append. ad Catal. H. Florent. p. 179. *Euforbia spinosa. Fl. Pis.*

Caules ramosi, cespitosi, pedales, et sesquipedales, ramis diffusis, flexilibus, pubescentibus, aetate pallidioribus, rigidis, apice spinescentibus. Fol. sparsa, sessilia, lanceolata, acuta vel obtusiuscula, integra, viridi-glauca, perennantia. Umbellae ramis terminales, parvae, simplices, 3-6 fidae. Involucrum foliis conforme. Involucella ex foliol. 2, minoribus, latioribus.

Calyc. laciniae externae 5, subrotundae, integræ. Capsulæ verrucosæ. Tota planta glabra, glauco-viridis. In montibus maritimis Etruriæ. Floret Febuario et Martio. *Peren.*

183. *Euphorbia Paralias*. L. *E. umbella subquinquefida*, involuclis cordato-reniformibus, foliis sursum imbricatis. L. *Tithymalus maritimus*. C. B. P. p. 291. Dod. Pempt. p. 366. *Tithymalus paralias*. Camer. Epit. p. 962. *Tithymalus maritimus semper-virens*, glaucus, foliis biuncialibus, ad polygonum accedentibus, neque serratis, neque auriculatis, flore luteo, fructu non nihil rugoso, semine lævi. Mich. Rar. in Append. ad Catal. H. Florent. p. 178. *Euforbia marina*. *Fl. Pis.*

Caulis pedalis et sesquipedalis, ramulis brevibus sparsis, floriferis: foliis perennantibus, crebris, linearibus acutis, integris, crassiusculis, plerumque sursum imbricatis. Umbella 5-fida, radiis 2-fidis et dichotomis. Involucrum 5-phyllum, foliis ovato-cordatis acutis. Involucella cordato-reniformia, concava. Laciniae externae calycis 4 lunulatae, fulvae. Capsulæ, rugosæ. Tota planta glabra, et glauca. In arenosis maritimis. Floret Junio. *Peren.*

184. *Euphorbia acuminata*. E. *umbella 3-subquinquefida*, subdichotoma, involuclis cordatis mucronatis, foliis oblongo-spathulatis acuminatis, capsulis conoideis lævibus. Enc. *Peplis annua foliis acutis, flore*

*muscoso*. Bocc. sic. p. 24; t. 13. f. 1. Morris. H. 3; S. 10; t. 1; f. 3. *Pithyusa angustis acutisque esula foliis*. Bar. ic. 752. *Euforbia triviale*.

Caulis semipedalis aut pedalis, non raro per totam longitudinem ramis axillari-  
bus, floriferis vestitus. Fol. approximata,  
oblonga, spathulata, integerrima, apice acu-  
minata, vel potius mucronulata. Umbella  
3-5 fida, radiis dichotomis. Involucr. fo-  
liis conforme: Involucella diphylia, fol. ova-  
to-rhomboidalibus, lobis inæqualibus, mu-  
cronatis. Flores luteo virides. Calic. lac. 4  
externæ lunulata, bicornes. Capsulæ conoi-  
dæ, obtusæ, glabrae. Planta glabra, pal-  
lide viridis. Communis per totam Etru-  
riam. Floret Julio. Ann.

185. *Euphorbia Barrelieri*. Nob. *E. umbella quinquesida, 2-fida, involucellis cor-  
dato-subrotundis, capsula levi, foliis lan-  
ceolato-ellipticis, integris, subamplexicau-  
libus, mucronulatis*. Nob. *Tithymalus ma-  
rinus, latifolius, italicus*. Barrel. ic. 823. *Tithymalus sempervirens totus glaucus, fo-  
liis per basim caulem vaginæ instar am-  
plexantibus, florum sectionibus lunatis et  
testiculatis, fructu oblongo et semine levi-  
bus*. Mich. Rar. in Append. Cat. H. Flo-  
rent. p. 178. *Euforbia Barrelieriana*.

Caulis pedalis ramosus. Fol. elliptico-  
lanceolata, integra, mucronulata, semiam-  
plexicaulia, fere auriculata, angustiora  
in ramis sterilibus, in floriferis vero sue-

cessive adscendendo latiora ut ovata evadant. Umbella 5-fida, radiis 2-fidis. Folia involucri prim. ovato-cordata. Involuc. cordato-subrotunda vel reniformia, integra. Lac. calyc. externæ 4. lunulatæ. Caps. oblonga, lævis. Planta sempervirens, glabra, glauca. Anno 1789. in arenosis maritimis *Orbetellanis*, et *Castilionis Piscaria* reperi. Floret Junio. *Peren.*

186. *Euphorbia Pithyusa*. L. *E. umbella* 5-fida, 2-fida, involucellis ovatis, foliis lanceolatis, infimis involutis, retrorsum imbricatis. L. - Desf. Fl. Atlant. *Tithymalus foliis brevibus aculeatis*. C. B P. p. 292. Moris H. 3; s. 10; t. 2; f. 28. *Pitiusa*. Mattiol. p. 1319. *Tithymalus maritimus juniperifolius*. Boccon. sic. p. 9; t. 5; f. 2. Moris. H. 3; s. 10; t. 1; f. 25. *Euforbia Pitiusa*.

Caules pedales aut semipedales, ramis congestis, et fere verticillatis, inferne rubicundi, nudi, in quibus cicatrices foliorum delapsorum observantur. Fol. dense imbricata, angusta, lanceolato-acuta, mucronata: inferiora involuto subulata-demum deflexa. Umbellæ parvæ 3-6 fidae, radiis 2-fidis. Lacin. calyc. externæ 4, luteæ, cordatæ. Capsulæ glabræ. Planta glabra. In scopulis maritimis. Flor. Junio. *Peren.*

187. *Euphorbia cyparissias*. L. *E. umbella multifida, dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus, foliis setaceis, caulinis lanceolatis*. L. - Bertol. Pl. rar. Gen.



*Tithymalus cyparissias*. C. B. P. p. 291. Mattiol. p. 1315. Moris. H. 3; s. 10; t. 2; f. 29. *Tithymalus cupressinus*, seu *humipinus*. Lob. ic. 356. *T. repens humidis*, *cyparissias dictus*, foliis *linariae tenuissimis*, *umbella lutea*, *floribus concoloribus*, *sectionibus lunatis*, *fructu ad angulos verrucoso*. Mich. Cat. Pl. Agr. Flor. in Append. p. 177; n. 10. et *T. repens* &c. . . . *umbella florum rubente*. Ibid. n. 8. *Euforbia cipressina*. Fl. Pis.

*Radix repens*. *Caulis erectus pedalis*, *ramosus*, *basi nudus*, *superne foliis angustis lanceolatis*, *dense vestitus*: *rami inferiores steriles*, *foliis linearibus et fere capillaceis*. *Umbellae 9-12 fidae*, *radius 2-fidis et dichotomis*. *Involucrum polyphyllum*, *fol. linearibus*. *Involucell. cordato-reniformia*, *integerrima*, *absque mucrone*, *post florescentiam purpurea*. *Lacin. calyc. externae 4. lunulatae*, *bicornes*, *luteae*. *Caps. angulis verrucosis*. *Planta glabra*. *In aggeribus et collibus frequens*. *Floret Majo*. *Peren.*

188. *Euphorbia Esula*. L. *E. umbella multifida*, *2-fida*, *involucellis subcordatis*, *petalis subbicornibus*, *ramis sterilibus*, *foliis uniformibus*. L. *Tithymalus foliis Pini*, *forte Dioscoridis*. C. B. P. p. 292. *T. pinea*. Lob. ic. 357. *T. foliis Pini*, *forte Dioscoridis Pithyusa*. Moris. H. 3; s. 10; t. 1; f. 27. *T. repens* (quandoque non repens radice crassa) *elatior*, *olea folia*

glauco non serrato, radiis umbellæ prælongis florum, sectionibus lunatis et breviter caudatis, fructu et semine laevi. Mich. Cat. H. Flor. in Append. p. 178; n. 12. Euforbia Esula. Fl. Pis.

Rad. repens. Caulis pedalis vel sesquipedalis. Fol. lanceolato-spathulata, obtusiuscula. Umbella magna, multifida, radiis longis, 2 fidis. Involucella cordato-reniformia, integerrima, apice, mucronulata. Lacin. externæ calic. 4, lunulatae, bicornes, luteæ. Caps. oculo nudo glabra, oculo armato leviter scabra. Rami floridi et rami steriles per caulem sparsi, foliis conformibus. Communis in aggeribus Agri Pisani. Floret Majo et Junio. Peren.

189. *Pyrus Aria*. W. P. foliis simplicibus, ovatis, incisis, serratis, lineatis, subtus tomentosis, floribus corymbosis subdigynis. Smith. Fl. Brit. *Crataegus Aria*. Lin. - Fl. Dan. t. 302. *Alni effigie, lanato folio major*. C. B. P. p. 452. *Aria Teophrasti effigie alni*. Lob. ic. 2; p. 167. *Sorbus alpina*. I. B. Hist. 1; p. 65. *Pero montano*.

*Arbor humilis*. Fol. decidua, alterne sparsa, petiolata, ovato-acuta, duplicato-serrata, venis parallelis, superne glabra, nitida, late viridia, inferne albo-tomentosa. Stipulae geminae, lineari-acuminatae, caducae. Flores albi corymbosi, calycibus pedunculisque albo-tomentosis. Styli 2-4. Fructus rubri, pruinosi. Semina 2-4. Floret.

Majo. In *Monte-Amiata*, loco dicto *la Valle grande*.

190. *Pyrus torminalis*. W. & P. *foliis simplicibus, subcordatis, serratis, septem lobatis: lobis infimis divaricatis*. Smith. Fl. Brit. *Crataegus torminalis*. L. — Fl. Dan. t. 798. *Mespilus Apiifolio sylvestris, non spinosa, seu sorbus torminalis*. C. B. P. p. 454. *Sorbus torminalis* Plinii. Job. ic. p. 200. Mattioli. p. 284. I. B. H. 1. p. 63. Pero Ciavardello.

Arbor mediæ magnitudinis, foliis deciduis, alterne sparsis, petiolatis, glabris, lobatis, lobis plerumque 7. inæqualibus, acuminatis, serratis, 2-inferioribus divergentibus: Stipulæ geminæ, lineares, caducæ. Flores albi, corymbosi, pedunculis tomentosis. Calyc. glandulosi. Styli 2-3. Fructus pyriformes, punctati, fusci. In *Monte-Amiata* et in *Monte Argentaro*. Floret Majo.

191. *Spiræa Aruncus*. L. S. *foliis bipinnatis, floribus hermaphroditis, masculisque*. Gouan. illustr. p. 31. *Barba Capræ floribus oblongis*. C. B. P. p. 163. *Barba Capri*. Fuchs. Hist. p. 181. *Spiræa Barba Caprina*.

Caulis herbaceus, circiter tripedalis, subcylindricus, flexuosus. Folia longe petiolata; radicalia 2-3 pinnata, caulina simpliciter pinnata, foliolis oppositis, subsessilibus, ovato-lanceolatis, acuminatis, irregulariter serratis, laete viridibus, glabris,

inferioribus bilobis. Spicae tenues, acuminatae, in paniculis terminalibus et axillaribus dispositae. Flores parvi, candidi, bracteolis solitariis acuminatis caducis instructi, in apice spicae masculi, reliqui hermaphroditi. In Apennino Pistoriensi, loco dicto il Pian della Quercia. Floret Majo. Peren.

192. *Papaver Rhoeas*. L. *P. capsulis glabris subglobosis, caule multifloro hispido, pilis omnibus patentibus, foliis pinnatifidis incisis*. Smith. Brit. *Papaver erraticum majus*. C. B. P. p. 171. Moris. H. 2; s. 3; t. 14; f. 6. Papavero Rosolaccio. Fl. Pis.

Caules pedales et sesquipedales, ramosi. Fol. pinnatifida, pinnulis incisis, impari majore. Pedunculi longi, nudi, 1-flori. Pet. magna, saturate punicea, basi nigra. Filamenta filiformia, nigra, antheris plumbeis. Caps. subglobosa, glabra. Planta pilosa, pilis omnibus patentibus. Communis in agris. Floret Majo. Ann.

193. *Papaver dubium*. L. *P. capsulis glabris oblongis, caule multifloro piloso, pilis pedunculorum adpressis, foliis bipinnatifidis*. Smith. Brit. — Fl. Dan. t. 902. — Curtis Fl. Lond. Fasc. 5; t. 37. *Argemone capitulis longioribus glabris*. Moris. H. 2; s. 3; t. 14; f. 11. Papavero salvatico.

Gaulis ramosus sesquipedalis et bipedalis. Fol. 2 pinnatifida, laciniis acutis. Pedunculi longi, nudi, 1-flori. Pet. rubra,

vel carnea. Filamenta filiformia, nigra, antheris fusco-spadiceis. Caps. oblonga, glabra, nec sulcata, nec costata. Planta pilosa, pilis in ramis et pedunculis, adpressis. Cum præcedenti. Flor. Majo. Ann.

Capsula hujus Papaveris in *Fl. Danica* longitudinaliter costata repræsentatur: a *Smithio* vero sulcata dicitur: Sed apud nos absque costis et sulcis reperitur, uti in icone *Floræ Londinensis*, loco citato conspicitur.

194. *Papaver hybridum*. L. *P. caule multifloro, foliis pinnatifidis, pinnis incisis, capsula subgloboso-torosa hispida, pilis pedunculorum adpressis*. Nob. *Argemone capitulo brevior* C. B. P. p. 172 *Argemone capitulo hirsuto rotundo, torulis canaliculato*. Moris. H. 2; s. 3; t. 14. f. 9. *Papavero spinoso*. *Fl. Pis.*

Caules sesquipedales, erecti, ramosi. Fol. pinnatifida, laciniis angustis, incisis, acutis, aristatis. Pedunculi longi, nudi, uniflori. Petala coccinea, basi macula nigra vel violacea, apice crenata. Filamenta filiformia castanea, antheris cyaneis. Capsulæ subglobosæ, sulcato-torosæ, setis rigidis, sursum versis muricatæ. Planta hispida, pilis caulinis et pedunculorum adpressis. Cum præcedentibus, eodemque tempore floret. Ann.

195. *Filia platyphyllos*. Vent. T. *foliis cordato-subrotundis, acuminatis, inæqualiter serratis: nuce turbinata, costis*

*prominentibus insignita, lignosa, crassa.*  
 Ventenat Monogr. du Tilleul. Planch. 1.  
 f. 2 *Tilia europæa* var. α. Lin. *Tilia femina*  
*folio majore*. C. B. P. p. 426. *Tilia vulga-*  
*ris platyphyllos*. I. B. Hist. 1; p. 133. *Ti-*  
*glio nostrale*.

Arbor procera, foliis alternis, petiolatis,  
 cordato-rotundatis, acuminatis, inæqualiter  
 serratis, superne glabris, inferne pubescen-  
 tibus, pilis ferrugineis fasciculatis in rami-  
 ficationibus nervorum. Stipulæ geminatæ,  
 oblongæ, sublanceolatæ, obtusæ, membra-  
 naceæ, pubescentes, caducæ. Bractæ axil-  
 lares, liguliformes, cartilagineo-membra-  
 naceæ, obtusæ, albicantes, glabræ, nervo-  
 sæ, longitudine foliorum, e medio emit-  
 tunt pedunculum, secundum longitudinem  
 adnatum, apice ramosum, 5-6 florum. Flo-  
 res albi, odori. Cal. inferior deciduus,  
 monophyllus, 5-fidus. Pet. 5. lineari-lan-  
 ceolata, obtusa, concava. Nux turbinata,  
 crassa, 5-costata, costis longitudinalibus,  
 prominentibus, 5-locularis, loculis 1-sper-  
 mis, unico fertili. In nemoribus Apenni-  
 ni, in *Monte-Amiata* &c. Floret Junio.

196. *Tilia mycrophylla*. Vent. *T. fo-*  
*liis cordato-subrotundis, acuminatis, argu-*  
*te serratis, nuce subglobosa, vix costula-*  
*ta, tenuissima, fragili*. Venten. loc. cit.  
 Planch. 1; t. 1. *Tilia europea*. var. γ. Lin.  
*Tilia folio minore*. I. B. Hist. 1; p. 137.  
*Tilia bohémica foliis minoribus glabris,*  
*fructu oblongo, utrinque acuminato, mini-*

*me costulato*. Michel. Cat. H. Pis. p. 165; t. 49; f. 3. Tiglio maremmano.

Similis praecedenti, sed procerior. Differt quoque foliis minoribus, fasciculis pilorum longioribus et densioribus, nuce ovata vel rotundata, vix costulata, pariete tenuiori fragili. In Montibus Provinciae inferioris Senensis, prope *Catabbio*. Flor. Jun.

197. *Cistus halimifolius*. L. C. fruticosus extipulatus, foliis oblongo-ovatis subacutis in petiolum attenuatis, utrinque incanis, pedunculis longis ramosis, subpaniculatis. Enc. C. femina, portulacae marinae folio latiore obtuso. C. B. P. p. 465. C. folio halimi 1. Clus. H. 1; p. 71. C. halimi minoris folio. Barrel. ic. 281. Cisto maremmano.

Frutex tripedalis, ramosus viridi-oineus. Folia inferiora obovata, obtusa, superiora oblongo-ovata acutiuscula, basi in petiolum angustata, integra, utrinque incana. Florescentia paniculata, bracteis ad ramorum divisiones lineari-lanceolatis. Petala obtusa, lutea, basi macula rotunda atro-rubente insignita. In maritimis Etruriae, prope *Turrim S. Vincentii*. Misit Carboncinus. Floret Junio.

198. *Cistus Tuberaria*. L. C. extipulatus perennis, caule subsimplici, foliis radicalibus ovatis, trinerviis, tomentosis: caulinis glabris, lanceolatis, summis alternis. Enc. *Cistus folio plantaginis*. C. B. P. p. 465. *Tuberaria major et Tuberaria minor*.

Dalech. Hist. p. 1099 *Tuberaria nostras*,  
et *Tuberaria major*. I. B. Hist. 2; p. 12.  
*Helianthemum plantaginis folio perenne*.  
Buxb. Centur. 2; p. 33; t. 63. Cisto pian-  
tagginifolio.

Fol. radicalia ovato-acuta, basi in pe-  
tiolum angustata, tomentosa, nervis 3-5  
longitudinalibus. Caulis herbaceus, subsim-  
plex erectus, subpedalis. Fol. caulina lan-  
ceolata, glabra, sessilia, opposita, sub-  
connata: superiora alterna. Flores lutei:  
Bractæ parvae ad ramulorum divisiones.  
Cal. glaber. Communis in Monte Pisano,  
et in collibus maritimis. Floret Majo. Pe-  
ren.

199. *Cistus Savii*. Bertol. *C. suffru-  
ticosus, stipulatus, adscendens, foliis lan-  
ceolatis, acutis, planis, pubescentibus, sub-  
petiolatis, superioribus alternis, racemo la-  
xifloro, simplici; calycibus hirsutis*. Bert.  
Dec. 11; p. 36. Cisto Toscano.

„ Suffrutex ad summum pedalis altitu-  
„ dinis, adscendens, vel erectus; ramis spar-  
„ sis, teretiusculis, junioribus pubescentibus.  
„ Fol. lanceolata, acuta, plana, pubescentia,  
„ breviter petiolata, utrinque viridia, in-  
„ feriora minora, crebriora, opposita, su-  
„ periora longiora, successive remotiora,  
„ alterna. Stipula utrinque una ad basin  
„ foliorum, lanceolata, seu potius semi-  
„ cordata, acuta, pubescens, folio, non  
„ petiolo, brevior. Interdum inferior ra-  
„ morum pars pulchre adpersa est alter-



„ nis foliorum caespitulis, seu ramulorum  
 „ adhuc evolvendorum propaginibus. Flo-  
 „ res in racemo simplici terminali. Pedun-  
 „ culi in, vel extra foliorum axillas; fru-  
 „ tiferi declinati, calyce longiores; uni-  
 „ flori, nudi. Calyces hirsuti; foliolis ova-  
 „ tis acuminatis, nervosis, duobus exte-  
 „ ribus minoribus. Petala pallide lutea, ca-  
 „ lyce parum longiora. Capsula glaberrima,  
 „ nitida, longitudine calycis, vel paul-  
 „ lulum minor. Pubescentia albida, simplex,  
 „ haud stellata „. Bertolon. loc. cit. Com-  
 „ munis in collibus.

200. *Aconitum Lycoctonum*. L. *A. foliis palmatis, multifidis, villosis*. L. - Gärtn. t. 6. *Acon. lycoctonum luteum*. C. B. P. p. 183. *A. II. Camer. Epit.* p. 827. *A. luteum ponticum*. Lob. ic. 677. *A. luteum majus*. Moris. H. 3; s. 12; t. 2; f. 1. *Aconito strozzalupo*.

Caulis herbaceus subpedalis, simplex, vel parum ramosus. Fol. alterne sparsa, petiolata, rotundata, profunde 3-5 loba, lobis acutis, laciniatis, pubescentibus, atroviridibus. Flores pallide flavi in spicam digesti. Cal. 5-phyllus, fol. superiori concavo, cucullato, obtuso, glabro, rugoso; cœtera pet. pubescentia. Capsula 3. In nemoribus montanis *Prata* et *Boccheggiani*. Floret Julio. Peren.

201. *Thalictrum aquilegifolium*. L. *T. fructibus pendulis, triangularibus, rectis, caule tereti*. W. *Thal. majus, florum sta-*

*minulis purpurascens*. C. B. P. p. 337. *Thal. majus folliculis angulosis*, caule *lævi*. I. B. H. p. 2; pag. 487. Talitro marenmano.

Caulis herbaceus erectus, 2-3 pedalis, cylindricus, cœruleo-purpurascens, pruinosis. Folia 3-4 ternata, foliolis cuneiformibus, obtuse lobatis, glabris, superne glaucis, inferne pallidioribus. Petioli vaginantes, vagina lacera, membranisque stipuliformibus ad petiolorum divisiones. Flores in panicula corymbiformi, densa, Pet. alba vel purpurascens. Sem. triangularia pendula. In Provincia inferiori Senensi, præcipue prope Scansano. Flor. Majo. *Per.*

Varietas  $\beta$  Wild. spec. T. 2; p. 1302. seu *Thalistrum atropurpureum* Jacq. reperitur in Monte Pisano, loco dicto *S. Maria del Giudice*. Differt caule petiolisque atropurpureis, petalis et filamentis violaceis.

202. *Anemone hepatica*. L. *A. foliis trilobis, integerrimis*. L. Fl. Dan. t. 610. *Trifolium hepaticum flore simplici*. C. B. P. p. 330. *Trintas*. Camer. Epit. p. 585. *Hepaticum trifolium*. Lob. ic. 2; p. 34. *Hepatica trifolia*. Moris. H. 2; s. 4; t. 26; f. 1. *Anemone trilobato*.

Scapus nudus, pubescens, 2-3 pollicaris. Involucrum 3-phyllum, raro 4-phyllum, flori proximum, foliis sessilibus, ovatis. Pet. ovato-lanceolata, pallide violacea, externe pallidiora. Stamina pallide lutea: germina viridia. Stigmata flavescen-

tia, glandulosa. Semina nuda. Fol. glabra, saturate viridia, subcoriacea, triloba, lobis subcordatis integris, petiolis, pubescentibus, scapo nudo longioribus. Scapus primum erectus post anthesim incurvus. In Monte-Amiata et in Monte Argentaro Floret Martio. Peren.

203. *Anemone nemorosa*. L. *A. scapo involucrato, uniflora, involucri triphylo petiolato, foliaceo, seminibus ecaudatis, foliolis incisis*. Smith. Brit. — Pl. Dan. t. 549. *Anemone nemorosa flore majore*. C. B. P. p. 176. *Nemorosus ranunculus*. Lob. ic. p. 673. *Ranunculus phragmitis albus et purpureus vernus*. I. B. Hist. 3; p. 2; pag. 412. *Ranunculus Sylvarum*. Moris. H. 2; s. 4; t. 28; f. 10. *Anemone salvatico*.

Fol. radicalia longe petiolata, ternata, foliolis ovato-oblongis acutis, dentatis, plerumque trifidis, fere glabra, saturate viridia in pagina superiori, pallida et pilosa in inferiori. Scapus foliis longior erectus, 1-florus. Pet. oblonga, obtusa, externe, purpurascentia, interne alba. Involucr. a flore distans, triphyllum, petiolatum, foliis conforme. Semina nuda. In nemoribus montosis Floret Aprili. Peren.

204. *Helleborus hyemalis*. L. *H. flore folio insidente, foliis radicalibus peltatis, multifidis, laciniis integerrimis*. W. *Aconitum unifolium bulbosum*. C. B. P. p. 783. *Aconitum hyemale Belgarum*. Lob. ic. 676. *Helleborus niger tuberosus, Ranunculi folio*;

*flore luteo.* Targ. Append. ad Catal. Hort. Flor. p. 142; n. 6. Elleboro invernale.

Fol. omnia radicalia, peltata, petiolis 2-3 pollicaribus, 3-5 lobis, lobis cuneatis, incis, laciniis integerrimis, late viridia, glabra, nitida. Scapus longitudine foliorum, uniflorus, flore involucri, foliis conforme, insidente. Fol. calycis, lanceolata, obtusiuscula, lutea, patentia, staminibus duplo longiora. Pet. longitudine staminum luteo-virescentia, subovata, labio externo majore emarginato. Capsula 5-6. Communis in Agro Florentino. Floret Februario.

*Perennial* *Elleborus* *niger* *L.* *H. scapo*

*sabbifloro, subnudo, foliis pedatis, Enc. Savi Mat. Med. t. 35. Helleborus niger flore roseo. C. B. P. p. 186. Helleborus niger, Lob. id. 681. Veratrum nigrum. Dod. Pempt. p. 381. Targ. Append. ad Cat. H. Florent. p. 142; n. 5. Elleboro nero.*

Fol. radicalia, petiolis 4-5 pollices longis, pedata, lobis ovato-lanceolatis, antice denticulatis, glabris, coriaceis, atro-viridibus, nitidis. Scapi 5-6 pollicares, 1-flori, raro 2-flori, foliolo interdum trifido prope florem. Fol. calycis patentia, lato-ovata, alba, extus rosea, staminibus duplo longiora. Pet. longitudine staminum, pedicellata, obconica, ore irregulari, lacero, pallide viridia. Anthera lutea. Scapi et petioli atrovirides, maculis nigris, vel atropurpureis notati. In nemoribus Apennini

Pistoriensis et Mugellani. Floret Januario.  
Peren.

206. *Helleborus viridis*. L. *H. caule multifloro folioso, foliis digitatis, calycibus patentibus*. — Gærtn. t. 65. Savi Mater. Med. t. 12. *Helleborus niger hortensis flore viridi*. C. B. P. p. 185 *Helleborus niger, adulterinus hortensis*. Fuchs. Hist. p. 274. *Helleborastrum*. Lob. ic. 680. Targion. Append. ad Catal. Hort. Flor. p. 142; n. 3. Elleboro Erba nocca. *Fl. Pis.*

Caulis inferne nudus, simplex vel furcatus. Folia coriacea, pallide viridia: inferiora pedata, superiora, trifida, laciniis antice serratis. Flores solitarii, terminales et axillares, cernui. Fol. calyc. rotundo-ovata, acuta, patentia, pallide viridia. Pet. pedicellata, viridi-lutea, labiata, labiis conniventibus, inæqualibus, externo longiore plicato, fauce lineari, margine inæqualiter crenulato, staminibus breviora. Stamina calyce plusquam dimidio breviora, viridia, antheris pallidis. Capsulæ 3-4. Frequens in montibus. Flor. Januar. Peren.

207. *Helleborus foetidus*. L. *H. caule ramoso, folioso multifloro, staminibus calycem æquantibus*. Enc. — Savi Mat. Med. t. 13. *Helleborus niger foetidus*. C. B. P. p. 185. *Helleboraster maximus*. Lob. ic. 679. Targ. Append. ad Catal. H. Flor. p. 141. n. 1. Elleboro fetido. *Fl. Pis.*

Caulis sesquipedalis crassus, durus, cylindricus, superne angulatus, pubescens. Fol.

pedata, coriacea, atroviridia, nitida, laciniis lanceolatis, serratis, longe petiolata, petioli basi dilatata, amplexicauli. Florescentia corymbosa, bracteis lato ovatis, lanceolatis, superioribus simplicibus inferioribus 3-5 fidis. Flores globosi, primum cernui, fol. calycinis ovatis, truncatis, emarginatis, conniventibus, viridibus, margine superiori externo atro-rubente. Pet. virescentia, subpedicellata, prismatico-subulata, obsolete labiata, ore irregulariter crenulato, staminibus multo breviora. Stamina calyce longiora vel æqualia, antheris pallide luteis. Capsulæ 3-4. Communis in montibus. Floret Februario. *Peren.*

208. *Ajuga Iva*. W. A. foliis linearibus antice dentatis, floribus axillaribus solitariis sessilibus. Schreb. unilab. *Teucrium Iva*. L. *Chamæpitys moschata foliis serratis*. C. B. P. p. 249. Moench. H. 3; s. 2; t. 22; f. 3. *Anthyllis chamæpitys minor*. Lob. obs. p. 208. Ic. 384. *Anthyllis altera*. Clus. H. 2. p. 186. Bugola Iva.

Caules semipedales et pedales, cylindrici, pilosi, ramosi, adscendentes. Fol. lineari-spathulata, obtusa, nonnulla integra, plerumque antice dentata, pilosa, ciliata. Flores axillares, sessiles, solitarii. Cor. rubra, maculis albis, lab. trifido. In aridis prope *Campiliam*. A. D. Carboncini comunicata. *Ann.*

209. *Tenerium fruticans*. L. I. foliis lanceolatis integerrimis, subtus niveis, flo-

*ribus solitariis*. Schreb. unilab. *T. peregrinum folio sinuoso*. C. B. P. p. 247. *T. fruticans baticum*. Clus. H. 1; p. 348. Dalech. H. p. 1166. L. B. Hist. 3; p. 291. Dill. Elth. t. 284. *T. casio et amplo roris marini flore*. Barrel. ic. 512. *Teucrio fruticoso*.

Frutex sempervirens, 4-6 pedalis, ramis tenuibus candido tomento testis, Fol. subpetiolata, lanceolato-acuta vel ovato-lanceolata, quandoque undulata, superne saturate-viridia, nitida, inferne tomentosa, candida. Flor. solitarii, pedunculati, ramis terminales, axillares, approximati, spicam mentientes, labio pollicari et longiore, 5-fido, pallide violaceo, lineis saturatioribus picto. Cal. magnus, campanulatus, interne glaber et viridis, externe tomentosus candidus. In rupibus maritimis prope *Portum Talamonis*; et in proximo Promontorio, vulgo il *Monte Argentaro*. Flor. Majo.

210. *Teucrium Scorodonia*. L. *T. foliis cordatis subpubescentibus, dentatis, petiolatis, racemis terminalibus et axillaribus secundis, caule erecto, herbaceo*. W. Fl. Dan. t. 485. *Scordium alterum seu Salvia sylvestris*. C. B. P. p. 247. *Scordium alterum Plinii*. Lob. Obs. p. 262. *Salvia agrestis seu sphacelus*. Dod. Pempt. p. 289. *Chamadrys elatior, Salvia folio &c.* Moris. H. 3; s. 2; t. 20; f. 15. *Teucrio Scorodonia*.

Caules herbacei, bipedales, erecti, ramosi. Fol. petiolata, cordata, oblonga, rugosa, obtuse dentata. Flores unilaterales,

in racemis lateralibus et terminalibus erectis. Cal. 2-labiatus: lab. super. ovato, integro, inferiore 4-dentato. Corollæ pallide flavescentes, tubo calyce multo longiore, subrubicundo, antheris rubris. Tota planta leviter pubescens. In Sylvis montanis. Flor. Jul. Per.

212. *Teucrium montanum*. L. *T. corymbis terminalibus glabris, foliis petiolatis ellipticis, margine revolutis, subtus tomentosus, caule procumbente*. Schreb, unilab. *Teucrio montano*.

Var. *a* *foliis linearibus angustissimis integerrimis*. Schreb. *T. supinum*. L. *Polium montanum repens* C. B. P. p. 220. *Polium montanum supinum minimum*. Lob. Adv. p. 259; ic. 488. *Polium montanum* VIII. Clus. Hist. p. 363. *Polium IV. etiam repens*. Dod. Pempt. p. 283. *Polium montanum supinum, flore albo*. Moris. H. 3; a. 2; t. 2; f. 2.

Var. *β* *foliis lanceolatis angustioribus integerrimis*. Schreb. *T. montanum*. Lin. *Polium Lavendulæ folio angustiore*. C. B. P. p. 220. *Polium VII. cum semine*. Clus. Hist. p. 363.

Caules lignosi, diffusi, ramosissimi vix pubescentes, 6-8 pollices longi. Fol. subsessilia, lanceolata, superne glabra et pallide viridia, inferne tomentosa alba. Corymbi densi, interfoliati, terminales. Corol. albæ. Calyces glabri. Floret Junio et Julio. *Peren*.

In var. *a* folia confertiora, et angustiora



sima sunt, et marginibus valde revolutis: In var.  $\beta$  folia rariora, ampliora, marginibusque minus revolutis. In hoc totum est harumce varietatum discrimen. Wildenowius tribuit *T. montano* L. calyces dentibus mucicis, dentibus mucronatis *T. supino*. Ego in utroque mucronatos invenio; tantum mucrones in *T. supino* longiores sunt. Refert autem synonymum: *Polium montanum* VIII. Clus. H. p. 363. ad varietatem *T. montani*. L. Verum hoc synonymum inseparabile est ab illo C. Bauhini scilicet *Polium montanum repens*, ideoque *T. supino* uniri debet, ut Clusii figura aperte ostendit. Dux hae varietates in montibus aridis reperiuntur. Ego prope Florentinam Carthusiam, prope *Balnea S. Philippi* et in scopulis maritimis apud Portum vulgo *Cala di Forno* inveni; Carboncinus autem prope *Campiliam* eas invenisse mihi dixit.

213. *Scutellaria galericulata*. L. *S. foliis cordato-lanceolatis, crenatis rugosis, floribus axillaribus*. L. Smith. Brit. Fl. Dan. t. 637. *Lysimachia caerulea galericulata, seu Gratiola caerulea*. C. B. P. p. 246. *Lysimachia galericulata*. Lob. ic. 344. Obs. p. 186. Dalech. Hist. p. 1060. *Tertianaria aliis Lysimachia galericulata*. I. B. Hist. 3; p. 435. *Scutellaria palustre*.

Caules adscendentes, ramosi, circiter pedales, argute tetragoni. Fol. breviter petiolata, cordata, lanceolata, obtuse crenata, rugosa. Flores axillares solitarii, oppo-

siti, secundi, pedicellati, bracteis 2. setaceis sub calyce. Corol. hypocrateriformis ringens, glandulis adpersa globoso-diaphanis pedicellatis: galea cœrulea, barba alba cœruleo punctata, tubo basi luteo. Tota planta saturate viridis et pubescens. In udibus Sylvæ Pisanæ, et secus Incile Paludis Blentinæ, vulgo la Serezza. Floret Junio et Julio. Peren.

214. *Prasium majus*. L. *P. foliis ovato-oblongis serratis*. Lin. Gærtner T. 66. *Melissa fruticosa cretica sempervirens, teucrii facie, flore albo*. Moris. H. 3; s. 2; t. 21. f. 3. *Teucrium fruticans amplo et albo flore italicum*. Barrel. ic. 895. *Prasio maggiore*.

Frutex sempervirens. Fol. petiolata, ovato-lanceolata, cordata, serrata, pallide viridia, glabra, nitida, juniora subtus pubescentia. Flores axillares, solitarii in summitate ramorum. Cal. campanulatus, labiatus, lab. super. 3-fido, infer. profunde 2 fido. Cor. alba, labio superiore erecto, emarginato: lab. infer. latiore, deflexo, 3-fido, lacinia media majore. Sem. 4. baccata in fundo calycis. In rupibus maritimis, prope Portum Talamonis. Floret Jan.

215. *Melampyrum cristatum*. L. *M. spicis quadrangularibus, bracteis cordatis, imbricatis, compactis, denticulatis*. Smith. Brit. Fl. Dan. t. 1104. *Melampyrum luteum angustifolium*. C. B. P. p. 234. *M. cristatum flore albo et purpureo*. I. B. H. 3.

p. 2. pag. 440. Moris. Hist. 3; s. 11; t. 23  
f. 2. *M. angustifolium cristatum*. Pluk.  
phyt. t. 99; f. 2. *Fiammanera crestata*.

Caulis herbaceus, erectus, subpedalis,  
4-gonus, rubellus, ramis patentibus, caulo  
sæpe altioribus. Fol. opposita, sessilia, li-  
nearia, vel lineari-lanceolata, acuta, inte-  
gra, scabra. Spicæ terminales, breves, cras-  
sæ, 4-gonæ, lateribus concavæ. Bractææ  
confertim imbricatæ, cordatæ, compressæ,  
curvæ, pectinato-dentatæ, inferiores apice  
foliaceo, pallide virides, vel lutescentes.  
Corollæ albæ, galea violacea, barba flava.  
In ericetis Mugellanis, uti in loco dicto  
S. Donnino, prope vicum S. Laurentii. Flo-  
ret Julio. Ann.

216. *Rhinanthus viscosa*. Enc. R. fo-  
liis serratis, superioribus alternis, floribus  
lateralibus distantibus, calyce tubuloso, la-  
bii inferioris laciniis subæqualibus. Nob.  
*Bartsia viscosa*. L. Smith. Brit. Lightf. Fl.  
Scot. p. 321; t. 14. *Rhinanthus maxima*.  
Desfont. Fl. Atl. *Alefforolophos italica luteo-*  
*pallida*. Barrel. ic. 665. Rinanto vischioso.

Caules erecti, plerumque simplices, sub-  
cylindrici, pedales et sesquipedales. Fol. ses-  
silia, lanceolata, vel ovato-lanceolata, cor-  
data, obtusa, grosse serrata, nervosa, ru-  
gosa: infer. opposita, super. alterna. Flor.  
laxe spicati: bractææ fol. conformes, flori-  
bus paulo longiores. Cal. tubulosus, semi-  
quadrifidus, laciniis lineari-lanceolatis, acu-  
tis, longitudinaliter nervosis. Cor. lutea:

lab. superius integrum, inferiore paulo brevius: lab. inferius 3-lobum, lobis rotundatis, subæqualibus. Antheræ 2-lobæ, pilosæ, luteæ: Stigma virescens, capitatum, subbilobum. Caps. oblonga, acuta. Tota planta luteo-virescens, pilis brevibus mollibus, glandulisque pedicellatis adpersa ex quibus humor viscidus exsudet. Communis in Pratis humidis, et secus fossas in Agro Pisano. Floret Majo et Junio. *Ann.*

217. *Rhinanthus versicolor*. W. *R. fol. serratis, superioribus alternis, floribus dense spicatis, calyce ovato, labii inferioris lacinia intermedia angustiore*. Nob. *R. versicolor*. Desf. *Fl. Atl. R. versicolor* ꝥ *Enc. Alefforolophos italica, versicolor, spicata*. Barrel. ic. 666. Rinanto variegato.

Caules sesquipedales, simplices vel ramosi, rufescentes, 4-goni, angulis rotundatis. Fol. approximata: inferiora fere semper opposita, superiora alterna, sessilia lanceolata, angustiora quam in præcedenti, grosse serrata, dentibus profundioribus, nervosa, rugosa. Flores dense spicati, spicis 4-gonis. Bractæ inferiores foliis conformes, sed latiores, mediæ ovato-cordatæ, acutæ, dentatæ, superiores integræ, flore breviores. Cal. ovato-compressus, profunde 2-fidus, segmentis emarginatis. Cor. labium super. inferiore brevius, cymbiforme, integrum, luteum, carina et margine rubro-violaceo. Lab. infer. luteum, 3-lobum, lobis obtusis, medio angustiore. Antheræ 2-lobæ,

subviolaceæ, stigma luteum, capitatum, subbilobum. Caps. ovato-compressa, acuta, 2-locularis, polysperma. Planta plumbeo-viridis, pilis adpressis testâ; florescentia vero piloso glandulosa. A. D. Carmignani in argillosis prope Stagno, loco dicto *Mortajolo* inventa. Flor. Majo et Jun. Ann.

Desfontainesius loc. cit. huic speciei rubram corollam tribuit, fierique potest ut et talis varietas quandoque occurrat. Quod autem calyci quinque dentes tribuat, errori typographi adscribo.

218. *Vitex* Agnus Castus. L. V. foliis digitatis, septenatis, quinatove, lanceolatis integerrimis, spicis verticillatis, paniculatis. Vulf. Ap. Jacq. Collect. 3; p. 64. Gært. t. 36. V. foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis. C. B. P. p. 475. Eleagnon Teophrasti: *Vitex* Agnus Castus officinarum. Lob. ic. 2; p. 138. Advers. p. 469. Mattiol. p. 212. Vitice Agno Casto.

Frutex ramis cylindricis, cortice lævi, fusco, pubescente. Fol. decidua, opposita, petiolata, digitata, foliol. 5-7 angustis, lanceolato-acutis integris, vel leviter sinuatis, superne saturate viridia, glandulis punctiformibus minimis, impressis, inferne albida, pubescentia. Spicæ cylindrico-4-gonæ, interruptæ, ex fasciculis florum verticillatim dispositis, ramosis, pedunculatis, bracteatis. Cal. 1-phyllus, brevis, campanulatus, 5-dentatus, tomentosus, albicans. Cor. 1-petala irregularis, tubo calyce longiore,

limbo patente, obsolete labiato, 5-fido, laciniis inæqualibus, plerumque violacea, quandoque rubella vel alba. Stamina exserta. Styl. 2-fidus. Bacca globosa, calyce circumdata, 4-locularis, 4-sperma. Prope *Portum Herculis* reperiit: Carboncinus autem prope *Turrim S. Vincentii*. Flor. Julio.

219. *Myagrum rugosum*. L. *M. siliculis articulatis, sulcatis, pilosis, rugosis, foliis oblongis, obtusis*. L. Roth. Fl. Germ. *Rapistrum rugosum*. Allion. Fl. Pedem. t. 78. Miagro scabro.

Caulis subpedalis, ramosus, ramis patentibus, inferne pilosus et scaber, superne glaber. Fol. radicalia subpilosa, scabra, magna, petiolata, lyrata, lobo terminali maximo obtuso, dentato; caulina minora: superiora lanceolato-dentata, in petiolum angustata, glabra. Spicæ longæ tenues, flores flavi, breviter pedicellati. Silicula articulata, loculis 2-3, superiori tantum fertili globoso, tuberculato, stylo persistente. Frequens in agris. Junio et Julio floret. Ann.

220. *Thlaspi alliaceum*. L. *T. siliculis subovatis ventricosis, foliis oblongis, obtusis, dentatis, glabris*. L. *Scorodonthlaspi Ulyssis aldrovandi*. I. B. Hist. 2; p. 932. *Thlaspi allium redolens*. Moris H. 2; s. 3; t. 18; f. 28. Tlaspi puzzolente.

Caulis 2-3 pedalis, ramosus, diffusus. Fol. sessilia, oblonga, obtusa, leviter sinuata, dentata, auriculata, auriculis amplexi-

caulibus; inferiora spathulato-hyrata. Pet. alba, vix emarginata, calice paulo longiora. Siliculæ turbinatæ, leviter emarginatæ, ventricosæ, basi gibbæ. Planta glabra luteo-viridis, allium redolens. In Agro Pisano, sed non frequens. Floret Aprili. *Ann.*

221. *Turritis glabra*. L. *T. foliis radicalibus dentatis, hispidis, caulinis integerimis, amplexicaulibus*. L. Smith. Fl. Brit. Fl. Dan. t. 809. Gaertn. t. 143. *Brassica Sylvestris foliis circa radicem cichoraceis*. C. B. P. p. 122. *Sinapi album*. Dalech. Hist. p. 1168. *Turritide glabra*.

Fol. radicalia petiolata, lanceolata, leviter sinuata, dentata, piloso-scabra. Caulis teres, glaber 2-4 pedes altus, simplex. Fol. caulina approximata, sessilia, amplexicaulia, sagittata, integra, glabra. Flores albi, primum in corymbum, dein in spicam longissimam, strictam dispositi. Cal. connivens. Pet. primum erecta, demum patula. Siliquæ pedunculatæ, erectæ, adpressæ, glabræ, striatæ, lineares, compressæ. Planta pallide viridis. In Sylva Pisana. Floret Junio. *Ann.*

222. *Fumaria officinalis*. Lin. *F. siliulis globosis, monospermis, laciniis foliorum latiusculis, subspathulatis, calycibus denticulatis*. Enc. Fl. Dan. t. 940. Savi Mater. Medic. t. 1. *Fumaria officinarum* et *Dioscoridis*. C. B. P. p. 143. *Fumaria officinarum foliis glaucis, floribus in spica longiuscula recta, dispositis, rubris, rictu atropureo; et Fumaria foliis majoribus vi-*

*ridibus, et in oblongos lobos divisus, floribus in spica recta digestis, rubris, inferna parte candicantibus, rictu saturatius purpureo.* Mich. Cat. H. Flor. p. 39. n. 2, 3. Fumosterno rosso. *Fl. Pis.*

Planta viridi-glaucā, tenera, glabra, caule pedali, anguloso, ramoso, diffuso. Fol. sparsa petiolata, bipinnata; foliolis ovato-cuneiformibus obtusis, 2-3 fidis. Spicæ pedunculatæ, laterales et terminales, solitariae, oppositifoliae, folio longiores: flores breviter pedunculati, suberecti, vel horizontales: Pet. purpurea, apice atro-rubra; foliola calycina denticulata: bractæ minutæ, angustæ, lanceolatæ. Siliculæ globosæ monospermæ. *Ann.*

223. *Fumaria capreolata*. L. *F. siliculis globosis monospermis, foliis scandentibus subcirrhosis, laciniatis, acutis, calycibus denticulatis.* Nob. Savi Mat. Med. t. 1. *Fumaria viticulis et capreolis plantis vicinis adharens.* C. B. P. p. 143. *Fumaria altera caulibus longioribus, flore candicante.* Cæsalp. pag. 172. Fumosterno bianco. *Fl. Pis.*

Caulis 2-4 pedalis, angulosus, glaber, ramosus, diffusus, scandens. Petioli cirrhorum more se convolventes et contorti. Fol. 2 pinnata, foliolis acute incisis. Spicæ plerumque fol. opposito breviores. Flores reflexi, albi, apice atropurpurei. Calyces denticulati. Baccæ globosæ monospermæ. Cum præcedenti in arvis, secus vias, in muris &c. Flor. Martio, Aprili, et Majo. *Ann.*



224. *Spartium spinosum*. L. *S. foliis ternatis, obovatis, pedunculis axillaribus, calycibus leguminibusque glabris, ramis angulatis spinosis*. W. Bertol. Pl. rar. Gen. *Cytisus spinosus*. Enc. Due Centur. *Acacia trifolia*. C. B. P. p. 392. *Acacia altera*. Camer. Epit. p. 104; f. 1. 2. Lob. ic. 2; p. 95. *Cytisus spinosus*. Mich. Cat. H. Pis. p. 52. Sparzio spinoso.

Frutex 4-5 pedalis, ramis intricatis, validis, striatis, apice spinosis. Fol. extipulata, petiolata, ternata, foliolis obovatis, inferiori pagina pubescentibus. Flores solitarii, vel 3-4 aggregati, axillares basi spinarum juniorum, lutei, majusculi, calycibus glabris. Legumen pollicare vel sesquipollicare, glabrum, compressum, acuminatum, dorso marginato, canaliculatum, sutura altera marginibus angustioribus. In monte Pisano loco dicto *S. Giovanni alla Vena*.

225. *Spartium villosum*. W. *S. foliis ternatis, oblongo-obovatis, pedunculis axillaribus, calycibus leguminibusque villosis, ramis angulatis, spinosis*. W. *Cytisus spinosus italicus, incanus, siliquis villosissimis, quatuor alis munitis*. Michel. Cat. H. Pis. p. 52. Sparzio peloso.

Simile præcedenti, a quo differt, foliis paullo majoribus, ramis junioribus tomentosis, calycibus leguminibusque villosis. In collibus maritimis Etruriæ, uti a *Cala di Forno*, in *Monte Argentaro* &c.

226. *Spartium radiatum*. L. S. *foliis ternatis linearibus, petiolis dilatatis persistentibus, racemis capitatis terminalibus, ramis angulatis, oppositis, confertis*. W. *Genista radiata*. Enc. Due Cent. *Spartium triphyllum*. C. B. P. p. 396 *Genista radiata seu stellaris* I. B. Hist. p. 1. pag. 399. *Spartium æquicolorum mininum montanum triphyllum*. Column. Ecphr. 1. p. 294. *Genista spartium italicum, non spinosum, junceum, et triphyllum, foliis et ramis conjugatis, floribus luteis in capitulum congestis siliquis brevioribus hirsutis*. Targ. in Append. ad Catal. H. Flor. p. 137. Spazio stellato.

Frutex bipedalis, cæspitosus, ramis oppositis, striatis. Fol. extipulata, opposita, ternata, petiolis brevibus dilatatis, persistentibus, demum gibbosis, callosis. Foliola linearia. Flores aggregati 5-6 in apice ramorum, lutei, calycibus tomentosis, bractea calycinali, ovato-acuta, breviori. Legumina semipollicaria, arcuata, molliter villosa. In Apennino. Flor. Julio.

227. *Genista sagittalis*. L. G. *caulibus membranaceo-alatis, articulatis, subsimplicibus, foliis ovato-lanceolatis, spica terminali* Enc. *Chamaegenista sagittalis*. C. B. P. p. 395. *Genistella montana*. Lob. ic. 2; p. 92. *Genistella herbacea, seu Chamaespartium*. Jo. B. Hist. p. 2; pag. 393. *Chamaespartium supinum, caule folioso hispanicum*. Barrel. ic. 570. Ginestra alata. Due Centur.

Caules pedales, basi decumbentes, caespitiosi, membranaceo-alati; alis articulatis, foliolo simplici lanceolato, integro quovis articulo. Flores pallide lutei, in spicis terminalibus dispositi. Cal. labiatus 5-fidus, basi bracteolis 2 linearibus instructus. Legumen compressum, pollicare, 4-spermum. Tota planta pilosa. In collibus Senensis inferioris Provinciae et nominatim prope oppida *GiUSDINO*, *Castelletto*, *Montieri &c.* Floret Majo. Peren.

228. *Genista januensis*. Bertol. *G. ramis argute triquetris, foliis simplicibus lanceolatis, margine cartilagineis, rameis inferioribus obtusis, leguminibus nudis*. Bertol. Pl. rar. Gen. *G. scariosa*. Viviani Annal. Bot. t. 2; p. 175. *Genista florentina frutescens, tota glabra, viminibus angulosis et plerumque triangularibus, foliis partim acutis, partim retusis, floribus luteis, siliquis glabris*. Mich. Cat. H. Flor. p. 40. et in Append. p. 137. ubi Targionius addit. *Folia margine seu fimbria quadam diaphana ornantur. Ginestra cartilaginosa.*

Caules fruticosi, erectiusculi, contorti, angulati, ramis argute triquetris. Fol. simplicia, alterna, subsessilia, glabra, margine cartilaginea, lanceolata, acuta: ramea inferiora breviora, obtusa, crebriora, stipula utrinque una minima, setacea, ad basim foliorum. Flores solitarii, axillares, lutei. Pedunculi breves rubelli, bracteis 2. setaceis, apice instructi. Cal. 3-fidus, la-

ciniis 2, superioribus divergentibus, inferiori 3-dentata. Carina basi 2-partita. Legumina subfalcata, nuda, polysperma. Tota planta glabra. Bertol. loc. cit. In monte Pisano, et in Florentinis collibus. Floret Majo.

229. *Ononis ornithopodioides*. Lin. *O. pedunculis subbifloris aristatis, folio brevioribus, foliolis ternatis obovatis, antice dentatis, leguminibus cernuis linearibus compresso-nodosis*. Nob. *Bulimacola nodosa*.

Caules ramosi, diffusi, 3-10 pollices alti. Fol. prima radicalia simplicia rotundata, reliqua ternata, petiolata, petiolis tenuibus, canaliculatis, foliolis cuneiformibus vel obovatis, antice acute dentatis. Pedunculi axillares folio breviores, 1-2 flori, aristati. Cal. laciniis filiformibus. Corol. calyci æqualis, pallide flava. Legumina cernua, linearia, compressa, nodosa. Planta luteo-virens, tecta pilis tenuibus molli-  
bus, patentibus, apice glandula globosa diaphana instructis. A. D. Carboncini prope *Campiliam*, loco dicto il *Ciavaro* reperta. Floret Majo. Ann.

230. *Lathyrus annuus*. L. *L. pedunculis bifloris, cirrhis diphyllis, foliolis ensiformibus, leguminibus glabris, stipulis bipartitis*. Lin. *Lathyrus hispanicus*. Riv. tetr. irreg. t. 58. *Cicerchia annua*.

Caules 4-5 pedales, debiles, parum ramosi, alati. Fol. binata, petiolo alato, foliolis angustis lanceolato-acutis nervosis, cir-

rho ramoso. Stipulæ 2-partitæ, laciniis lineari-acuminatis, divergentibus, superiori majore. Pedunculi axillares, folio breviores, 1-3 flori. Corollæ pallide luteæ; vexillo obtuso emarginato, striis saturatioribus picto, carina virescente. Cal. angulatus. Pedicellus floris superioris breviter aristatus. Legumen compressum, dorso plano. Planta glabra, pallide viridis. Communis inter segetes. Floret Majo. Ann.

231. *Lathyrus tuberosus*. Lin. *L. pedunculis multifloris cirrhis diphyllis, foliolis ovalibus, internodiis nudis*. L. *Lathyrus arvensis, repens, tuberosus* C. B. P. p. 344. *Apios*. Fuchs. Hist. 131. *Apios falso*. Mattioli. p. 1337. *Arachyda Teophrasti* Column. Ecphr. p. 304; t. 301. *Lathyrus arvensis* Riv. tetr. irreg. t. 42. *Cicerchia tuberosa*.

Caules 2-3 pedales, debiles, angulosi. Folia binata, foliolis ovato-obtusis, petiolo anguste alato, cirrho ramoso. Stipulæ lanceolato-acutæ, semisagittatæ, patentes. Pedunculi foliis multo longiores, floribus 3-5 pulchre roseis, carina pallidior, vexillo obtuso, emarginato. Legumina subincurva, torulosa, glabra, seminibus 3-4 globosis, fuscis. Radix repens fibrosa, tuberosa. Tuberæ obovata, cortice fusco, pulpa alba farinacea, insipida. In argillosis Provinciæ inferioris Senensis, circa Monte Labbro, et in arenosis secus flumen Arno prope Pisas, reperiit D. Carmignani. Flor. Julio. Peren.

232. *Lathyrus palustris*. Lin. *L. pedunculis multifloris*, *cirrhis polyphyllis*, *foliolis lineari-lanceolatis acutis*, *stipulis semisagittatis lanceolatis*, *internodiis membranaceis*. W. Roth. Germ. Smith. Brit. Fl. Dan. t. 399. *Lathyrus viciaformis*, seu *vicia lathyroides nostras*. Pluk. phyt. t. 71. f. 2. Cicerchia palustre.

Caulis 2-4 pedales, debiles, ancipites, alati. Fol. 4-juga, foliol. lanceolato-obtusis, apice mucrone parvo foliaceo, subalternis, superne glabris, inferne pubescentibus, petiolo communi alato, in cirrhum ramosum terminato. Stipulae semisagittatae, angustae; acuminatae, interdum basi dentatae. Pedunculi suboctoflori, foliis subaequales. Bractea minima solitaria, setacea, ad basim pedicellorum. Vexillum rubro-violaceum, emarginatum, marginibus inflexis: Alae et carina albae. Legumina subfalcata, compressa, glabra, sesquipollicaria, seminibus 4-6. In humidis Sylvae Pisanae, non frequens. Floret Majo. Peren.

233. *Vicia lathyroides*. L. *V. leguminibus sessilibus solitariis glabris*, *foliis subtriugis*, *inferioribus retusis*, *stipulis integris*, *seminibus tuberculatis*. Smith. Brit. Fl. Dan. t. 58. *Vicia minima*. Riv. tetrap. irreg. t. 56. *Ervum soloniense*. Lamarck. Illustr. Planch. t. 624; f. 2. Veccia cicerchia.

Caulis 4-pollicaris, aut semipedalis, inferne ramosus, ramis divaricatis. Folia 2-3

juga. Foliola in inferioribus foliis obcordata, in superioribus lanceolata, non raro emarginata, mucronulata. Cirrhi vel desunt, vel brevissimi et simplices. Stipulae semisagittatae, integrae, immacolatae. Flores solitarii, rubro-cœrulei, subsessiles. Legumina erecta, glabra. Semina tuberculata. In Monte Pisano. Floret Majo. *Anu.*

234. *Lotus angustissimus*. Lin. *L. leguminibus subbinatis, linearibus, strictis, erectis, caule erecto, pedunculis alternis*. Lin. *Lotus corniculata, siliquis singularibus seu binis, tenuis*. I. B. Hist. 2; p. 356. *Mullaghera sottile*.

Caules basi ramosi, adscendentes, tenues, 6-8 pollices longi. Fol. petiolata, foliolis lanceolato-acutis, lateralibus lobo externo ampliore: Stipulae conformes, subaequales. Pedunculi axillares, alterni, 1-2 flori, folio extipulato ad basim calycis instructi. Flores lutei, alis vexilloque pallidioribus. Dentes calycini lineari-acuminati. Legumina tenuia erecta, leviter nodosa, pollicaria et sesquipollicaria. Tota planta dense pubescens. In aridis prope Campiliam loco dicto *Monte-Calvino*, a D. Carboncinio lecta. Floret Junio. *Ann.*

235. *Hypericum quadrangulare*. Lin. *H. floribus trigynis caule quadrangulo herbaceo, foliis pellucidis punctatis, foliolis calycinis lanceolatis*. Smith. Fl. Brit. Fl. Dan. t. 640. *Ascyron* Dod. Pempt. p. 78. Matt. 987. *Iperico quadrangolare*. *Due Cent.*

Caules erecto-ramosi, 2-3 pedales. 4-anguli, angulis arcte alatis. Folia opposita, decussata, ovato-obtusa, nervosa, glabra, punctis pellucidis impressis, glandulisque globosis, nigris, minimis in superficie inferiori, præcipue in margine. Flores dense paniculati, pedicellis brevibus, bracteisque linearilanceolatis, acutis. Petala fulva, obliqua, angusta, acuta. Glandulæ nigræ in margine petalorum, et in antheris. Communis in collibus. Floret Junio. *Peren.*

236. *Hieracium tuberosum*. N. H. radice tuberosa, scapo nudo 1-floro, basi stolonifero, calyce hirto, foliis ovato-lanceolatis dentatis glabris. Nob. *Leontodon bulbosum*. Lin. - Enc. - Desfont. Atlant. - *Hieracium bulbosum*. W. *Praenanthès bulbosa*. Decand. Fl. Franc. *Chondrilla bulbosa*. C. B. P. p. 130. Moris. H. 3; s. 7; t. 6; f. 9. *Chondrilla pusilla marina lutea bulbosa* Lob. Adv. p. 83; Ic. 230. *Cichorium bulbosum Dalechampii*. Dalech. Hist. p. 1392. *Chondrilla altera Dioscoridis putata*. Clus. Hist. 2; p. 145. Column. Phytobas. p. 14. f. 19. optima. *Cichorium bulbosum*. I. B. Hist. 2; p. 1038. *Jeracio bulboso*.

Radix tuberosa, tuberibus subovatis, carnis, albidis. Stolones repentæ foliosi. Scapus erectus 4-16 poll. longus, 1-florus, atropubens, glaber, quandoque versus apicem pilosus; nudus vel 2-3 squamulis triangulari-auriculatis instructus. Flos luteus erectus, semiflosculis plurimis; squamis caly-



cinis atro-viridibus, margine scarioso albidō, externis adpressis ovato-acuminatis, omnibus basi pilosis, pilis nigris rigidiusculis, Pappus sessilis simplicissimus, candidus. Fol. in petiolum decurrentia, ovato-lanceolata, leviter sinuata, subdentata, glabra, glauca, non raro pagina inferiori purpurascentia. In arenosis prope mare, et in Monte Pisano. Floret Vere. *Peren.*

Minus recte haec species generi *Leontodon* Lin. adscribitur, cum pappum habeat sessilem. Nec inter *Leontodontia* Juss. recenseri potest, quia pappum habet simplicem, non plumosum, quidquid Willdenowius dicat, istoque caractere differt ab *Hieraciis* quorum pappus pilosus est, aut dentatus. Demum et a *Praenanthibus* differt, quia multis semisflosculis instruitur. Ut minus errare videar eam in genere *Hieracium* relinquo, in quo et a Willdenowio locata fuerat, quaedam enim species sunt in prima sectione hujus generis, *Scapo nudo unifloro*, quibus similis est. Cum autem radices non bulbosas sed reapse tuberosas habeat, ejus triviale nomen *bulbosum* in *tuberosum* mutavi.

237. *Crepis pulchra*. L. *C. foliis radicalibus runcinatis, caulinis ovato-lanceolatis, basi sagittatis, panicula corymbosa, divaricata, nuda.* - *Praenanthesis hieracifolia*. W. *Chondrilla pulchra*. Decand. Fl. Franc. *Hieracium pulchrum*. J. B. Hist. 2. p. 1025. Moris. H. 3; p. 65; s. 7; t. 5; f.

13. inter *Hieracia* seminibus longioribus, perennia. *Hieracium montanum* alterum *leptomacrocaulon*. Column. Ecphr. 1; p. 248; t. 249. Moris. H. 3; p. 68; s. 7; t. 5; f. 37. inter *Hieracia* annua seminibus brevioribus praedita. — *Crepide glutinosa*.

Caulis 2-5 pedalis sulcatus, erectus, angulosus, superne ramosus, ramulis tenuibus patentibus, squamula triangulari amplexante ad ramulorum divisiones. Folia radicalia runcinato-lyrata, caulina ovato-lanceolata, sinuata, amplexicaulia, auriculata, sensim adscendendo angustiora et acutiora. Florescentia paniculato-corymbosa. Calyx glaber, ante anthesim cylindricus, dein conicus, sulcatus; calyculo exteriori squamis brevissimis ovato-acuminatis adpressis. Semiflosculi multi, lutei. Antherae et stigmata brunnea. Fol. et caulis ad basim, pilis glandulosis humorem viscidum exsudentibus, teguntur, In Agro Pisano prope fimeta. Floret Majo et Junio. *Ann.*

Et hæc planta cui generi adscribenda sit non bene liquet. Sane si cum *Crepidibus* pappo sessili et calyce sulcato convenit, ab iis differt calyce externo interno calyci adpresso. Si externis calycinis squamis similis est *Prænanthibus*, dissimilis est et calyce conico, et nimio semiflosculorum numero. Cum melius non possem, inter *Crepides* relinquo, ad Linnei imitationem, eoque magis quod nulli generi similior sit.

Plantam a Columna descriptam ceu va-

rietatem non consideravi uti Linneus, Reichard, et Willdenowius, quia nullum varietatis characterem reperio. In figura Columnae desunt prima folia radicalia, idque ex eo factum esse puto quod planta delineata sit quando ea jam aruerant, quod evenire solet antequam planta floreat, praesertim si in locis nimis apricis nata sit. Morisonius figuras et descriptiones Johannis Bauhini, et Columnae accepit, sed in gravem errorem incidit dum eas uti diversas species consideravit.

Krokerius in Flora Silesiaca pro descriptione et figura *Crepidis pulchrae*, exhibet figuram et descriptionem *Crepidis virentis*.

238. *Crepis* Dioscoridis. L. C. foliis radicalibus lyrato-runcinatis, caulinis hastatis lanceolatis: inferioribus dentatis, caule erecto, ramis divaricatis; calycibus tomentosis, fructiferis subrotundo ovatis glandulosis. W. Poll. Palat. Crepide maremmana.

Caulis pedalis et bipedalis, cylindricus, sulcatus, glaber, ramosus, ramis divaricatis. Fol. radicalia, lyrato-runcinata, dentata, glabra: caulina conformia, lobis acutioribus, amplexicaulibus auriculatis, auriculis acutis, valde dentatis: ramea linearia auriculis acuminatis. Florescentia paniculato-corymbosa, ramis nudis 1-floris. Calyx primum cylindricus, squamis tomentosis albis, apice nigrescentibus, dorso muricatis. Squamae calycis exterioris laxae,

filiformes, una alterave pedunculo inserta sub flore, ut in *Tolpide*. Flores lutei, ligulis externe rufescentibus. Cal. post anthesim conicus, basi globosus, sulcatus. Pappus sessilis, simplex, candidus. In Provincia inferiori Senensi, *Paganicum* inter et *Batignanum*. Floret Majo et Jun. Ann.

239. *Crepis leontodontoides*. All. *Cr. glabra, foliis runcinatis, dentatis, caule subnudo, calycibus cylindricis non reflexis*. Allion. Auct. p. 13. *Barkausia leontodon*. Decand. Fl. Franc. *Crepide muraria*.

Caulis herbaceus, fragilis, cylindricus, leviter angulatus, pedalis et bipedalis. Fol. radicalia runcinato-lyrata, dentata; caulina linearia acuminata. Flores pallide lutei. Calyces fere glabri, ante anthesim cylindrici, squamis externis ovato-lanceolatis acutis, internis duplo brevioribus, adpressis. Calyces fructiferi conici, sulcati. Semina tenuia, longitudinaliter striata, apice in stipitem elongata, pappum simplicem candidum sustinentem. Planta glabra, saturate viridis, nitida. Abundat in Monte Pisano, et in mœnibus Pisarum, inter Portam, quae *Nova* dicitur et *Arnum*. Floret Aprili. *Biennis*.

240. *Crepis setosa*. *C. setoso-hispida, setis rigidiusculis patentibus, foliis radicalibus lyrato-runcinatis, caulinis semiamplexicaulibus, sagittatis; basi pinnatifidis, calycibus exterioribus laxis*. Nob. *C. setosa*. Haller fil. in Roem. Archiv. I; St. 2; p. 1.

**Barkausia setosa.** Decand. Fl. Franc. Crepide setolosa.

Caulis pedalis vel bipedalis, ramosus, ramis patentibus. Fol. radicalia et caulina inferiosa lyrato-runcinata, lobis angustis dentatis. Superiora sessilia, semiamplexicaulia, sagittata, basi profunde pinnatifida, laciniis acutis. Flores flavi. Calyces conici, sulcati; squamis externis linearibus laxis. Semina tenuia, longitudinaliter sulcata, muricata, apice in stipitem elongata. Pappus candidus, filamentis oculo armato, denticulatis. Tota planta adspersa setis rigidis lutescentibus, in carina squamarum calycis densius dispositis. Frequens in agris, per totam Etruriam. Floret æstate. *Bien*

241. *Tolpis barbata*. W. T. *floribus lateralibus altioribus, involucris setaceis calyce longioribus, pappo biseto*. Nob. *Crepis barbata*. L. *Swertia barbata*. Allion. *Pedem.*—*Drepania barbata*. Juss. — Desfont. *Fl. Atl.*—Decand. Fl. Franc. *Hieracium baticum majus*. Herm. *Paradis.* p. 185; t. 185. *Lamarch Illustr. &c. Planch.* 751. *Tolpide barbata*.

Caulis herbaceus, circiter pedalis, cylindricus, striatus, tomentosus, superne ramosus, ramis patentibus, dichotomis. Folia lanceolata, obtusiuscula, in petiolum decurrentia, leviter sinuata, dentata, subpubescentia. Flores terminales, solitarii, rami altiores. Cal. pubescens, albicans.

Squamæ calyc. externæ, subulatæ, calyce longiores, nonnullæ per pedunculum sparsæ. Semiflosculi flavi, externe viridescentes, interni apice nigri. Receptaculum alveolatum. Semina nigra, tenuia, striata, apice truncata, denticulis tenuissimis, setisque 2, raro 3 albis, coronata. In collibus maritimis. Floret Majo. *Ann.*

242. *Tolpis virgata*. Bertol. *T. floribus lateralibus altioribus, rameis paucis, remotis, alternis: involucris setaceis, calyce longe brevioribus*. Bertol. *Decad. 1. p. 15. Crepis ambigua*. Balbis *Mem. de Crepidis nova specie p. 4; t. 1. Decand. Fl. Franc. Hieracium calyce barbato, præaltum*. Vaill. *Mem. Acad. an. 1721. Tolpide maggiore*.

Caulis 3-4 pedalis, cylindricus, sulcatus, inferne pilosus, superne glaber, ramosus, ramis adscendentibus, dichotomis. Fol. inferiora, longa, lanceolata, leviter sinuata, inæqualiter dentata, pilosa: superiora integra, linearia. Flores cauli, ramisque terminales, et in dichotomiis pedunculati, laterales altiores. Cal. tomentosus, albicans. Squamæ calycinæ externæ, internis longe breviores, una alterave pedunculo inserta. Semiflosculi flavi. Semina nigra, tenuia, striata, truncata, setis 6 7 coronata. Communis in collibus Mugellanis, et in Monte Pisano loco dicto *S. Giovanni alla Vena*. Floret Julio. *Bien.*

243. *Carlina caulescens*. Enc. *C. caule unifloro flore majore, foliis longis an-*

*gustis, pinnatis, utrinque viridibus, pinnis inciso-dentatis.* Enc. *Carlina caulescens magno flore albicante.* C. B. P. pag. 380. *Chamæleon albus* Lob. ic. 2; p. 4. *Carlina elatior.* Clus. H. 2; p. 155. *Carlina s. Leucacantha.* Dod. Pempt. p. 715. *Crocodilium Carlina caulem habens.* Dalech. H. p. 1475. Targioni in Append. ad Catal. Michel. H. Flor. p. 124. *Carlina caulescente.*

Caulis simplex, basi raro ramosus, subcylindricus, sulcatus, 1-florus, circiter pedalis. Folia alterne sparsa, elongata, pinnata, costa media alata, pinnis angustis, brevibus, plicatis, nervosis, incis, dentato-spinosis; superiora lanceolato-dentata. Squamæ calycinæ externæ, spadiceæ, triangulares, acuminatæ, pinnatifido-dentatæ, spinoso-palmatæ, tomentosæ; Squamæ calycinæ internæ duplo longiores, integræ, lineares, acuminatæ, scariosæ, albo-argenteæ, basi externa rubro-ferrugineæ. — In Monte-Amiata, in Montibus Florentiam inter et Mugellum, qui vulgo *le Salajole* dicuntur, in Apennino Mugellano, et a D. I. Targioni in alpidibus Apuanis, in montibus Clusentinatibus la *Consuma* dictis, et in *Monte-Scalario*. Floret Julio. *Bien.*

244. *Scolymus maculatus.* L. S. caule alato, ramis superioribus longioribus patentibus, involucris pectinato-spinosis, seminibus pappo destitutis. Nob. S. foliis margine attenuatis. Lin. Spec. S. floribus

*solitariis*. Lin. Syst. Veget. S. *Teophrasti narbonensis*. Clus. H. 2; p. 153. Lob. ic. 2; p. 5. Advers. p. 478. *Cardui Chrysanthemi altera icon*. Dod. Pempt. p. 713. *Chrysanthemus perennis*. Moris. H. 3; s. 7. t. 35; f. 6. Sc. *foliis latis obscure virentibus, caule admodum alato, floribus rarioribus*. Mich. Cat. H. Flor. p. 86. *Scolymus maculatus*. Desfont. Fl. Atlant. — Enc. Botaniq. Scardicione macchiato.

Caulis 2-3 pedalis, erectus, ramosus, ramis superioribus longioribus patentibus. Fol. radicalia primaria lanceolata, in petiolum decurrentia, leviter sinuata; secundaria sinuata, vel runcinata; caulina breviora, sessilia, triangularia, sinuata, per caulem decurrentia, ibique alas sinuatas, continuas efformantia. Alae et folia rigida, undulata, rugosa aut cavernosa, margine cartilagineo, incrassato, albo, nervis albis spinisque marginalibus albis, brevibus, validis. Flores axillares, sessiles, 2-4 simul approximati, partiali folio distincti, bracteisque ut plurimum 5. circumdati. Bractæ foliaceæ, spinis validioribus armatæ, quarum 3. internæ pectinato-spinosæ. Ligulæ luteæ externæ, basi pilis nigris contortis testæ. Squamæ calycinæ ovato-lanceolatæ, acuminatæ. Receptaculum conicum. Paleæ membranaceæ, cuneiformes, truncatæ, breves, marginatæ, arcte semina involventes. Semina absque pappo, cuneiformia, lævia, hinc convexa; externa squamis calycinis



internis nidulantia. Planta glauco-viridis, brevi, raroque tomento obducta. Frequens in Agro Pisano, præcipue secus viam Januensem. Floret Julio. *Ann.*

245. *Scolymus hispanicus*. L. *S. caule interrupte alato, ramis inferioribus longioribus, adscendentibus, involucris sinuato-spinosis, seminibus papposis*. Nob. *S. foliis margine incrastatis*. L. *Spec. S. floribus congestis*. L. *Syst. Veg. Scolymos chrysanthemos*. C. B. P. p. 384. *Sc. Teophrasti hispanicus*. Clus. *Hist.* 2; p. 153. *Carduus chrysanthemos*. Dod. *Pempt.* p. 725. *S. Teophrasti Clusio*. Dalech. *Hist.* p. 1438. *S. chrysanthemos annuus*. Moris. *H.* 3; s. 7; t. 35; f. 7. *S. chrysanthemos perennis folio venis lacteis simplicioribus et vix apparentibus notato, caule albicante*. Mich. *Cat. Horti Flor.* p. 86. et Targ. *ibid.* in *Append.* p. 171. Desf. *Fl. Atlant.* — Enc. *Botan. Scardiccione arraffapelo. Fl. Pis.*

Rami inferiores longiores sunt, et adscendendo successive decrescunt. Alæ caulibus irregulares, alicubi angustissimæ, alicubi prorsus deficientes. Color foliorum et alarum ex viridi flavescens, nervi et spinæ albæ, sed foliorum margo nec cartilagineus, nec incrassatus. Flores aurei, grandiores quam in præcedenti, axillares, sessiles, raro solitarii sed plerumque 3-4 approximati, bracteis sociati foliis conformibus. Antheræ ligulis concolores. Pili nigri nulli in ligulis. Receptaculum fere hemisphæ-

ricum. Paleæ membranaceæ, obovatæ, semina singula involventes. Sem. obovata, dorso convexa, duplici linea longitudinali notata, inde plana, linea media solitaria. Sem. exteriora ab internis calycis squamis involuta. Pappus ex setis 2-4 albis, deciduis. Tomentum album magis apparens quam in præcedenti. Communis per totam Etruriam. Floret Junio. *Peren.*

Jam Botanici consensere, ut appelletur *Scolymus maculatus* species quæ nigras habet antheras, et *Sc. hispanicus* qui antheras habet semiflosculis concolores. Verum utrum Linneus talia trivialia nomina eodem modo reapse accomodaverit, decidere mihi impossibile videtur. Hæ species tuto determinari nequeunt floribus vel conglomeratis, vel solitariis (*Syst. Veget.*); in neutra enim absolute conglomerati sunt vel solitarii. Si autem quod in Spec. Plant. *Linneus* dixit attendere velimus parem confusionem inveniemus. Pro *Scolymo* enim *maculato* figuram citat *Scolymi Teophrasti Narbonensis Clusii*, in qua superiores rami longiores, et flores minores observantur, et ob id cum descriptione quam ego *Scolymi maculati* dedi convenire videtur, unde planta est quæ nigras habet antheras, et foliorum margines incrassatos; ast huic speciei *Linneus* in Spec. Plant. foliorum *margines* tribuit *attenuatos*. Sic figuram *Scolymi Teophrasti hispanici Clusii* a Linneo citata pro *Scolymo hispanico* habet ramos longiores in inferio-

ri caulis parte, et flores majores, ideoque planta est antheris luteis, et foliis margine non incrassato, licet Linnens ei *incrassatum marginem* tribuat, hoc modo characteres statuens, citationibus repugnantes; et ex hoc non pauci derivati sunt Botanico- rum de his speciebus pertractantium, errores. — *Morisonius* autem qui figuras satis bonas exhibuit et cum *Synonymia Clusiana* bene adplicata, falso *perennem* nominavit qui *annuus* erat, *annuum* qui erat *perennis*. *Gaertnerus* demum hallucinatus est veluti nuda considerans semina *Scolymi maculati*, quem ideo *gymnospermum* vocavit, et dicens pappi destituta esse semina *Scolymi angiospermi* vel *hispanici*.

246. *Xanthium strumarium* L. X. caule inermi, foliis subcordatis, trinerviis fructu 2-corni. Nob. Lamarck illustr. des Genr. t. 765. f. 2; -- Gaertn. f. 164. *Lappa minor*, s. *Xanthium Dioscoridis*. C. B. P. p. 198. *Xanthium sive Strumaria*. Lob. ic. 588. *Xanthium*. Fuchs. Hist. p. 579. *Xanthium seu Lappa minor*. Mattiol. p. 1263. Jo. Bauh. H. 3; p. 572. *Carpola Bardana*. Fl. Pis.

Caulis herbaceus, ramosus, cylindricus 2-3 pedalis. Folia alterna sparsa, petioli longis semicylindricis, subcordata, triangularia, obscure lobata, nervosa, nervis 3 validioribus. Flores in axillis superioribus et in apice culmi et ramorum. Flores masculi superiores sunt, in capitulis subglobo- sis dispositi, calyce comuni polyphylo, he-

misphærico, ex foliolis imbricatis inæqualibus: corollæ monopetalæ, tubulosæ, viridescentes, quinquefidæ, pentandræ, antheris distinctis, receptaculo minimo, paleaceo impositæ. Flores fœminei inferiores, 3-4 approximati, distincti. Calyx 0. Corolla 0. Involucrum polyphyllum deciduum. Germen muricatum, apice birostratum, stylis filiformibus 2 in quovis rostro. Fructus capsula evalvis, bilocularis, diisperma, spinis subulato-hamatis muricata: apice in 2 cornua, plerumque incurvato uncinata, desinens. Tota planta scabra, pallide viridis. Floret Augusto. Communis in arvis per totam Etruriam. *Ann.*

Icon *Xanthii Strumarii* in tab. 970 Floræ Danicæ exhibita, inexacte capsulas omnes apice acuminato, integro ostendit.

247. *Xanthium spinosum*. L. *X. spinis axillaribus ternatis, foliis acutis trilobis fructu apice 1-spinoso*. N. Lamarck illustr. des Genr. t. 765; f. 1. - Gaertn. t. 164. *Xanthium spinosum atriplicis folio* Moris. H 3; s. 15; t. 2; f. 3. *Xanthium lusitanicum spinosum*. Herman. paradis. t. 246. *Carpola spinosa*. *Fl. Pis.*

Caulis herbaceus, sesquipedalis, et bipedalis, cylindricus, erectus, ramosus. Folia lanceolata acuta, in petiolum attenuata, triloba, lobis acutis, medio longiore: superne pallide viridia, pilis brevissimis albis, adpressis adspersa, nervis primariis albis, inferne sericea, candida. Spinæ lon-

gæ, acutissimæ, lutescentes ternatæ, vel trifurcatæ, stipulares. Flores mares ut in præcedenti. Flores fœminei solitarii, loco alterius spinæ. Involucrum nullum. Calix et Corolla 0. Germen muricatum, apice integrum, spinula terminatum. Styli filiformes 4 in apice sub spinula. Fructus capsula evalvis, bilocularis disperma, deflexa, pilis uncinatis tecta, spina terminali valida, longiuscula. Floret Augusto. Cum præcedenti. *Ann.*

248. *Vallisneria spiralis*. Lin. *V. foliis linearibus versus apicem denticulatis, scapis fructiferis spiralibus natantibus*. Nob. *Vallisneria palustris Algæ folio, italica, foliis in summitate denticulatis flore purpurascens*. Mich. N. Pl. Gen. p. 12; tab. 10. icon plantæ fœm. *Vallisneriodes palustre, Algæ folio, italicum, foliis in summitate tenuissime denticulatis, floribus albis vix conspicuis*. Mich. N. P. Gen. p. 13. t. 10. icon planta masculæ. *Vallisneria spirale. Fl. Pis.*

Planta submersa, abundans in fossis Pisanis. Radix repens. Folia omnia radicalia, fasciculata, vaginantia, ad summum bipedalia, 4-5 lin. lata, linearia, apice obtusa et rotundata, margine in superiori parte, denticulis setaceis instructa, atro-viridia, nervosa. In planta mascula pedunculus 3-4 pollicaris, spatha alba semipollicari, ovali-compressa, primum clausa, demum 2-partita, laciniis 2-fidis. Spadix conicus, glandulis lineari-clavatis, albis, pellucidis te-

ſtus, quibus flores adhærent. Corollæ mini-  
 mæ, monopetalæ, tripartitæ, diandræ, petal-  
 lis albis pellucidis. In *planta fæminea* pe-  
 dunculus tripedalis et longior, primum spi-  
 raliter convolutus, abbreviatus, vix semipe-  
 dalem longitudinem attingens. Spatha tu-  
 bulosa, 2-fida; Calix superus, persistens,  
 longus, ad limbum 3 partitus, laciniis ova-  
 to-obtusis. Petala 3 minima, linearia, la-  
 ciniis calycinis alterna. Stigma 3-fidum,  
 laciniis petaliformibus, ovato-obtusis, emar-  
 ginatis, concavis, medio appendiculatis.  
 Capsula cylindrico-compressa, lateraliter,  
 marginata, unilocularis, polysperma, ad  
 parietem seminiferæ. Florescentiæ tempore  
 „ flores fœminei laxato scapo detenti su-  
 „ pernatant; masculi ad aperta spadiceis de-  
 „ mersi spatha, ruptu nexu ad aquæ su-  
 „ perficiem liberi elewantur, hiant, crate-  
 „ rvatim juxta fœmineos vagantur, et præ-  
 „ ludunt genesi novæ prolis, quæ in ger-  
 „ mine latens, retracto mox scapo, sub un-  
 „ dis clam maturescunt. *Juss. Gen. plant.*  
 „ p. 67. „ Floret Augusto et Septembri.  
*Peren.*

*FINIS VOLUM. I.*

# INDEX.

---

## A

|                          |                     |                       |                     |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <i>Aconitum</i> .        |                     | <i>Alopecurus</i>     |                     |
| <i>Lycoctonum</i> . pag. | <a href="#">155</a> | <i>geniculatus</i> .  | <a href="#">42</a>  |
| <i>Aegilops</i>          |                     | <i>Anagyris</i>       |                     |
| <i>triuncialis</i> .     | <a href="#">93</a>  | <i>foetida</i> .      | <a href="#">135</a> |
| <i>Agrostis</i>          |                     | <i>Andropogon</i>     |                     |
| <i>alba</i> .            | <a href="#">33</a>  | <i>distachyon</i> .   | <a href="#">47</a>  |
| <i>bromoides</i> .       | <a href="#">31</a>  | <i>Gryllus</i> .      | <a href="#">46</a>  |
| <i>miliacea</i> .        | <a href="#">31</a>  | <i>hirtus</i> .       | <a href="#">44</a>  |
| <i>pungens</i> .         | <a href="#">34</a>  | <i>Anemone</i>        |                     |
| <i>vulgaris</i> .        | <a href="#">32</a>  | <i>hepatica</i> .     | <a href="#">156</a> |
| <i>Aira</i>              |                     | <i>nemorosa</i> .     | <a href="#">157</a> |
| <i>alpina</i> .          | <a href="#">52</a>  | <i>Anthoxanthum</i>   |                     |
| <i>canescens</i> .       | <a href="#">54</a>  | <i>odoratum</i> .     | <a href="#">23</a>  |
| <i>caryophyllea</i> .    | <a href="#">56</a>  | <i>Arenaria</i>       |                     |
| <i>cespitosa</i> .       | <a href="#">51</a>  | <i>marina</i> .       | <a href="#">139</a> |
| <i>flexuosa</i> .        | <a href="#">53</a>  | <i>rubra</i> .        | <a href="#">140</a> |
| <i>pubesceus</i> .       | <a href="#">57</a>  | <i>Arundo</i>         |                     |
| <i>Ajuga</i>             |                     | <i>Ampelodesmos</i> . | <a href="#">89</a>  |
| <i>Iva</i> .             | <a href="#">160</a> | <i>arenaria</i> .     | <a href="#">88</a>  |
| <i>Alchimilla</i>        |                     | <i>colorata</i> .     | <a href="#">87</a>  |
| <i>vulgaris</i> .        | <a href="#">126</a> | <i>Phragmitis</i> .   | <a href="#">90</a>  |
| <i>Alisma</i>            |                     | <i>Asarum</i>         |                     |
| <i>ranunculoides</i> .   | <a href="#">134</a> | <i>europæum</i> .     | <a href="#">140</a> |
| <i>Alopecurus</i>        |                     | <i>Atropa</i>         |                     |
| <i>agrestis</i> .        | <a href="#">42</a>  | <i>Belladonna</i> .   | <a href="#">127</a> |
| <i>Vol. I.</i>           |                     | <i>Avena</i>          |                     |
|                          |                     | <i>elatior</i> .      | <a href="#">82</a>  |
|                          |                     |                       | <a href="#">13</a>  |

*Avena*

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| flavescens.       | <u>83</u> |
| fragilis.         | <u>87</u> |
| neglecta.         | <u>84</u> |
| pratensis.        | <u>85</u> |
| spicata $\beta$ . | <u>86</u> |

**B***Briza*

|         |           |
|---------|-----------|
| maxima. | <u>66</u> |
| media.  | <u>67</u> |
| minor.  | <u>67</u> |

*Bromus*

|             |           |
|-------------|-----------|
| arvensis.   | <u>73</u> |
| asper.      | <u>74</u> |
| diandrus.   | <u>80</u> |
| distachyos. | <u>81</u> |
| ligusticus. | <u>77</u> |
| Michellii.  | <u>78</u> |
| mollis.     | <u>75</u> |
| pinnatus.   | <u>81</u> |
| rubens.     | <u>76</u> |
| sterilis.   | <u>79</u> |

*Bupleurum*

|                |            |
|----------------|------------|
| semicompositum | <u>130</u> |
|----------------|------------|

**C***Carex*

|            |            |
|------------|------------|
| alpestris. | <u>106</u> |
| distans.   | <u>105</u> |

*Carex*

|             |            |
|-------------|------------|
| divulsa.    | <u>100</u> |
| Drymeja.    | <u>108</u> |
| flava.      | <u>104</u> |
| hirta.      | <u>111</u> |
| muricata.   | <u>99</u>  |
| ovalis.     | <u>98</u>  |
| pallescent. | <u>107</u> |
| paniculata. | <u>101</u> |
| pendula.    | <u>106</u> |
| pilulifera. | <u>102</u> |
| præcox.     | <u>103</u> |
| recurva.    | <u>109</u> |
| remota.     | <u>101</u> |
| riparia.    | <u>110</u> |

*Carlina*

|             |            |
|-------------|------------|
| caulescens. | <u>184</u> |
|-------------|------------|

*Centunculus*

|          |            |
|----------|------------|
| minimus. | <u>126</u> |
|----------|------------|

*Cistus*

|               |            |
|---------------|------------|
| halimifolius. | <u>153</u> |
| Savii.        | <u>154</u> |
| Tuberaria.    | <u>153</u> |

*Crepis*

|                  |            |
|------------------|------------|
| Dioscoridis.     | <u>181</u> |
| leontodontoides. | <u>182</u> |
| pulchra.         | <u>179</u> |
| setosa.          | <u>182</u> |

*Crypsis*

|                |           |
|----------------|-----------|
| aculeata.      | <u>41</u> |
| alopecuroides. | <u>40</u> |
| schænoides.    | <u>41</u> |



## D

*Distamnus*  
*albus* . 136

## E

*Euphorbia*  
*acuminata* . 144  
*Barrelieri* 145  
*cyparissias* . 146  
*Esula* . 147  
*exigua* . 141  
*Paralias* . 144  
*Pithynsa* . 146  
*platyphylla* . 142  
*spinosa* . 143

## F

*Festuca*  
*bromoides* . 71  
*myuros* . 72  
*segetum* . 69  
*serotina* . 70  
*uniglumis* . 73  
*Fumaria*  
*capreolata* . 170  
*officinalis* . 169

## G

*Gallium*  
*rubrioides* . 123  
*Genista*  
*jannensis* . 173  
*sagittalis* . 173  
*Gratiola*  
*officinalis* . 18  
*Gypsophyla*  
*muralis* . 137  
*Saxifraga* . 137

## H

*Helleborus*  
*hyemalis* . 157  
*foetidus* . 159  
*niger* . 158  
*viridis* . 159  
*Hieracium*  
*tuberosum* . 178  
*Holcus*  
*halepensis* . 49  
*lanatus* . 49  
*mollis* . 48  
*Hypericum*  
*quadrangulare* . 177

## J

*Juncus*

|                   |            |
|-------------------|------------|
| acutus .          | <u>112</u> |
| bufonius .        | <u>115</u> |
| bulbosus .        | 117        |
| effusus .         | <u>112</u> |
| niveus .          | 113        |
| pilosus .         | <u>114</u> |
| <u>Tenageja</u> . | <u>116</u> |

## L

*Lagurus*

|          |    |
|----------|----|
| ovatus . | 90 |
|----------|----|

*Lappago*

|            |           |
|------------|-----------|
| racemosa . | <u>97</u> |
|------------|-----------|

*Lathyrus*

|             |            |
|-------------|------------|
| annuus .    | <u>174</u> |
| palustris . | <u>176</u> |
| tuberosus . | <u>175</u> |

*Leersia*

|             |           |
|-------------|-----------|
| oryzoides . | <u>28</u> |
|-------------|-----------|

*Ligusticum*

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <u>aquilegifolium</u> . | 132 |
|-------------------------|-----|

*Lilium*

|            |            |
|------------|------------|
| Martagon . | <u>133</u> |
|------------|------------|

*Lobelia*

|             |            |
|-------------|------------|
| laurentia . | <u>129</u> |
|-------------|------------|

*Lolium*

|           |           |
|-----------|-----------|
| arvense . | <u>92</u> |
|-----------|-----------|

*Lolium*

|              |           |
|--------------|-----------|
| perenne .    | <u>91</u> |
| temulentum . | <u>92</u> |

*Lotus*

|               |            |
|---------------|------------|
| angustissimus | <u>177</u> |
|---------------|------------|

## M

*Melampyrum*

|             |     |
|-------------|-----|
| cristatum . | 165 |
|-------------|-----|

*Menyanthes*

|              |            |
|--------------|------------|
| trifoliata . | <u>128</u> |
|--------------|------------|

*Milium*

|               |           |
|---------------|-----------|
| cœrulescens . | <u>29</u> |
| effusum .     | <u>28</u> |
| lendigerum .  | <u>30</u> |

*Montia*

|           |     |
|-----------|-----|
| fontana . | 117 |
|-----------|-----|

*Myagrum*

|           |            |
|-----------|------------|
| rugosum . | <u>168</u> |
|-----------|------------|

## N

*Nardus*

|            |           |
|------------|-----------|
| aristata . | 25        |
| stricta .  | <u>24</u> |

## O

*Ononis*

|                    |            |
|--------------------|------------|
| ornithopodioides . | <u>174</u> |
|--------------------|------------|

## P

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <i>Papaver</i>  |            |
| dubium.         | 150        |
| hybridum.       | <u>151</u> |
| Rhoeas.         | 150        |
| <i>Peplis</i>   |            |
| portula.        | <u>134</u> |
| <i>Phalaris</i> |            |
| arenaria.       | 34         |
| erucæformis.    | 37         |
| Michelii.       | <u>36</u>  |
| paradoxa.       | <u>36</u>  |
| subulata.       | <u>35</u>  |
| <i>Phleum</i>   |            |
| alpinum.        | <u>39</u>  |
| paniculatum.    | <u>39</u>  |
| pratense.       | <u>38</u>  |
| <i>Poa</i>      |            |
| aquatica.       | <u>65</u>  |
| compressa.      | <u>64</u>  |
| decumbens.      | <u>63</u>  |
| divaricata.     | <u>64</u>  |
| dura.           | <u>61</u>  |
| nemoralis.      | <u>60</u>  |
| pratensis.      | <u>58</u>  |
| rigida.         | <u>62</u>  |
| trivialis.      | 57         |
| <i>Prasium</i>  |            |
| majus.          | <u>164</u> |
| <i>Primula</i>  |            |
| vulgaris.       | <u>128</u> |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <i>Pulmonaria</i> |            |
| officinalis.      | <u>127</u> |
| <i>Pyrus</i>      |            |
| aria.             | <u>148</u> |
| torminalis.       | <u>149</u> |

## R

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <i>Rhinanthus</i> |            |
| versicolor.       | <u>166</u> |
| viscosa.          | <u>165</u> |
| <i>Rosmarinus</i> |            |
| officinalis.      | <u>22</u>  |
| <i>Rotboella</i>  |            |
| erecta.           | <u>26</u>  |
| incurvata.        | <u>26</u>  |
| subulata.         | <u>27</u>  |

## S

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <i>Saccharum</i>  |            |
| cylindricum.      | <u>44</u>  |
| Ravennæ.          | <u>43</u>  |
| <i>Salvia</i>     |            |
| clandestina.      | <u>21</u>  |
| <u>glutinosa.</u> | <u>22</u>  |
| pratensis.        | <u>20</u>  |
| verbenaca.        | <u>20</u>  |
| <i>Sambucus</i>   |            |
| <u>racemosa.</u>  | <u>133</u> |

*Saponaria**Vaccaria* .

138

*Scabiosa**arvensis* .

120

*columbaria* .

121

*graminifolia* .

122

*integrifolia* .

120

*leucantha* .

118

*Succisa* .

118

*sylvatica* .

119

*tenuifolia*  $\beta$  .

122

*Scolymus**hispanicus* .

187

*maculatus* .

185

*Scutellaria**galericulata* .

163

*Secale**villosum* .

93

*Sesleria**argentea* .

68

*Silene**bipartita* .

138

*Sison**inundatum* .

132

*Sium**angustifolium* .

130

*latifolium* .

131

*Spartium**radiatum* .

172

*Spiræa**aruncus* .

149

## T

*Teucrium**fruticans* .

160

*montanum* .

162

*Scorodonia* .

161

*Thalictrum**aquilegifolium* .

155

*Thlaspi**alliaceum* .

168

*Tilia**mycophylla* .

152

*platyphylla* .

151

*Tolpis**barbata* .

183

*virgata* .

184

*Triticum**festucoides* .

95

*juncum* .

94

*maritimum* .

95

*repens* .

94

*unilaterale* .

96

*Turritis**glabra* .

169

## U

*Utricularia**vulgaris* .

19

## V

|                    |     |
|--------------------|-----|
| <i>Valantia</i>    |     |
| Aparine.           | 124 |
| muralis.           | 125 |
| spuria.            | 124 |
| <i>Valeriana</i>   |     |
| rubra.             | 23  |
| <i>Vallisneria</i> |     |
| spiralis.          | 191 |
| <i>Veronica</i>    |     |
| acinifolia.        | 17  |
| agrestis.          | 14  |
| Anagallis.         | 11  |
| arvensis.          | 17  |
| Beccabunga.        | 10  |
| Chamædrys.         | 13  |
| Cymbalaria.        | 16  |
| filiformis.        | 15  |

*Veronica*

|               |     |
|---------------|-----|
| hederifolia.  | 16  |
| montana.      | 12  |
| officinalis.  | 10  |
| scutellata.   | 11  |
| spicata.      | 9   |
| Teucrium.     | 12  |
| urticifolia.  | 14  |
| <i>Vicia</i>  |     |
| lathyroides.  | 176 |
| <i>Vitex</i>  |     |
| Agnus castus. | 167 |

## X

*Xanthium*

|             |     |
|-------------|-----|
| spinosa.    | 190 |
| strumarium. | 188 |

## ADDENDA ET EMENDANDA.

Pag. 1 v. 12 Preceptori — Præceptor

11 32 paucis — paucis

16 5 foliis — folio

41 13 fluviorem — fluviorum

42 31 N. 51 loco *Laguri ovati* &c. ponatur *Alopecurus agrestis*. L. A. culmo erecto scabriusculo, spica simplicissima attenuata, glumis nudiusculis, basi connatis, carina dilatatis. Smith Brit. Leers Herb. n. 44; t. 2; f. 5. Gr.

*cum cauda muris purpurascens*. I. B. H. 2; p. 473. *Gr. typhnum plantaginis spica, aristis geniculatis* Bartel. ic. 699. f. 2. *Gr. Spicatum, spica cylindracea tenuissima, longiore*. Scheuchz. Agr. p. 69. t. 2; f. 6 a. b. Codino salvatico. *Flor. Pis.*

Culmus pedalis et sesquipedalis, apice nudus, scabriusculus. Fol. plana, superne et carina scabra: ligula lanceolata, obtusa. Spica tenuis, 3-4 pollices longa, viridi-purpurascens. Valvæ subæquales, glabriusculæ, nervosæ, carina dilatata, ciliata, basi connatæ. Gluma: folliculus, glaber, basi aristatus, aristâ geniculata, flore duplo longiore, divaricata. Frequens in pratis et in agris. *Flor. Majo. An.*

- Pag. 67 v. 26* glumis — glumis  
 68 10 dichotomis — dichotomis  
 — 15 interne — internæ  
 — 16 emarginatæ — emarginatæ  
 74 20 externe — externæ  
 83 28 carina — carina  
 86 11 *post* Mont. prod. *adde* pag. 53; t. 2; n. 2.  
 87 24 margine acuto armato, — margine, oculo armato.  
 92 10 vaginæ — vaginæ  
 99 29 ovatæ, masculæ — ovatæ, supernæ masculæ  
 100 12 *post* Smith *adde* Fl. Dan. t. 1280.  
 — 18. f. 1. — f. 11.  
 102 4 *post* W *adde* Fl. Dan. 1116.  
 110 2 velure — veluti  
 — 24 *post* Brit. *adde* Fl. Dan. t. 1118.  
 112 33 *post* Brit. *adde* Fl. Dan. t. 1096.  
 114 1 arope — prope  
 117 33 ramularum — ramulorum  
 120 3 sedis — setis  
 135 8 longioris — longiores.  
 147 28 *post* L. *adde* Fl. Dan. t. 1270.  
 160 32 *Tenerium* — *Teucrium*





